



## УРОЛІК (суспензія для перорального застосування) листівка-вкладка

### Опис

Суспензія від світло-жовтого до коричневого кольору зі специфічним запахом складників.

### Склад

1 мл препарату містить діючі речовини (мг):  
толокнянки (мучниці) листя екстракт сухий (10:1) – 5,0;  
хвоща трави екстракт сухий (10:1) – 5,0;  
пол-пали (ерви шерстистої) екстракт сухий (10:1) – 25,0;  
журавлини плодів екстракт сухий (10:1) – 20,0.  
Допоміжні речовини: калію сорбат, натрію бензоат, кислота лимонна, ксантанова камідь, гліцерин, вода очищена.

### Фармакологічні властивості

#### **АТС-vet класифікаційний код: QG04 Урологічні.**

УРОЛІК має діуретичну, антибактеріальну, протизапальну, анагетичну, репаративну, антиоксидантну, мембраностабілізуючу, судинозміцнюючу, простатопротекторну дію, сприяє розчиненню каменів (крім оксалатів) і виведенню піску з нирок і сечового міхура.

*Екстракт толокнянки (мучниці)*, що входить до складу УРОЛІКУ, має протизапальну і сечогінну дію. Антимікробні і антисептичні властивості мучниці забезпечуються фенолглікозидом арбутином, який розщеплюється в організмі з утворенням гідрохінону. Гідрохінон, виділяючись з сечею через нирки, підсилює сечовиділення і має протимікробну дію. Екстракт мучниці проявляє також в'язучу, помірну болезаспокійливу і жовчогінну дію.

*Екстракт хвоща* містить комплекс біологічно активних речовин (в т.ч. кремнієву кислоту, сапоніни, дубильні речовини, органічні кислоти, солі), забезпечує сечогінний, протизапальний, кровоспинний, протимікробний, дезінтоксикаційний (виводить свинець) ефекти. У сечі кремнієві солі утворюють колоїди, що перешкоджають кристалізації сечових конкрементів.

*Екстракт пол-пали* – засіб рослинного походження, який одержують з трави ерви шерстистої або пол-пали (*Aerva Lanata L.*). Трава пол-пали містить в своєму складі алкалоїди ервін, метилервін, пектинові речовини, похідні олеанолової кислоти, ферулоїламіди, флавоноїди, фенольні кислоти, солі калію та інші біологічно активні речовини. Пол-пали екстракт має знезаражуючу і сечогінну дію, сприяє виведенню піску з нирок і розчиненню каменів, очищає сечовий та жовчний міхури, виводить з організму радіонукліди, нормалізує процес обміну речовин в організмі.

*Екстракт журавлини*, що входить до складу УРОЛІКУ містить бензойну кислоту, яка підсилює дію антибіотиків і сульфаніламідів. У журавлині містяться лимонна, хінна, бензойна і олеїнова кислоти, вітаміни С і Р, каротин, сапоніни, амінокислоти, рутин, кверцитин, глікозид, мікроелементи (йод, залізо, мідь, марганець). Журавлиний танін має особливу здатність злипатися з різними хвороботворними бактеріями і виводити їх з сечею назовні. Журавлина також має протизапальні властивості при інфекції сечостатевої шляхів і циститах.



## **Застосування**

Для профілактики та лікування собак та котів в складі комплексної терапії за:

- сечокам'яної хвороби;
- захворювань нирок (гломерулонефрит, інтерстиціальний нефрит, пієліт, пієлонефрит, ниркової недостатності);
- захворювань сечовидільної системи (цистит, неспецифічний уретрит, урологічний синдром).

Призначають собакам і котам з метою зниження рівня рН в сечі і виведення кристалів з сечових шляхів завдяки легкому сечогінному ефекту препарату. Особливо рекомендується тваринам з підвищеним ризиком захворюваності – кастрованим, стерилізованим, малорухливим, гладким.

## **Дозування**

Перед застосуванням збовтати. Для профілактики препарат слід застосовувати перорально у дозі 1 мл препарату на 10 кг маси тіла тварини 2 рази на добу протягом 5–7 діб. Курс повторювати кожні 3–4 місяці.

Для комплексної терапії тварин при урологічному синдромі або початковій стадії сечокам'яної хвороби препарат рекомендується вводити в дозі 2–4 мл на 10 кг маси тіла тварини, перорально 2 рази на добу протягом 5–7 діб. Лікування необхідно поєднувати із застосуванням симптоматичних засобів та антибіотикотерапією.

## **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість тварини до компонентів, гостра ниркова недостатність, виразка шлунку (за призначенням лікаря ветеринарної медицини).

## **Застереження**

*Побічна дія*

При дотриманні вказаних дозувань та умов введення препарат не викликає побічної дії.

*Особливі застереження при використанні*

При підвищеній індивідуальній чутливості тварини до компонентів лікарського препарату та появі побічних реакцій використання препарату припиняють та проводять десенсибілізуючу або симптоматичну терапію.

*Використання під час вагітності, лактації.*

З обережністю призначати вагітним та лактуючим тваринам, під наглядом лікаря ветеринарної медицини.

## **Форма випуску**

Флакони з полімерних матеріалів по 50 мл та по 100 мл, укомплектовані шприцом-дозатором, вкладений в картонну пачку з інструкцією.

## **Зберігання**

У сухому темному та недоступному для дітей місці за температурою від 2 до 25 °С.

Термін придатності – 2 роки.

Термін придатності після першого відкриття флакону – не більше 21 доби при дотриманні умов зберігання.

## **Для застосування у ветеринарній медицині!**

### **Власник реєстраційного посвідчення**

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»

вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка,

Бучанський р-н, Київська обл., 08030, Україна,

[www.ukrzoovet.com.ua](http://www.ukrzoovet.com.ua)

### **Виробники:**

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпостач»

вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка,

Бучанський р-н, Київська обл., 08030, Україна,

[www.ukrzoovet.com.ua](http://www.ukrzoovet.com.ua)

