

22.07.2022

Ектосан-спот-он
(розчин для зовнішнього застосування)
листівка-вкладка

Опис

Прозора масляниста рідина світло-жовтого кольору з приємним специфічним запахом.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини (мг):

альфациперметрин - 65;

піперонілу бутоксид - 300.

Допоміжні речовини: гераніол, ізопропанол, етилацетат, диметилсульфоксид.

Фармакологічні властивості

АТСvet класифікаційний код QP53 - ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AC30, комбінації піретроїдів).

Комплекс із двох інсектоакарицидів - альфациперметрину та піпероніл бутоксида має широкий спектр дії на комах і кліщів як контактна отрута. Препарат при безпосередньому контакті ефективний проти: кровосисних двокрилих комах (*Tabanidae*, *Culicidae*, *Simulidae*, *Ceratopogonidae*, *Psychodidae*), кровососок (*Hippoboscidae*), зоофільних мух (*Muscidae*, *Calliphoridae*, *Sarcophagidae*), волосоїдів (*Trichodectidae*), вошей (*Haematopinidae*), саркоптоїдних кліщів (*Sarcoptidae*, *Psoroptidae*), паразити формних кліщів (*Ixodes*, *Hyalomma*, *Dermacentor*, *Haemaphysalis*, *Rhipicephalus*, *Boophilus*, *Amblyomma*) та інших тимчасових чи постійних членистоногих на тілі тварин.

Механізм дії альфациперметрину полягає в активації натрієвих каналів мембран нервових клітин, незворотній деполяризації клітинних мембран і блокаді нервової провідності, що призводить до порушення рухових рефлексів, в результаті чого настає повний параліч і загибель членистоногих на усіх стадіях їх розвитку.

Піпероніл бутоксид – речовина-каталізатор інсектицидної дії, блокує захисні ферменти, що виділяються комахами, підсилює дію альфациперметрину. У рекомендованих дозах препарат забезпечує захист від двокрилих комах та іксодових кліщів протягом 28 діб.

Препарат помірнотоксичний для теплокровних тварин і птиці, належить до III класу токсичності, у рекомендованих дозах і концентраціях не виявляє місцево подразнюючої та алергізуючої дії. Токсичний для бджіл та риб.

Застосування

Лікування та профілактика спортивних коней при захворюваннях, спричинюваних ектопаразитами:

► кровосисними двокрилими комахами: гедзями (*Tabanus spp.*, *Haematopota spp.*, *Chrysops spp.*), мошками (*Simulium spp.*), комарами (*Culex spp.*, *Aedes spp.*, *Anopheles spp.*), мокрецьями (*Culicoides spp.*, *Leptoconops spp.*); кровосисними мухами (*Stomoxys calcitrans*, *Haematobia irritans*, *H. atripalpis*); некусаючими мухами (*Musca domestica*, *M. autumnalis*, *M. vetustissima*, *M. sorbens*); каліфорідними та саркофагідними мухами (*Calliphora spp.*, *Lucilia spp.*, *Phormia spp.*, *Chrysomyia spp.*, *Sarcophagus spp.*); окриленими оводами (*Gasterophilus spp.*, *Hypoderma spp.*); кінською кровососкою (*Hippobosca equina*) та іншими компонентами гнусу;

► безкрилими комахами: вошами (*Haematopinus asini*), волосоїдами (*Bovicola equi* син. *Werneckiella*, *Damalinea*);

► іксодовими кліщами (*Dermacentor pictus*, *D. marginatus*, *Hyalomma plumbeum*, *H. scupense*, *Rhipicephalus bursa*, *Ixodes spp.*, *Amblyomma spp.*);

► саркоптоїдними кліщами (*Sarcoptes scabiei* var. *equi*, *Chorioptes equi*, *Psoroptes equi*);

► випадковими ектопаразитами (*Ctenocephalides felis*, *Echidnophaga gallinacea*, *Dermanyssus gallinae*).

Дозування

Препарат наносять крапково, по 2-3 мл на одне місце, на ділянки шиї, холки, підгруддя, стегон та кореня хвоста у таких дозах:

коні — 33 мл на тварину;

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1

лошата старше 6 місяців масою тіла до 200 кг — 1,5 мл на 10 кг маси тіла.

Розраховану дозу наносять з допомогою флакону з крапельницею або шприца без голки. Обробку проводять увечері, аби у наступні 10-15 годин тварини не перебували під впливом прямих сонячних променів.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до діючих речовин препарату.

Не застосовувати ослабленим, виснаженим тваринам та хворим на інфекційні захворювання.

Не застосовувати лошатам віком до 3 місяців.

Не застосовувати підсисним кобилам у перші два місяці після жеребності.

Не застосовувати для продуктивних коней, м'ясо яких призначене для споживання людьми.

Не застосовувати тваринам інших видів.

Не застосовувати препарат одночасно з іншими інсекто-акарицидними засобами.

Застереження

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Усі роботи з препаратом проводять з використанням засобів захисту (халат, прогумований фартух, головний убір, гумові чоботи і рукавиці, захисні окуляри, респіратор).

Після закінчення роботи необхідно ретельно вимити водою з милом обличчя і руки, рот прополоскати.

Під час обробки тварин забороняється палити, приймати їжу, пити.

Уникати потрапляння препарату на пошкоджену шкіру, в очі та на слизові оболонки.

При потраплянні препарату на шкіру, слизові оболонки або в очі промити великою кількістю проточної води.

Після обробки обмежити маніпуляції з тваринами та протягом доби уникати потрапляння на оброблені ділянки шкіри води та миючих засобів.

Повторну обробку тварин, можна провести не раніше ніж через 7 діб.

Форма випуску

Скляні або поліпропіленові флакони з крапельницею по 33,0 мл.

Зберігання

У сухому, темному, недоступному для дітей місці, окремо від харчових продуктів та кормів за температури від 4 °С до 25 °С.

Після відкриття флакона препарат зберігати в пакуванні виробника щільно закритим і використати протягом 2 місяців.

Термін придатності

2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1