

18.07.2016

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Катозал[®] 10%

2. Склад

100 мл препарату містять діючі речовини (г):

бутафосфан - 10,0;

ціанокобаламін - 0,005.

Допоміжні речовини: метил-4-гідроксибензоат, гідроокис натрію, вода для ін'єкцій.

3. Фармацевтична (лікарська) форма

Розчин для ін'єкцій.

4. Фармакологічні властивості

АТС-vet класифікаційний код: QA12C, інші мінеральні добавки (QA12CX91, бутафосфан).

Катозал[®] 10% — стимулятор обміну речовин та тонізуючий засіб.

Діючі речовини, що входять до складу препарату, проявляють стимулюючу дію на всі процеси обміну в організмі (білковий, вуглеводневий та жировий), підвищують резистентність організму до впливу несприятливих факторів, сприяють росту і розвитку тварин.

Фосфор, який входить до складу препарату, впливає майже на всі асиміляційні процеси, які відбуваються в організмі. Він міститься в такій формі, яка швидко виділяється з організму. Органічні препарати фосфору, завдяки їх виключно фізіологічному типу дії, є прекрасними загальними метаболічними стимуляторами. Це також підтверджується тим фактом, що побічні ефекти, такі як серцебиття, тремор, підвищене потовиділення і т.п., які часто спостерігаються при застосуванні інших тонізуючих засобів, не спостерігаються. Крім того, здатність до реагування органів з гладкою мускулатурою підвищується.

Катозал[®] 10% в терапевтичних дозах діє, в основному, на скелетну систему, стимулює органи з гладкими м'язами (сечовидільна система, жовчний міхур) та серцевий м'яз. Гострі та хронічні метаболічні розлади добре корегуються Катозалом[®] 10%.

Вітамін В₁₂ (ціанокобаламін) стимулює білковий, вуглеводневий та жировий обміни, позитивно впливає на червоні кров'яні тілця, стимулює їх ріст.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Коні, велика рогата худоба, свині, кози, вівці, собаки, коти, хутрові звірі, птиця.

5.2 Показання до застосування

Тонізуючий засіб, який стимулює обмін речовин у коней, великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, собак, котів, хутрових звірів та птиці при:

- порушенні обміну речовин, викликаних поганою годівлею, утриманням або різними захворюваннями;
- порушенні годівлі, розвитку і внаслідок хвороб, при вирощуванні молодняка;
- стимуляції родової діяльності та як допоміжний засіб при кальціємії;
- післяродових захворюваннях (виснаженнях), після важких родів, а також, як допоміжний засіб при лікуванні неплідності;
- тетанічних синдромах і парезі;
- ослабленому стані у тварин;
- вторинній анемії, анеміях при гельмінтозах;
- а також для:
- підвищення резистентності організму;
- прискорення і скорочення процесу линьки у птиці, а також при канібалізмі;
- підвищення м'язової активності здорових тварин.

5.3 Протипоказання

Немає даних.

5.4 Побічна дія

Відсутня.

5.5 Особливі застереження при використанні

Без особливостей.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Без особливостей.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Немає даних.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Внутрішньовенно, внутрішньом'язово, підшкірно або з питною водою (птиця).

Дози становлять:

коні і велика рогата худоба — 10-25 мл;

лошата і телята — 5-12 мл;

вівці та кози — 2,5-8 мл;

ягнята — 1,5-2,5 мл;

свині — 2,5-10 мл;

поросята — 1-2,5 мл;

собаки — 0,5-5,0 мл;

коти і хутрові звірі — 0,5-2,5 мл.

За необхідності препарат вводять повторно наступної доби.

Для птиці Катозал® 10% додають до питної води з розрахунку:

кури і курчата — 1-1,5 мл препарату на 1 л води;

бройлери і кури-несучки — 2-3 мл препарату на 1 л води.

При хронічних захворюваннях тваринам вводять половину дози.

За необхідності лікування повторюють через 5-14 діб.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Немає даних.

5.10 Спеціальні застереження

Відсутні.

5.11 Період виведення (каренції)

Відсутній.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Немає.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Не відомі.

6.2 Термін придатності

5 років. Після відкриття флакону — 28 діб.

6.3 Особливі заходи зберігання

Зберігати препарат у закритому упакованні виробника, сухому, недоступному для дітей та тварин, місці, окремо від харчових продуктів та кормів при температурі від 5 до 25 °С.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Темні скляні флакони, об'ємом 100 мл.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний препарат або його залишки утилізують згідно з чинними вимогами.

18.07.2016

7. Назва і місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Байер Енімал Хелс ГмбХ
D-51368, Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH
D-51368, Leverkusen, Germany

8. Назва і місцезнаходження виробників

Байер Хелс Кеа ЛЛС
Шоуні Мішн Паквей12707
Шоуні, Канзас 66201-0390, США

Bayer Health Care LLC
12707, Shawnee Mission Parkway, Shawnee Kansas
66201-0390, USA

9. Додаткова інформація

18.07.2016

Катозал® 10%
(розчин для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий розчин рожевого кольору.

Склад

100 мл препарату містять діючі речовини (г):

бутафосфан - 10,0;

ціанокобаламін - 0,005.

Допоміжні речовини: метил-4-гідроксибензоат, гідроокис натрію, вода для ін'єкцій.

Фармакологічні властивості

АТС-vet класифікаційний код: QA12C, інші мінеральні добавки (QA12CX91, бутафосфан).

Катозал® 10% — стимулятор обміну речовин та тонізуючий засіб.

Діючі речовини, що входять до складу препарату, проявляють стимулюючу дію на всі процеси обміну в організмі (білковий, вуглеводневий та жировий), підвищують резистентність організму до впливу несприятливих факторів, сприяють росту і розвитку тварин.

Фосфор, який входить до складу препарату, впливає майже на всі асиміляційні процеси, які відбуваються в організмі. Він міститься в такій формі, яка швидко виділяється з організму. Органічні препарати фосфору, завдяки їх виключно фізіологічному типу дії, є прекрасними загальними метаболічними стимуляторами. Це також підтверджується тим фактом, що побічні ефекти, такі як серцебиття, тремор, підвищене потовиділення і т.п., які часто спостерігаються при застосуванні інших тонізуючих засобів, не спостерігаються. Крім того, здатність до реагування органів з гладкою мускулатурою підвищується.

Катозал® 10% в терапевтичних дозах діє, в основному, на скелетну систему, стимулює органи з гладкими м'язами (сечовидільна система, жовчний міхур) та серцевий м'яз. Гострі та хронічні метаболічні розлади добре корегуються Катозалом® 10%.

Вітамін В₁₂ (ціанокобаламін) стимулює білковий, вуглеводневий та жировий обміни, позитивно впливає на червоні кров'яні тілця, стимулює їх ріст.

Застосування

Тонізуючий засіб, який стимулює обмін речовин у коней, великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, собак, котів, хутрових звірів та птиці при:

- порушенні обміну речовин, викликаних поганою годівлею, утриманням або різними захворюваннями;
- порушенні годівлі, розвитку і внаслідок хвороб, при вирощуванні молодняка;
- стимуляції родової діяльності та як допоміжний засіб при кальціемії;
- післяродових захворюваннях (виснаженнях), після важких родів, а також, як допоміжний засіб при лікуванні неплідності;
- тетанічних синдромах і парезі;
- ослабленому стані у тварин;
- вторинній анемії, анеміях при гельмінтозах;
а також для:
- підвищення резистентності організму;
- прискорення і скорочення процесу линьки у птиці, а також при канібалізмі;
- підвищення м'язової активності здорових тварин.

Дозування

Внутрішньовенно, внутрішньом'язово, підшкірно або з питною водою (птиця).

Дози становлять:

коні і велика рогата худоба — 10-25 мл;

лошата і телята — 5-12 мл;

1 8. 0 7. 2016

вівці та кози — 2,5-8 мл;
ягнята — 1,5-2,5 мл;
свині — 2,5-10 мл;
поросята — 1-2,5мл;
собаки — 0,5-5,0 мл;
коти і хутрові звірі — 0,5-2,5 мл.

За необхідності препарат вводять повторно наступної доби.

Для птиці Катозал® 10% додають до питної води з розрахунку:
кури і курчата — 1-1,5 мл препарату на 1 л води;
бройлери і кури-несучки — 2-3 мл препарату на 1 л води.

При хронічних захворюваннях тваринам вводять половину дози.
За необхідності лікування повторюють через 5-14 діб.

Протипоказання

Даних немає.

Застереження

Відсутні.

Форма випуску

Темні скляні флакони, об'ємом 100 мл.

Зберігання

Зберігати препарат у закритому упакованні виробника, сухому, недоступному для дітей та тварин, місці, окремо від харчових продуктів та кормів при температурі від 5 до 25 °С.

Термін придатності — 5 років. Після відкриття флакону — 28 діб.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

Байер Енімал Хелс ГмбХ
D-51368, Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH
D-51368, Leverkusen, Germany

Виробник готового продукту:

Байер Хелс Кеа ЛЛС
Шоуні Мішн Паквей12707
Шоуні, Канзас 66201-0390, США

Bayer Health Care LLC
12707, Shawnee Mission Parkway, Shawnee
Kansas 66201-0390, USA

