

АМПРОЛІНВЕТ
(розчин для перорального застосування)
листівка–вкладка

Опис

Масляниста рідина від світло-жовтого до темно жовтого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

ампроліуму гідрохлорид – 125,0 мг.

Допоміжні речовини: вода очищена, гліцерин, пропіленгліколь.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP51, антипротозойні ветеринарні препарати (QP51AX09, ампроліум)

Активнодіюча речовина препарату, ампроліуму гідрохлорид, володіє широким спектром антикокцидійної дії, ефективний щодо еймерій курей *Eimeria tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. praecox*, *E. maxima*, *E. brunetti*, *E. mitis*; індиків – *E. adenoides*, *E. gallapavonis*, *E. meleagridis*.

Ампроліум краще, ніж тіамін, проникає в еймерію і порушує активні центри прив'язки вітаміну, що спричиняє розлад вуглеводного обміну та призводить до загибелі паразитів.

Ампроліуму гідрохлорид в основному пригнічує розвиток еймерій на стадії шизогонії першої та другої генерації. Діюча речовина не проникає через клітинні мембрани слизової оболонки кишечника птиці, тому препарат практично нетоксичний у терапевтичних дозах. Основна частина ампроліуму (до 97%) виводиться з організму у незміненому вигляді. Препарат не пригнічує формування протикокцидійного імунітету, сумісний з вітамінами і кормовими добавками, що застосовуються в тваринництві та птахівництві.

Застосування

Лікування свійської птиці (курей-бройлерів та ремонтного молодняку) при ураженні еймеріями: *E. tenella*, *E. necatrix*, *E. acervulina*, *E. praecox*, *E. maxima*, *E. brunetti*, *E. mitis*.

Дозування

Препарат випоюють з питною водою в дозах:

Бройлери: 2 мл на 1 л питної води (250 мг ампроліуму гідрохлориду на 1 л води) протягом 5-7 діб.

Ремонтний молодняк курей: 2 мл на 1 л питної води (250 мг ампроліуму гідрохлориду на 1 л води) протягом 5-7 діб.

У період проведення лікувальних заходів розчин препарату повинен бути для птиці єдиним джерелом питної води.

Протипоказання

Не застосовувати птиці із підвищеною чутливістю до ампроліуму гідрохлориду.

Не застосовувати ослабленим, виснаженим та хворим тваринам та птиці.

Не застосовувати курям-несучкам.

Не застосовувати одночасно з іншими антикокцидійними препаратами.

Застереження

Забій птиці на м'ясо дозволяють через 0 діб після останнього застосування препарату.

Одночасне застосування тіаміну у високих дозах і ампроліуму може пригнічувати, або знижувати ефективність препарату.

Форма випуску

Флакони з нейтрального скла марки НС-1 НС-2, УСП-1 по 50 та 100 мл. Вторинна упаковка – картонна коробка. Контейнери (флакони) полімерні по 500 мл та 1 л.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25 °С у тарі виробника на стелажах або ярусами (не більше трьох).

Термін придатності

2 роки.

Після розведення у питній воді препарат придатний для застосування протягом 16 годин.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30 , Україна

Виробник готового продукту

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30 , Україна