



ПІРОКІЛ
(розчин для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Прозорий розчин світло-жовтого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину у перерахуванні на суху речовину:

імідокарбу дипропіонат — 120 мг;

допоміжні речовини: кислота пропіонова, вода для ін'єкцій.

Фармакологічні властивості

ATC vet код QP51 — антипротозойні ветеринарні препарати, QP51EX01, імідокарб.

Імідокарбу дипропіонат — похідне ікарбаниліду. Має широкий спектр антипротозойної дії проти збудників піроплазмідозів коней і собак при моно- або змішаних інвазіях: бабезій: *B. caballi*, *B. equi* (*Nuttallia equi*); *B. canis*, *B. gibsoni*, *B. vogeli*; тейлерій — *Theileria equi*, *T. felis*; рикетсій з роду анаплазм — *Anaplasma phagocytophilum*, *Anaplasma platys* та роду ерліхій — *Ehrlichia canis*, *E. chaffeensis*.

Механізм антипротозойної дії базується на гальмуванні процесу аеробного метаболізму глюкози й синтезу ДНК піроплазмід та рикетсій, що спричиняє загибель паразитів.

Після парентерального введення препарат швидко всмоктується й досягає максимальної концентрації у крові через 1-2 години. Метаболізується у незначній мірі, накопичується переважно в нирках і печінці, виводиться з організму повільно, в основному з калом, невелика кількість — з сечею. Імідокарбу дипропіонат за ступенем впливу на організм належить до помірно небезпечних речовин.

Застосування

Лікування коней і собак за гострого, хронічного, субклінічного та атипового бабезіозу, тейлеріозу, анаплазмозу, ерліхіозу та змішаних інвазій.

Хіміопрофілактика бабезіозу — введення препарату відразу після виявлення кліща, що впився, тваринам з групи ризику (мисливським собакам). Захисна дія триває 14 - 21 діб після введення.

Дозування

Коні (внутрішньом'язово):

За інвазії *Babesia caballi* - 2,0 мл на 100 кг маси тіла, що відповідає 2,4 мг імідокарбу дипропіонату на 1 кг маси тіла; курс — 2 ін'єкції з інтервалом у добу;

За інвазії *Babesia equi* - 3,0 мл на 100 кг маси тіла, що відповідає 3,6 мг імідокарбу дипропіонату на 1 кг маси тіла; курс — 4 ін'єкції з інтервалом у 3 доби.

Собаки (внутрішньом'язово або підшкірно):

0,3-0,5 мл на 10 кг маси тіла, що відповідає 3,6-6,0 мг імідокарбу дипропіонату на 1 кг маси тіла; курс — 2 ін'єкції з інтервалом у добу; за потреби повторити через 14 діб в дозі 0,2 мл на 10 кг маси тіла, одноразово.

Протипоказання

Не застосовувати препарат тваринам з підвищеною індивідуальною чутливістю до складників препарату! Не застосовувати препарат протягом 4-х тижнів після вакцинації живою вакциною проти бабезіозу або анаплазмозу!

Застереження

Препарат не застосовувати для лікування коней, продукція яких використовується в їжу людям.



Побічна дія

У деяких випадках, в місці введення препарату, можливі локальні зміни шкірних покривів (гіперемія, хвороблива припухлість), що мимовільно проходять. У разі появи алергічних реакцій, застосування препарату припиняють та проводять симптоматичну терапію.

Собакам при розвитку побічних реакцій або для їх профілактики, вводять розчин атропіну сульфату в рекомендованих терапевтичних дозах.

Коні: введення препарату може порушити моторику товстого кишечника, в такому разі застосовують симптоматичне лікування.

Особливі застереження при використанні

Заборонено застосовувати препарат внутрішньовенно.

Препарат вводити тваринам з дотриманням правил асептики і антисептики.

Використання під час вагітності, лактації, несучості

Спеціальні дослідження, щодо застосування препарату у вагітних та лактуючих тварин, а також молодняку тварин не проводились. У цих випадках застосування препарату можливе за призначенням ветеринарного лікаря, якщо очікувана користь для матері перевищує ризик прояву ускладнень розвитку плода.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Ефективність лікування посилюється та відновлення фізіологічних показників гемопоезу відбувається швидше за застосування ПІРОКІЛ одночасно з препаратами доксицикліну або тетрацикліну. За масової загибелі паразитів крові і руйнування еритроцитів після застосування препарату у тварин можливе виникнення інтоксикації. У таких випадках проводять терапію, яка включає внутрішньовенне введення розчинів електролітів і гепатопротекторів.

Не застосовувати одночасно препарат із хлорорганічними, фосфорорганічними препаратами та іншими інгібіторами холінестерази.

Період виведення (каренції)

Не застосовують продуктивним тваринам.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

При проведенні лікувально-профілактичних заходів з використанням препарату необхідно дотримуватися загальних правил особистої гігієни і техніки безпеки, які передбачені під час роботи з ветеринарними препаратами.

У разі потрапляння препарату на шкіру або очі, промити їх невеликою кількістю проточної води. Чутливим до діючих речовин препарату людям слід уникати контакту з ним. У разі появи алергічних реакцій або потрапляння препарату в організм, слід негайно звернутися до медичного закладу.

Форма випуску

Скляні флакони ємкістю по 10 або 50 мл, вкладені по одному в картонну пачку.

Скляні ампули ємкістю по 1, 2, 5 мл, вкладені у контурні чарункові упаковки. По 10 ампул разом з листівкою-вкладкою в картонну пачку з маркуванням відповідно до затверджених макетів.

Зберігання

Зберігати у сухому темному та недоступному для дітей місці за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності після першого відбору із флакона за умови зберігання в герметично закритій тарі за температури від 2 до 8 °С - 28 діб

Термін придатності

2 роки.

Лише для ветеринарної медицини!

Власник реєстраційного посвідчення і виробник

ТОВ «ВП «Укрзооветпромстач»,
вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка,
Бучанський р-н., Київська обл.,
08030, Україна.
www.ukrzoovet.com.ua

