

10.03.2025

Бровадазол таблетки
(таблетки)
листівка-вкладка

Опис

Таблетки білого або світло-сірого кольору, круглої або овальної форми, циліндричні, пласкі.

Склад

1 таблетка (1 г) містить діючу речовину:

фенбендазол — 50,0 мг.

Допоміжні речовини: лактоза, кальцію карбонат, глюкоза, крохмаль, тальк, кальціюстеарат, кроскармелоза натрію, орісіл.

Фармакологічні властивості

АТСvet класифікаційний код: QP52 — антигельмінтні ветеринарні препарати. QP52AC13 — фенбендазол.

Фенбендазол має високу антигельмінтну активність і широкий спектр нематодоцидної та цестодоцидної дії. Він порушує енергетичний обмін, руйнує мікроканальці травних клітин та спричиняє нейротоксичний ефект у гельмінтів. Згубно діє на личинки різних стадій та порушує цілісність оболонок яєць гельмінтів, які при потраплянні в навколишнє середовище не спроможні далі розвиватися.

Після перорального застосування швидкість всмоктування фенбендазолу невисока, але в одношлункових тварин вона вище. Залежно від дози і виду тварини вміст фенбендазолу в сироватці крові досягає максимуму через 6-30 годин. Середній період напіввиведення — 10-27 годин. У свиней після введення дози 5 мг/кг максимальний рівень незміненого препарату (0,45 мг/л) відзначається через 6-12 годин. Середній період напіввиведення становить 10 годин. Концентрація падає нижче межі виявлення через 48 годин. Фенбендазол слабо зв'язується з білками плазми крові. Метаболізується до оксфендазолу (сульфоксиду), оксфендазолсульфонових та оксфендазоламінних метаболітів, що знаходяться в плазмі. Основним метаболітом, який виводиться з сечею, є 4-гідроксифенбендазол, а також оксфендазол та оксфендазолсульфон. Лікувальний ефект досягається завдяки сумарній дії фенбендазолу та його основних метаболітів — фенбендазолсульфоксиду (оксфендазолу) і оксфендазолсульфону. Період напіввиведення дорівнює 2,8-9 годин. Більша частина фенбендазолу виводиться з калом у незміненому вигляді та у вигляді метаболітів, близько 1% — з сечею. Резорбований препарат накопичується, головним чином, в печінці і жировій тканині. Близько 40% препарату, що надходить з жовчю в просвіт тонкого кишечника, реабсорбується, що продовжує контакт антигельмінтика з кишковими паразитами. В організмі перетворюється на фенбендазол, оксфендазол та інші метаболіти.

Фенбендазол не чинить ембріотоксичного, тератогенного, сенсibiliзуючого впливу, не подразнює шкіру і слизові оболонки, не впливає на перебіг вагітності у тварин.

Застосування

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, спортивних коней, м'ясоїдних (собаки, коти) і хутрових звірів (лисиці, песці, нутрії, норки, фретки, декоративні кролики), курей, гусей при ураженні зрілими і незрілими формами нематод, деякими видами цестод і трематод.

Дозування

Перед застосуванням таблетки подрібнюють, змішують з кормом і дають на початку ранкової годівлі.

Дози препарату для різних видів тварин вказані в таблиці.

Вид тварин і захворювання	Доза, табл./10 кг маси тіла	Курс застосування
Велика рогата худоба:		
нематоди дихальних шляхів та травного каналу: <i>Dictyoacaulus viviparus</i> , <i>Haemonchus placei</i> , <i>Ostertagia</i> spp., <i>Nematodirus</i> spp., <i>Oesophagostomum</i> spp., <i>Cooperia oncophora</i> , <i>Trichostrongylus</i> spp., <i>Bunostomum</i> spp., <i>Chabertia</i> spp., <i>Strongyloides</i> spp.	2	одноразово

трематоди: <i>Dicrocoelium lanceatum</i>	6,6	одноразово
Дрібна рогата худоба:		
нематоди дихальних шляхів: <i>Dictyocaulus filaria</i> цестоди преімагінальні та імагінальні: <i>Moniezia expansa</i>	2	одноразово
нематоди травного каналу: <i>Trichuris spp.</i>	3	2 доби
трематоди печінки: <i>Dicrocoelium lanceatum</i>	4,4	2 доби
Свині (нематоди травного каналу):		
<i>Ascaris suum</i>	1,5	2 доби
<i>Trichuris suis</i>	2	2 рази на добу
<i>Oesophagostomum dentatum</i> , <i>Strongyloides ransomi</i>	2	одноразово
Поросята віком 2-8 тижнів:		
<i>Ascaris suum</i> , <i>Trichuris suis</i>	0,2	1 раз на тиждень
Свині (маточне поголів'я):		
нематоди: <i>Ascaris suum</i> , <i>Trichuris suis</i> , <i>Oesophagostomum dentatum</i> , <i>Strongyloides ransomi</i>	1,5	2 рази на добу
Спортивні коні (нематоди травного каналу):		
<i>Parascaris equorum</i> , <i>Strongylus spp.</i> , <i>Cyathostomum spp.</i> , <i>Cylicocyclus spp.</i> , <i>Cylicodontophorus spp.</i> , <i>Cylicostephanus spp.</i> , <i>Oxyuris equi</i>	3	одноразово
Лошата віком 1-2 місяці:		
<i>Strongylus spp.</i>	1,6	2 доби
М'ясоїдні та хутрові звірі (нематоди травного каналу):		
<i>Toxocara spp.</i> , <i>Trichuris spp.</i> , <i>Passalurus ambiguus</i>	0,5-0,75	3 дні
Кури (нематоди травного каналу):		
<i>Ascaridia galli</i>	1 (на птицю)	2 доби
<i>Heterakis gallinarum</i>	2 (на птицю)	одноразово
Гуси (нематоди травного каналу та дихальних шляхів):		
<i>Ganguleterakis dispar</i> , <i>Tetrameres fissispina</i> , <i>Amidostomum anseris</i> , <i>Streptocara crassicauda</i> , <i>Echinuria uncinata</i> , <i>Capillaria spp.</i> , <i>Syngamus trachea</i>	8 (на птицю)	одноразово

Протипоказання

Не застосовувати одночасно з протифасціольозними препаратами, а також впродовж 7 діб після лікування бромсаланами.

Застереження

Побічна дія

При дотриманні терапевтичних доз побічної дії не спостерігають.

Особливі застереження при використанні

Не застосовувати одночасно з протифасціольозними препаратами.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Препарат несумісний з протифасціольозними препаратами.

Період виведення (каренції)

Після останнього застосування препарату забій ВРХ, свиней на м'ясо дозволяється через 13 діб, овець, кіз – 12 діб, курей, гусей – 3 доби. Молоко корів дозволяється вживати в їжу людям через 3 доби, яйця курей – 0 діб. Отримане до зазначеного терміну м'ясо та молоко утилізують або згодовують непродуктивним тваринам залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Полімерні блістери по 10 таблеток (по 3, 10 шт. у картонній коробці).

Зберігання

У сухому темному, недоступному для дітей місці за температури від 4 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна.

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна.