

Додаток 2

до реєстраційного посвідчення АВ-09857,-01-25

11.07.2025

РОНІДАЗОЛ

(таблетка для перорального застосування)

листівка-вкладка

Опис

Таблетки округлої форми від білого до жовтого кольору, в оболонці, зі специфічним запахом складових компонентів.

Склад

1 грам препарату містить діючу речовину:

ронідазол - 250 мг.

Допоміжні речовини: цукор, полівінілпіролідон, крохмаль картопляний, стеарат кальцію, тальк, альбумін, сухе молоко, ароматизатор, лактоза.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP51 - антипротозойні ветеринарні препарати. QP51CA02 - Ронідазол

Ронідазол належить до групи нітроїмідазольних сполук. Він діє на найпростіші родів *Trichomonas*, *Hexamita*, *Cochlosoma*, *Histomonas*, *Entamoeba* і *Giardia*. З'єднання продуктів реакції ронідазолу з ДНК найпростіших клітин або бактерій призводить до її загибелі. Створення міцних сполук значно посилює кислий внутрішньоклітинний рівень рН, що, крім іншого, підтверджує вибірккову дію похідних 5-нітроїмідазолу щодо анаеробних бактерій та деяких найпростіших. Крім того, в результаті реакції ронідазолу створюються продукти, що являють собою внутрішньоклітинні донори вільних аеробних радикалів, які додатково ушкоджують інші, ніж ДНК, молекули внутрішньоклітинних. Це посилює клітинне руйнування і призводить до найшвидшої загибелі найпростіших або бактерій.

Після перорального застосування ронідазол майже повністю швидко абсорбується з травного каналу та досягає максимальної концентрації в плазмі крові ($8,5 \pm 2,5$ мкг/мл) через 12-14 годин. Його біо доступність становить понад 90%. Термін дії ронідазолу в плазмі після перорального застосування для більшості тварин та птахів становить приблизно 11 годин, блокуючи репродукцію клітин найпростіших шляхом інгібування синтезу ДНК. Об'єм розподілу ронідазолу у голубів становить приблизно 0,86 л/кг. Кліренс ронідазолу у голубів становить лише 0,056 л/год/кг. Екскреція ронідазолу та його метаболітів відбувається повільно та неповно, в основному через нирки та кишечник.

Застосування

Метафілактика та лікування голубів, хворих на трихомоноз та гексамітоз, що спричинені найпростішими родів *Trichomonas* та *Hexamita*, що чутливі до ронідазолу.

Дозування

Перорально з вологим кормом. Перед застосуванням таблетки розтирають або подрібнюють та змішують з невеликою порцією вологого корму, та дають голубам перед основним годуванням.

Метафілактика: доза становить 25 мг ронідазолу на 1 кг маси тіла голуба, що еквівалентно 1 таблетка масою 120 мг (містить 30 мг ронідазолу) на 3 голуба або 1 таблетка масою 480 мг (містить 120 мг ронідазолу) на 12 голубів протягом 1-3 доби.

Лікування: доза становить 25 мг ронідазолу на 1 кг маси тіла голуба, що еквівалентно 1 таблетка масою 120 мг (містить 30 мг ронідазолу) на 3 голуба або 1 таблетка масою 480 мг (містить 120 мг ронідазолу) на 12 голубів. Курс лікування: 3-5 діб.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Не застосовувати птиці з ознаками вірусної інфекції, порушеннями функції печінки та сечовидільної системи.

Не використовувати під час линьки.

Не застосовувати продуктивній птиці!

Не застосовувати племінним голубам.

Застереження

Побічна дія

При застосуванні препарату відповідно до листівки-вкладки зазвичай побічні явища і ускладнення, як правило, не відзначаються.

В рідкісних випадках у птиці спостерігалось знижене споживання води та порушення сперматогенезу.

Особливі застереження при використанні

Препарат застосовувати згідно з листівкою-вкладкою.

Слід дотримуватися рекомендованих доз.

Використання під час вагітності, лактації, несучості

Досліджень не проводилось. Застосування птиці в період несучості дозволяється лише відповідно до оцінки користі/ризиків препарату лікарем ветеринарної медицини.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не рекомендовано застосовувати одночасно з протимікробними та протипаразитарними ветеринарними лікарськими засобами.

Форма випуску

Таблетки масою 120 мг, фасовані в полімерні контейнери по 50 таблеток, та таблетки масою 480 мг, фасовані в полімерні контейнери по 20 таблеток. Вторинна упаковка - картонна коробка разом із листівкою-вкладкою.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей та тварин, місце за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30, Україна

Виробник готового продукту

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

61002, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30, Україна