

ТИЛМІКОВЕТ 25%
(розчин для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Масляниста рідина від світло-жовтого до темно-жовтого кольору.

Склад

1мл препарату містить діючу речовину:

тилмікозин (у формі тилмікозину фосфату) - 250 мг.

Допоміжні речовини: 1.2 - пропілен гліколь, трилон Б, кислота ортофосфорна, вода очищена.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01FA91 - Тилмікозин.

Тилмікозин - напівсинтетичний антибіотик групи макролідів. Він володіє широким спектром дії проти грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів, а особливо проти *Pasteurella spp.*, *Haemophilus spp.*, *Actinomyces spp.*, *Corynebacterium spp.* та *Mycoplasma spp.*

Механізм дії препарату полягає в блокуванні синтезу білка в бактеріальній клітині в результаті утворення комплексу з 50S-субодиницями рибосом.

Тилмікозин після перорального застосування добре всмоктується з травного каналу, проникає в усі органи й тканини організму, де створює антибактеріальні концентрації протягом 48 годин. Найвищу концентрацію тилмікозину за перорального застосування препарату курчатам-бройлерам виявляли у легенях.

Тилмікозин швидко проникає в тканини органів дихання. Вже через 6 годин після перорального застосування тилмікозину курям-бройлерам в дозі 75 мг на 1 л питної води середні його концентрації у легеневій та альвеолярній тканинах становили 0.63 мкг/г та 0,30 мкг/г, відповідно. Через 48 годин концентрації тилмікозину в легеневій та альвеолярній тканинах становили 2.3 мкг/г та 3.29 мкг/г, відповідно.

Виводиться тилмікозин з організму курчат, в основному, в незміненому вигляді, головним чином, шляхом клубочкової фільтрації, а також екстретується без змін у травний канал з жовчю, інактивуючись у подальшому шляхом утворення хелатних сполук, а потім виводиться з фекаліями.

Застосування

Свійська птиця (курчата, кури-бройлери): лікування птиці при захворюваннях органів дихання, що спричинені *Mycoplasma gallisepticum*, *M. synoviae*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Pasteurella multocida* та іншими мікроорганізмами, чутливими до тилмікозину.

Дозування

Перорально у дозі 30 мл препарату на 100 л питної води (що еквівалентно 75 мг тилмікозину на 1 літр питної води або 15-20 мг тилмікозину на 1 кг маси тіла тварини) щодобово протягом 3 діб.

У період лікування птиця повинна отримувати тільки воду з препаратом, як єдине джерело питної води; кожні 24 години необхідно готувати свіжий розчин препарату.

Протипоказання

Препарат не застосовують тваринам із підвищеною чутливістю до тилмікозину.

Не застосовувати курям-несучкам. яйця яких використовують для споживання людьми.

Не застосовувати тваринам із порушеннями функції печінки.

Не застосовувати препарат в суміші з кормом, який містить бентоніти, так як вони можуть знижувати ефективність тилмікозину.

Не застосовувати одночасно з іншими макролідами або лінкозамідами.

Заборонено застосовувати для коней та іншим непарнокопитним.

Застереження

Побічна дія

Побічних явищ та ускладнень при застосуванні препарату в рекомендованих дозах не спостерігають. У дуже рідкісних випадках спостерігалось зниження вживання води.

Особливі застереження при використанні

Використання ветеринарного лікарського засобу з відхиленням від інструкцій, наведених у КХП, може збільшити поширеність бактерій, стійких до тилмікозину, та знизити ефективність лікування іншими макролідами, лінкозамидами та стрептограміном В через потенційну перехресну резистентність.

Слід контролювати споживання води птицею, щоб гарантувати адекватне дозування. У випадку, якщо споживання води не відповідає кількості, для якої була розрахована рекомендована доза, концентрація цього ветеринарного лікарського засобу повинна бути адаптована таким чином, щоб тварини отримувала рекомендовану дозу, або слід розглянути застосування іншого препарату.

Необхідно готувати свіжий розчин безпосередньо перед вживанням та використати його протягом 24 годин.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

При одночасному застосуванні із іншими макролідами та лінкоміцином, може спостерігатись перехресна резистентність. Не застосовувати препарат в суміші з кормом, який містить бентоніти, так як вони можуть знижувати ефективність тилмікозину. Тилмікозин може знижувати антибактеріальну активність бета-лактамних антибіотиків.

Період виведення (каренція)

Забій птиці на м'ясо дозволяють через 12 діб після останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Ампули з нейтрального скла або полімерні по 0.5; 1; 2; 5; 10 мл, флакони полімерні по 200; 250; 400; 450; 500; 1000; 5000 мл. Вторинна упаковка - картонна коробка.

Зберігання

Суше темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 30 °С.

Термін придатності - 2 роки.

Термін придатності після першого відкриття контейнера становить 3 місяці за умов зберігання у сухому, темному місці за температури від 5 до 25 °С.

Після розведення препарату у воді такий розчин необхідно використати протягом 24 годин.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30, Україна

Виробник готового продукту

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30, Україна