



РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України «Про ветеринарну медицину», постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 «Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів» та на підставі експертного висновку 20.10.2025 № 403-К/06, рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів 31.10.2025 № 1111 зареєстровано:

продукт Мільбегард® Дуо для собак

форма Жувальні таблетки

Власник реєстраційного посвідчення:

Сева Санте Анімаль

8 рю де Логроньо, 33500 Лібури, ФРАНЦІЯ

зареєстровано в Україні за № AA-09895-01-25 від 31.10.2025

Виробник:

Сева Санте Анімаль

Бouleвард де ла Коммунікатіон Зоне Авторут'єре, 53950 Лувєрне, ФРАНЦІЯ

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) поєинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка препарату (додаток 2);
- етикетка (додаток 3).

Реєстраційне посвідчення дійсне до: 30.10.2030

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного продукту.

Заступник Голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів –
Головний державний ветеринарний інспектор України

Deputy Head of the State Service of Ukraine on Food Safety and
Consumer Protection – Chief State Veterinary Inspector of Ukraine



Володимир КУСТУРОВ

Volodymyr KUSTUROV

Державна служба України з питань
безпеки харчових продуктів
та захисту споживачів

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
КОНТРОЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНИХ
ПРЕПАРАТІВ ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК

АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ
ТА КОРМОВИХ ДОБАВОК

вул. Донецька, 11, м. Львів, 79019
тел.: (032) 252 82 84; факс: (032) 252 11 93
e-mail: agency@scivp.lviv.ua www.scivp.lviv.ua
ЄДРПОУ 00485670



The State Service of Ukraine on Food Safety and
Consumer Protection

STATE SCIENTIFIC RESEARCH CONTROL
INSTITUTE OF VETERINARY MEDICAL
PRODUCTS AND FEED ADDITIVES

AGENCY OF VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS
AND FEED ADDITIVES

Donetska str., 11, Lviv, 79019, Ukraine
tel.: +38 032 252 82 84; fax: +380 32 252 11 93
e-mail: agency@scivp.lviv.ua www.scivp.lviv.ua
EDRPOU 00485670

20.10.2025 № 403-K/06

ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА УКРАЇНИ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Сева Санте Анімаль Україна», УКРАЇНА
за дорученням
Сева Санте Анімаль, ФРАНЦІЯ.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

за результатами наукової експертизи реєстраційного дос'є та аналітичних випробувань препарату
Мільбегард® Дуо для собак
власник Сева Санте Анімаль, (ФРАНЦІЯ)
виробник Сева Санте Анімаль, (ФРАНЦІЯ)
згідно з контрактом № 75 від 16.04.2024 р.

За результатами проведеної наукової експертизи реєстраційного дос'є та випробувань
препарату Мільбегард® Дуо для собак, Жувальні таблетки, власник Сева Санте Анімаль,
(ФРАНЦІЯ), виробник Сева Санте Анімаль, (ФРАНЦІЯ) рекомендовано його реєстрацію в Україні.

Реєстраційне посвідчення: АВ-09895-01-25

Директор Інституту,
д.вет.наук, професор,
член-кореспондент НААН

Голова Агентства,
доктор філософії

Володимир СТИБЕЛЬ

Микола ВЕРХОЛЮК

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Мільбегард® Дуо для собак

2. Склад

100 г препарату містять діючі речовини (г):

мільбеміцину оксим – 1,79;

празіквантел – 17,86.

Допоміжні речовини: повідон, натрію кроскармелоза, лактози моногідрат, ароматизатор курячий штучний, дріжджі, целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат.

Мільбегард® Дуо для собак випускають у трьох дозуваннях:

Мільбегард® Дуо 2,5 мг/25 мг для собак масою тіла від 0,5 кг (таблетки масою 140 мг, що містять 2,5 мг мільбеміцину оксим та 25 мг празіквантелу);

Мільбегард® Дуо 12,5 мг/125 мг для собак масою тіла від 2,5 кг (таблетки масою 700 мг, що містять 12,5 мг мільбеміцину оксим та 125 мг празіквантелу);

Мільбегард® Дуо 25 мг/250 мг для собак масою тіла від 5 кг (таблетки масою 1400 мг, що містять 25 мг мільбеміцину оксим та 250 мг празіквантелу).

3. Фармацевтична форма

Жувальні таблетки.

4. Фармакологічні властивості

АТСvet класифікаційний код: QP54, ендектоциди (QP54AB51, мільбеміцин, комбінації).

Мільбеміцину оксим належить до групи макроциклічних лактонів, виділених в результаті ферментації *Streptomyces hygroscopicus*, типу *Aureolacrimosus*, активний щодо личинок та імаго нематод, які паразитують у травному каналі собак, а також щодо личинок нематод *Dirofilaria immitis*.

Механізм дії мільбеміцину зумовлений підвищенням проникності клітинних мембран для іонів хлору (Cl⁻), через глутамат-керовані хлоридні іонні канали (споріднені з ГАМК- і гліциновими рецепторами хребетних), що призводить до поляризації мембран клітин нервової і м'язової тканини, паралічу і загибелі паразита.

Празіквантел є похідним ацильованого піразинізохіноліну. Празіквантел активний щодо цестод і трематод. Підвищуючи проникність клітинних мембран паразита для іонів кальцію (приплив Ca²⁺), спричиняє деполяризацію мембран, скорочення мускулатури і руйнування тегументу, що призводить до загибелі паразита і сприяє його виведенню з організму тварин.

Празіквантел, після перорального застосування у собак, швидко досягає пікового рівня вихідної речовини у плазмі крові (1918 мкг/л). Т_{max} становить близько 30 хв і коливається від 15 хв до 10 годин. Концентрації в плазмі швидко знижуються (t_{1/2} близько 1,72 години). Спостерігається значний ефект першого проходження через печінку з дуже швидкою і майже повною печінковою біотрансформацією, головним чином до моногідроксильованих (також деяких ди- і тригідроксильованих) похідних, які переважно кон'юговані з глюкуронідом та/або сульфатом перед виведенням. Зв'язування з плазмою крові становить близько 80%. Виведення швидке і повне (близько 90% за 2 доби); основний шлях елімінації - нирковий.

Після перорального застосування мільбеміцину оксиму собакам пікові рівні у плазмі крові досягають 773 мкг/л і спостерігаються приблизно через 1,25 години. Т_{max} становить від 45 хвилин до 10 годин, плазмові концентрації знижуються з періодом напіввиведення неметаболізованого мільбеміцину оксиму від 1 до 5 діб. Біодоступність становить близько 80%. На додаток до відносно високих концентрацій у печінці, існує деяка концентрація в жировій тканині, що відображає його ліпофільність.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Собаки.

31.10.2025

5.2 Показання до застосування

Препарат застосовують для лікування собак та профілактики змішаних інвазій, спричинених дорослими цестодами - *Dipylidium caninum*, *Taenia spp.*, *Echinococcus spp.*, *Mesocestoides spp.*; нематодами - *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Crenosoma vulpis* (знижує інтенсивність зараження), *Angiostrongylus vasorum* (знижує інтенсивність зараження статевонезрілими дорослими (L5) та дорослими стадіями паразитів; див. специфічні схеми лікування та профілактики захворювань у розділі «5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку»), *Thelazia callipaeda* (див. спеціальну схему лікування у розділі у розділі «5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку»).

Препарат також застосовується для профілактики дирофіляріозу (*Dirofilaria immitis*), якщо показано супутнє лікування проти цестод.

5.3 Протипоказання

Не застосовувати за підвищеної чутливості до діючих речовин або до будь-якої з допоміжних речовин.

Мільбегард® Дуо 2,5 мг/25 мг: не застосовувати цуценятм віком до 2 тижнів та/або масою тіла менше 0,5 кг.

Мільбегард® Дуо 12,5 мг/125 мг: не застосовувати собакам масою тіла менше 2,5 кг.

Мільбегард® Дуо 25 мг/250 мг: не застосовувати собакам масою тіла менше 5 кг.

5.4 Побічна дія

Після застосування препарату в рекомендованих дозах, дуже рідко (<1 тварина / 10 000 пролікованих тварин, включаючи поодинокі повідомлення) може спостерігатись реакція гіперчутливості, системні розлади (млявість, анорексія), неврологічні ознаки (м'язовий тремор, атаксія, судоми), розлади з боку травного каналу (блювання, слинотеча, діарея).

5.5 Особливі застереження при використанні

У регіонах з ризиком захворювання на дирофіляріоз або у випадках, коли собака завозиться або вивозиться з району ризику, необхідно порадитись із лікарем ветеринарної медицини перед застосуванням препарату для виключення захворювання. У випадку діагностування дирофіляріозу (*Dirofilaria immitis*) перед застосуванням препарату тварині рекомендують застосувати спочатку препарати проти дорослих гельмінтів.

Лікування собак з великою кількістю циркулюючих мікрофілярій іноді може призвести до появи реакцій гіперчутливості, таких як блідість слизових оболонок, блювання, тремтіння, утруднене дихання або надмірне слиновиділення. Ці реакції пов'язані з вивільненням білків з мертвих або вмираючих мікрофілярій і не є прямою токсичною дією препарату. Тому не рекомендується застосовувати препарат собакам, які страждають на мікрофіляріоз.

Дослідження на сильно виснажених собаках або тваринах з серйозними порушеннями функції нирок або печінки не проводилися. Таким тваринам препарат рекомендується застосовувати тільки після оцінки співвідношення користь/ризик, проведеної відповідальним лікарем ветеринарної медицини.

Дослідження з мільбеміцину оксимом вказують на те, що межа безпеки у змішаних MDR1 (-/-) собак породи коллі або споріднених порід є нижчою, порівняно з незмішаною популяцією. У цих собак слід суворо дотримуватися рекомендованої дози. Переносимість препарату цуценятами цих порід не досліджували. Клінічні ознаки передозування у собак породи коллі подібні до тих, що спостерігаються у загальній популяції собак за передозування.

У собак віком до 4 тижнів зараження трематодами є нетиповим, тому лікування тварин віком до 4 тижнів комбінованим препаратом може не знадобитися.

Таблетки ароматизовані. Щоб уникнути випадкового споживання таблеток, зберігайте їх в недоступному для тварин місці.

5.6 Застосування під час вагітності, лактації

Нешкідливість застосування цього ветеринарного лікарського засобу у період вагітності та лактації клінічно підтверджена, тому препарат можна застосовувати у період вагітності та лактації, а також у племінному собаківництві.

31.10.2025

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Однчасне застосування препаратів, що містять мільбеміцину оксим і празіквантел, із селамектинсн переноситься добре. Не спостерігалось жодних взаємодій у разі застосування рекомендованої дози макроциклічного лактону селамектину під час лікування препаратом, що містить мільбеміцину оксим та празіквантел у рекомендованій дозі. За відсутності подальших досліджень слід дотримуватися обережності у разі одночасного застосування препаратів, що містять мільбеміцину оксим і празіквантел, та інших макроциклічних лактонів. Крім того, таких досліджень за участю репродуктивних тварин не проводили.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Препарат застосовують собакам одноразово разом з кормом або після нього.

Мінімальна рекомендована терапевтична доза становить: 0,5 мг мільбеміцину оксиму та 5 мг празіквантелу на кг маси тіла.

Тварин слід зважувати для забезпечення точного дозування. Таблетки з розділювальною борозною, що дозволяє ділити їх навпіл. Залежно від маси тіла собаки, дозування виглядає наступним чином:

Маса тіла, кг	Мільбегард® Дуо 2,5 мг/25 мг для собак масою тіла від 0,5 кг	Мільбегард® Дуо 12,5 мг/125 мг для собак масою тіла від 2,5 кг	Мільбегард® Дуо 25 мг/250 мг для собак масою тіла від 5 кг
0.5 - 1	1/2 таблетки		
>1 – 5	1 таблетка		
2.5 - 5	1 таблетка	1/2 таблетки	
>5-10	2 таблетки	1 таблетка	
>5-25		1 таблетка	1/2 таблетки
>25-50		2 таблетки	1 таблетка
>50-100			2 таблетки

У разі необхідності одночасної профілактики дирофіляріозу (*Dirofilaria immitis*) і лікування проти стьожкових гельмінтів, Мільбегард® Дуо може замінити одновалентний препарат для профілактики дирофіляріозу.

Для лікування тварин за інвазій, спричинених *Angiostrongylus vasorum*, мільбеміцину оксим рекомендовано застосовувати чотири рази з тижневим інтервалом. У випадку, якщо рекомендоване супутнє лікування проти інвазій, спричинених цестодами, прозести одноразову обробку препаратом Мільбегард® Дуо і продовжити лікування одновалентним препаратом, що містить тільки мільбеміцину оксим, протягом решти трьох щотижневих обробок.

В ендемічних районах застосування препарату кожні чотири тижні запобігає ангіостронгілозу, знижуючи інвазію статевонезрілих дорослих (L5) та дорослих паразитів, де показано супутнє лікування інвазій, спричинених цестодами.

Для лікування собак, інвазованих *Thelazia callipaeda*, мільбеміцину оксим слід застосовувати у 2 прийоми з інтервалом у 7 діб. Якщо показано супутнє лікування собак за інвазій, спричинених цестодами, препарат може замінити одновалентний препарат, що містить тільки мільбеміцину оксим.

Недостатнє дозування може призвести до неефективного застосування та сприяти розвитку резистентності.

Необхідність і частота повторних обробок повинні ґрунтуватися на професійних рекомендаціях і враховувати місцеву епідеміологічну ситуацію та спосіб життя тварини.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Жодних інших ознак, окрім тих, що спостерігалися у разі застосування рекомендованих доз, не виявлено (див. «5.4 Побічна дія»).

5.10 Спеціальні застереження

Рекомендується проводити одночасне лікування всіх тварин, які проживають в одному домогосподарстві. Якщо зараження цестодами *Dipylidium caninum* підтверджено, слід обговорити з ветеринарним лікарем супутнє лікування проти проміжних хазяїв, таких як блохи та волососіди,

31.10.2025

щоб запобігти повторному зараженню.

Під час застосування препарату слід чітко дотримуватись рекомендованого дозування, щоб уникнути резистентності та зниження ефективності. Рішення про застосування препарату повинно ґрунтуватися на підтвердженні виду паразитів і навантаження або ризику зараження на основі епізоотичних особливостей для кожної окремої тварини.

Резистентність паразитів до певного класу антигельмінтних засобів може розвинути після частого, багаторазового застосування антигельмінтного засобу цього класу.

Рекомендується досліджувати випадки підозри на резистентність, використовуючи відповідні методи діагностики. Про підтверджену резистентність слід повідомити власника реєстраційного посвідчення або компетентні органи.

За відсутності ризику коінвазії нематодами або цестодами слід застосовувати препарат вузького спектру дії.

У разі застосування цього препарату слід враховувати місцеву інформацію про чутливість цільових паразитів, якщо вона доступна.

5.11 Період виведення (каренції)

Не визначають для непродуктивних тварин.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Препарат слід зберігати в недоступному для дітей місці, щоб уникнути випадкового споживання. Будь-які невикористані частини таблетки слід повернути у відкритий блістер, вкласти назад у зовнішню упаковку та використати під час наступного застосування або безпечно утилізувати.

У разі випадкового проковтування таблеток, особливо дитиною, слід негайно звернутися за медичною допомогою та показати лікарю листівку-вкладку або етикетку.

Препарат може викликати слабку шкірну сенсibiliзацію. Рекомендовано з обережністю застосовувати цей препарат у разі відомої гіперчутливості до діючих речовин або до будь-якої з допоміжних речовин у людини. Якщо під час застосування препарату тварині у людини виникли такі симптоми, як висипання на шкірі, які не зникають, зверніться до лікаря та покажіть йому листівку з інформацією про продукт або етикетку. Вимийте руки після використання.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності

Не встановлені.

6.2 Термін придатності

3 роки.

Термін придатності розділеної навпіл таблетки після першого відкриття блістера: 6 місяців.

6.3 Особливі заходи зберігання

Зберігати в захищеному від світла, недоступному для дітей місці.

Будь-які невикористані частини таблетки слід повернути у відкритий блістер, вкласти назад у зовнішню упаковку і використати під час наступного застосування або безпечно утилізувати.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Таблетки, масою по 140, 700 або 1400 мг у блістерах з поліаміду-алюмінію-полівінілхлориду/алюмінію, запаяні термозварювальним способом, упаковані в картонні коробки.

Картонна коробка, що містить 1 блістер по 2 таблетки (2 таблетки).

Картонна коробка, що містить 2 блістери по 2 таблетки (4 таблетки).

Картонна коробка, що містить 5 блістерів по 2 таблетки (10 таблеток).

Картонна коробка, що містить 12 блістерів по 2 таблетки (24 таблетки).

Картонна коробка, що містить 24 блістери по 2 таблетки (48 таблеток).

Картонна коробка, що містить 50 блістерів по 2 таблетки (100 таблеток).

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з препаратом або із його залишками

Препарат не слід утилізувати разом зі стічними водами або побутовими відходами.

Ветеринарний препарат не повинен потрапляти у водойми, оскільки це може бути небезпечним для риб та інших водних організмів.

Упаковку, залишки препарату потрібно утилізувати згідно з чинним законодавством.

31.10.2025

7. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Сева Санте Анімаль
8 рю де Логроньо,
33500 Лібурн, Франція

Ceva Sante Animale
8 rue de Logrono,
33500 Libourne, France

8. Назва та місцезнаходження виробника готового продукту

Сева Санте Анімаль
Боулевард де ла Коммунікаціон Зоне
Авторутьєре, 53950 Луверне,
Франція

Ceva Sante Animale
Boulevard de la Communication
Zone Autoroutiere, 53950 Louverne,
France

9. Додаткова інформація

31.10.2025

Мільбегард® Дуо для собак
(Жувальні таблетки)
листівка-вкладка

Опис

Таблетки продовгуватої форми, від бежевого до світло-коричневого кольору, з роздільною борозенкою посередині.

Склад

100 г препарату містять діючі речовини (г):

мільбеміцину оксим – 1,79;

празіквантел – 17,86.

Допоміжні речовини: повідон, натрію кроскармелоза, лактози моногідрат, ароматизатор курячий штучний, дріжджі, целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат.

Мільбегард® Дуо для собак випускають у трьох дозуваннях:

Мільбегард® Дуо 2,5 мг / 25 мг для собак масою тіла від 0,5 кг (таблетки вагою 140 мг, що містять 2,5 мг мільбеміцину оксим та 25 мг празіквантелу);

Мільбегард® Дуо 12,5 мг / 125 мг для собак масою тіла від 2,5 кг (таблетки вагою 700 мг, що містять 12,5 мг мільбеміцину оксим та 125 мг празіквантелу);

Мільбегард® Дуо 25 мг / 250 мг для собак масою тіла від 5 кг (таблетки вагою 1400 мг, що містять 25 мг мільбеміцину оксим та 250 мг празіквантелу).

Фармакологічні властивості

ATCvet класифікаційний код: QP54, ендектоциди; QP54AB51, мільбеміцин, комбінації.

Мільбеміцину оксим належить до групи макроциклічних лактонів, виділених в результаті ферментації *Streptomyces hygroscopicus*, типу *Aureolacrimosus*, активний щодо личинок та імаго нематод, які паразитують у травному каналі собак, а також щодо личинок нематод *Dirofilaria immitis*.

Механізм дії мільбеміцину зумовлений підвищенням проникності клітинних мембран для іонів хлору (Cl), через глутамат-керовані хлоридні іонні канали (споріднені з ГАМК- і гліциновими рецепторами хребетних), що призводить до поляризації мембран клітин нервової і м'язової тканини, паралічу і загибелі паразита.

Празіквантел є похідним ацильованого піразинізохіноліну. Празіквантел активний щодо цестод і трематод. Підвищуючи проникність клітинних мембран паразита для іонів кальцію (приплив Ca²⁺), викликає деполяризацію мембран, скорочення мускулатури і руйнування тегументу, що призводить до загибелі паразита і сприяє його виведенню з організму тварин.

Празіквантел, після перорального застосування у собак, швидко досягає пікового рівня вихідної речовини у плазмі крові (1918 мкг/л). Т_{max} становить близько 30 хв і коливається від 15 хв до 10 годин. Концентрації в плазмі швидко знижуються (t_{1/2} близько 1,72 години). Спостерігається значний ефект першого проходження через печінку з дуже швидкою і майже повною печінковою біотрансформацією, головним чином до моногідроксильованих (також деяких ди- і тригідроксильованих) похідних, які переважно кон'юговані з глюкуронідом та/або сульфатом перед виведенням. Зв'язування з плазмою крові становить близько 80%. Виведення швидко і повне (близько 90% за 2 дні); основний шлях елімінації - нирковий.

Після перорального застосування мільбеміцину оксиму собакам пікові рівні у плазмі крові досягають 773 мкг/л і спостерігаються приблизно через 1,25 години. Т_{max} становить від 45 хвилин до 10 годин, плазмові концентрації знижуються з періодом напіввиведення неметаболізованого мільбеміцину оксиму від 1 до 5 днів. Біодоступність становить близько 80%. На додаток до відносно високих концентрацій у печінці, існує деяка концентрація в жировій тканині, що відображає його ліпофільність.

Застосування

Препарат застосовують для лікування та профілактики змішаних інвазій, спричинених дорослими цестодами - *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp., *Echinococcus* spp., *Mesocestoides* spp.;

31.10.2025

нематодами - *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Trichuris vulpis*, *Crenosoma vulpis* (знижує інтенсивність зараження), *Angiostrongylus vasorum* (знижує інтенсивність зараження статевонезрілими дорослими (L5) та дорослими стадіями паразитів; див. специфічні схеми лікування та профілактики захворювань у розділі «5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку»), *Thelazia callipaeda* (див. спеціальну схему лікування у розділі у розділі «5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку»).

Препарат також застосовується для профілактики дирофіляріозу (*Dirofilaria immitis*), якщо показано супутнє лікування проти цестод.

Дозування

Препарат застосовують собакам одноразово разом з кормом або після нього.

Мінімальна рекомендована терапевтична доза становить: 0,5 мг мільбеміцину оксиму та 5 мг празіквантелу на кг маси тіла.

Тварин слід зважувати для забезпечення точного дозування. Таблетки з розділювальною борозною, що дозволяє ділити їх навпіл. Залежно від маси тіла собаки, дозування виглядає наступним чином:

Маса тіла, кг	Мільбегард® Дуо 2,5 мг/25 мг для собак масою тіла від 0,5 кг	Мільбегард® Дуо 12,5 мг/125 мг для собак масою тіла від 2,5 кг	Мільбегард® Дуо 25 мг/250 мг для собак масою тіла від 5 кг
0.5 - 1	1/2 таблетки		
>1 – 5	1 таблетка		
2.5 - 5	1 таблетка	1/2 таблетки	
>5-10	2 таблетки	1 таблетка	
>5-25		1 таблетка	1/2 таблетки
>25-50		2 таблетки	1 таблетка
>50-100			2 таблетки

У разі необхідності одночасної профілактики дирофіляріозу (*Dirofilaria immitis*) і лікування проти стьожкових гельмінтів, Мільбегард® Дуо може замінити одновалентний препарат для профілактики дирофіляріозу.

Для лікування інфекцій, спричинених *Angiostrongylus vasorum*, мільбеміцину оксим рекомендовано застосовувати чотири рази з тижневим інтервалом. У випадку, якщо рекомендоване супутнє лікування проти інвазій, спричинених цестодами, провести однократну обробку препаратом Мільбегард® Дуо і продовжити лікування одновалентним препаратом, що містить тільки мільбеміцину оксим, протягом решти трьох щотижневих обробок.

В ендемічних районах застосування препарату кожні чотири тижні запобігає ангіостронгілозу, зменшуючи інвазію статевонезрілих дорослих (L5) та дорослих паразитів, де показано супутнє лікування інвазій, спричинених цестодами.

Для лікування *Thelazia callipaeda* мільбеміцину оксим слід застосовувати у 2 прийоми з інтервалом у 7 днів. Якщо показано супутнє лікування інвазій, спричинених цестодами, препарат може замінити одновалентний препарат, що містить тільки мільбеміцину оксим.

Недостатнє дозування може призвести до неефективного застосування та сприяти розвитку резистентності.

Необхідність і частота повторних обробок повинні ґрунтуватися на професійних рекомендаціях і враховувати місцеву епідеміологічну ситуацію та спосіб життя тварини.

Протипоказання

Не застосовувати при підвищеній чутливості до діючих речовин або до будь-якої з допоміжних речовин.

Мільбегард® Дуо 2,5 мг/25 мг: не застосовувати цуценятam віком до 2 тижнів та/або масою тіла менше 0,5 кг.

Мільбегард® Дуо 12,5 мг/125 мг: не застосовувати собакам масою тіла менше 2,5 кг.

Мільбегард® Дуо 25 мг/250 мг: не застосовувати собакам масою тіла менше 5 кг.

31.10.2025

Застереження

У регіонах з ризиком захворювання на дирофіляріоз або у випадках коли собака завозиться або вивозиться з району ризику, необхідно порадитись із лікарем ветеринарної медицини перед застосуванням препарату для виключення захворювання. У випадку діагностування дирофіляріозу (*Dirofilaria immitis*) перед застосуванням препарату тварині рекомендують застосувати спочатку препарати проти дорослих гельмінтів.

Лікування собак з великою кількістю циркулюючих мікрофілярій іноді може призвести до появи реакцій гіперчутливості, таких як блідість слизових оболонок, блювання, тремтіння, утруднене дихання або надмірне слиновиділення. Ці реакції пов'язані з вивільненням білків з мертвих або вмираючих мікрофілярій і не є прямою токсичною дією препарату. Тому не рекомендується застосовувати препарат собакам, які страждають на мікрофіляріоз.

Дослідження на сильно виснажених собаках або тваринах з серйозними порушеннями функції нирок або печінки не проводилися. Таким тваринам препарат рекомендується застосовувати тільки після оцінки співвідношення користь/ризик, проведеної відповідальним лікарем ветеринарної медицини.

Дослідження з мільбеміцину оксимом вказують на те, що межа безпеки у змішаних MDR1 (-/-) собак породи коллі або споріднених порід є нижчою порівняно з незмішаною популяцією. У цих собак слід суворо дотримуватися рекомендованої дози. Переносимість препарату цуценятами цих порід не досліджували. Клінічні ознаки передозування у собак породи коллі подібні до тих, що спостерігаються у загальній популяції собак при передозуванні.

У собак віком до 4 тижнів зараження трематодами є нетиповим, тому лікування тварин віком до 4 тижнів комбінованим препаратом може не знадобитися.

Таблетки ароматизовані. Щоб уникнути випадкового споживання таблеток, зберігайте їх в недоступному для тварин місці.

Форма випуску

Таблетки, вагою по 140, 700 або 1400 мг у блістерах з поліаміду-алюмінію-полівінілхлориду/алюмінію, запаяні термозварювальним способом, упаковані в картонні коробки.

Картонна коробка, що містить 1 блістер по 2 таблетки (2 таблетки).

Картонна коробка, що містить 2 блістери по 2 таблетки (4 таблетки).

Картонна коробка, що містить 5 блістерів по 2 таблетки (10 таблеток).

Картонна коробка, що містить 12 блістерів по 2 таблетки (24 таблетки).

Картонна коробка, що містить 24 блістерів по 2 таблетки (48 таблеток).

Картонна коробка, що містить 50 блістерів по 2 таблетки (100 таблеток).

Зберігання

Зберігати в захищеному від світла, недоступному для дітей місці.

Будь-які невикористані частини таблетки слід повернути у відкритий блістер, вкласти назад у зовнішню упаковку і використати при наступному прийомі або безпечно утилізувати.

Термін придатності

3 роки.

Термін придатності розділеної навпіл таблетки після першого відкриття блістера: 6 місяців.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:


Сева Санте Анімаль
8 rue de Logrono,
33500 Лібурн, Франція

Ceva Sante Animale
8 rue de Logrono,
33500 Libourne, France

Виробник готового продукту:

Сева Санте Анімаль
Бouleвард де ла Коммунікаціон Зоне
Авторут'єре, 53950 Луверне,
Франція

Ceva Sante Animale
Boulevard de la Communication
Zone Autoroutiere, 53950 Louverne,
France





31.10.2025



1000

