

Цифлур
(розчин для зовнішнього застосування)
листівка-вкладка

Опис

Прозора масляниста рідина жовтуватого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

цифлутрин – 10,0 мг.

Допоміжні речовини: сольвессо 200, етанол G, масло вазелінове.

Фармакологічні властивості

ATC vet QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AC12, цифлутрин)

Препарат Цифлур - інсекто-акарицид контактної дії, репелент щодо: зоофільних мух (*Haematobia stimulans*, *Lyperosia irritans*, *L. titilans*, *Stomoxys calcitrans*, *Musca autumnalis*, *M. larvipara*, *M. amica* тощо); комарів (*Aedes*, *Anopheles*, *Culex*); мошок (*Boophthora*, *Simulium*, *Schaenbaueria*); мокреців (*Culicoides*, *Forcipomya*, *Zentocononops*); гедзів родів *Chrysops*, *Haematopota*, *Tabanus*; оводів (*Hypoderma bovis* та *H. lineatum*), іксодових кліщів (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus rossicus*, *Dermacentor marginatus*), які паразитують на тваринах.

Діюча речовина препарату цифлутрин належить до групи синтетичних піретроїдів другого типу, які вибірково зв'язуються з рецепторами нервових клітин ектопаразитів та порушують роботу натрієвих каналів нервових клітин, що призводить до затримки реполяризації мембран, гальмування проходження нервових імпульсів, порушення координації рухів, паралічу і швидкої загибелі комах.

Після нанесення на шкіру препарат розподіляється по всій поверхні тіла, в незначних кількостях резорбується шкірою, що забезпечує його тривалу інсекто-акарицидну і репелентну дію.

Препарат Цифлур належить до малотоксичних для теплокровних тварин речовин і в рекомендованих дозах не проявляє подразнюючої та токсичної дії.

Застосування

Захист великої рогатої худоби від інвазії зоофільних мух, комарів, кліщів, мошок, мокреців, гедзів та оводів у пасовищний період.

Дозування

Велика рогата худоба: доза препарату становить 5 мл на одну тварину масою до 300 кг та 10 мл на одну тварину масою понад 300 кг; повільно та злегка втираючи, препарат наносять за допомогою дозуючого пристрою на суху чисту непошкоджену шкіру вздовж хребта від холки до крижів при температурі навколишнього середовища не вищій, ніж 25 °С. Після нанесення препарату уникати потрапляння води (дощ, купання) на місця нанесення впродовж 3 годин. Дійних корів обробляють одразу після вечірнього доїння. Найкращий захисний ефект препарат забезпечує за одночасної обробки всього поголів'я худоби навесні після вигону на пасовище з наступними обробками через кожні 4-6 тижнів.

Протипоказання

Не застосовувати препарат телятам масою тіла до 100 кг!

Застереження

Побічна дія

При застосуванні згідно з рекомендованими дозами побічної дії не спостерігається.

У гіперчутливих тварин можливі алергічні реакції.

Особливості застереження при використанні

Немає.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не рекомендується застосовувати спільно з іншими інсекто-акарицидними препаратами.

Період виведення (каренції)

М'ясо – 0 діб, молоко – 0 діб.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

При роботі з препаратом слід дотримуватися загальних правил особистої гігієни і техніки безпеки, які передбачені при роботі з ветеринарними препаратами. Обробку тварин проводять у спецодязі (халат, шапочка, гумові чоботи, захисні рукавиці). Після закінчення роботи слід ретельно вимити руки теплою водою з милом.

При випадковому попаданні препарату на шкіру, слизові оболонки або в очі їх необхідно промити великою кількістю проточної води.

Форма випуску

Пластикові флакони по 500 мл з дозатором на 5 або 10 мл; піпетки з полімерних матеріалів по 10,0 мл, об'єднані в стрип-монодозовому пакуванні.

Зберігання.

Сухе, добре вентильоване місце, недоступне для дітей і тварин, захищене від прямих сонячних променів, окремо від продуктів харчування та кормів, при температурі від 8 до 25 °С.

Термін придатності

2 роки.

Термін придатності після першого відкриття (відбору) – 2 місяці, за умови зберігання в щільно закритій упаковці виробника.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна