



РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 “Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів” та на підставі експертного висновку від 17.12.2025 р. №150 рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів від 19.12.2025 р. №1272 зареєстровано:

препарат **Некстмун,
Nextmune - вакцина жива імунокомплексна
заморожена проти інфекційної бурсальної
хвороби птиці**

у формі **суспензії**

Власник реєстраційного посвідчення:

**Сева Санте Анімаль,
8 рю де Логроньо, 33500 Лібурн, Франція**

зареєстровано в Україні за № **ВА-01014-02-22** від **19.12.2025**

Виробник:

**Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд,
Сзаллас 5, 1107 Будапешт, Угорщина**

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2);
- етикетка (додаток 3);

Реєстраційне посвідчення дійсне до **18.09.2027**

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного препарату.

Заступник Голови Державної служби України з питань
безпеки харчових продуктів та захисту споживачів
Головний державний ветеринарний інспектор України
Deputy Head of the State Service of Ukraine on
Food Safety and Consumer Protection –
Chief State Veterinary Inspector of Ukraine



Володимир КУСТУРОВ

Volodymyr KUSTUROV

Коротка характеристика препарату

1. Назва ветеринарного препарату

Некстмун, Nextmune - вакцина жива імунокомплексна заморожена проти інфекційної бурсальної хвороби птиці.

2. Якісний і кількісний склад

Одна доза вакцини містить:

Вірус інфекційної бурсальної хвороби, штам G-61 (Winterfield 2512) – щонайменше 0,7 log₁₀ CID₅₀.
Специфічні антитіла проти вірусу інфекційної бурсальної хвороби – щонайбільше 2,04 log₁₀ ВН-антитіл.

Вода для ін'єкцій.

CID₅₀ – доза, що викликає інфікування у 50% курей.

3. Фармацевтична форма

Суспензія заморожена.

4. Імунобіологічні властивості

Вакцина рекомендована для активної імунізації курячих ембріонів на 18-19 день інкубації та для підшкірної вакцинації добових курчат-бройлерів з метою профілактики інфекційної бурсальної хвороби (хвороби Гамборо). Збільшення рівня антитіл у попередньо імунізованої птиці відмічається впродовж 3 тижнів після вакцинації й залежить від рівня материнських антитіл. Вакцинація забезпечує захист вакцинованих курчат-бройлерів щонайменше до семитижневого віку.

5. Клінічні особливості

5.1. Вид тварин

Кури (курчата-бройлери).

5.2. Показання до застосування

Вакцину застосовують для активної імунізації курчат-бройлерів проти інфекційної бурсальної хвороби з метою зниження рівня смертності, клінічних ознак, втрати маси тіла гострих уражень фабрицієвої бурси та запобігання поширенню класичних та високовірулентних штамів вірусу інфекційної бурсальної хвороби птиці.

5.3. Протипоказання

Не можна вакцинувати клінічно хвору та/або ослаблену птицю. Не вакцинувати птицю, отриману від батьківського поголів'я, яке не було вакциноване проти інфекційної бурсальної хвороби, а також птицю, яка не має материнських антитіл проти інфекційної бурсальної хвороби.

5.4. Побічна дія

У вакцинованих курчат після введення вакцини можливе легке/помірне виснаження лімфоцитів, що триває до 7 днів, після чого реакція зменшується і супроводжується репопуляцією лімфоцитів та регенерацією бурси Фабриціуса.

5.5. Особливості застереження при використанні

Вакцинована птиця може виділяти вакцинний штам вірусу з фекаліями, вакцинний штам може передаватися від вакцинованої до невакцинованої птиці, все стадо птиці слід вакцинувати одночасно. Вакцину треба використати одразу ж після її розрідження. Впродовж щонайменше двох тижнів після вакцинації слід суворо дотримуватись умов належного утримання та виробництва.

5.6. Застосування під час несучості

Не застосовується.

5.7. Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Інформація про нешкідливість та ефективність цієї вакцини при використанні з будь-яким іншим ветеринарним лікарським засобом відсутня. Рішення про використання цієї вакцини до або після будь-якого іншого ветеринарного лікарського засобу повинно прийматися у кожному конкретному випадку.

5.8. Дози і способи введення тваринам різного віку

Вакцина рекомендована до застосування після попереднього розведення специфічним стерильним розріджувачем наступного складу:

1000 мл розріджувача містять:

Сахароза – 10 г

Гідролізат казеїну – 4 г

Сорбітол – 45 г

Гідроортофосфат калію – 1,2 г

Дигідрофосфат калію – 0,5 г

Феноловий червоний – 0,02 г

Вода для ін'єкцій - до 1000 мл

Підготовка вакцини повинна здійснюватися у чистому приміщенні з обмеженим доступом, віддаленому від місць утримання птиці.

Приміщення, де здійснюється підготовка вакцини, слід використовувати виключно для підготовки вакцини. Забороняється зберігати в цьому приміщенні будь-які органічні матеріали, наприклад, шафи, коробки для паперів тощо.

Ампули з вакциною обережно виймають з посудини Дьюара (використовуючи корнцанги) у кількості не більше чотирьох за один раз й розморожують, занурюючи на 60-90 секунд у контейнер з дистильованою водою, нагрітою до температури 27-39 °С (температуру води слід постійно контролювати за допомогою термометра, а час занурення – за допомогою таймера). Відразу після попереджувального сигналу таймера необхідно швидко витягти ампули з контейнера з водою для розморожування. Уникати торкання води руками; швидко і ретельно просушити ампули якісною паперовою серветкою.

Кожного дня необхідно замінювати воду та чистити контейнер.

Гумовий корок ін'єкційної канюлі пакета з розріджувачем протирають спиртом. Після повного випаровування спирту проколюють пробку, використовуючи стерильний шприц об'ємом 5-10 мл і відбирають 2-5 мл розріджувача. При змішуванні вакцин слід використовувати тільки одноразові стерильні шприци і одноразові стерильні голки 18G.

Після повного розморожування вакцини відкривають ампулу та повільно набирають у шприц з розріджувачем. Потім через ін'єкційну канюлю повільно, уникаючи тиску на поршень, вводять вакцину в пакет з розріджувачем. Вміст пакету злегка перемішують уникаючи утворення піни. Не можна сильно струшувати! На кожному пакеті слід вказати час підготовки вакцини (по завершенні підготовки пакета).

Розріджену вакцину використовують впродовж двох годин. Уникають дії прямих сонячних променів. Для забезпечення однорідності суспензії в процесі вакцинації вміст пакету перемішують кожні 10-15 хв.

Об'єм дози вакцини та розріджувача слід підбирати відповідно до таблиць наведених нижче.

In ovo

Одну разову дозу 0,05 мл вводять у кожен ембріон (на 18-19 день інкубації), за допомогою спеціального обладнання для введення вакцин *in ovo*. Вакцина вводиться в амніотичний мішок.

Шприци та голки перед вакцинацією стерилізують автоклавуванням за тиску 1,5 атм впродовж 15 хв чи кип'ятінням в дистильованій воді протягом 20 хв, або використовують стерильні одноразові голки та шприци.

Не допускається стерилізація інструментів хімічними засобами.

Курячим ембріонам вакцину вводять в алантоїсну порожнину в дозі 0,05 мл. З цієї метою ембріони розміщують повітряною камерою догори та за допомогою спеціалізованого автоматичного обладнання чи шприца-автомата інокулюють розріджену вакцину.

Запропоноване розведення вакцини при введенні *in ovo*:

Кількість ампул з вакциною	Розріджувач	Об'єм однієї дози
4 x 2000 доз	400 мл	0,25 мл
2 x 4000 доз	400 мл	0,25 мл
4 x 4000 доз	800 мл	0,25 мл
1 x 8000 доз	400 мл	0,25 мл
2 x 8000 доз	800 мл	0,25 мл
3 x 8000 доз	1200 мл	0,25 мл
4 x 8000 доз	1600 мл	0,25 мл

Підшкірно

Добовим курчатам вакцину вводять підшкірно в ділянці верхньої третини шиї у дозі 0,2 мл на особину. Вакцину вводять за допомогою звичайних або автоматичних шприців чи дозаторів. Курчат фіксують за шию в основі голови, складку, що утворилася, обережно відтягують великим та вказівним пальцями. Голку (довжиною 0,9 чи 1,25 см) вводять в каудальному напрямку, уникаючи введення вакцини в шкіру, м'язи, хребці.

Запропоноване розведення вакцини для введення підшкірно:

Кількість ампул з вакциною	Розріджувач	Об'єм однієї дози
1 x 2000 доз	400 мл	0,2 мл
2 x 2000 доз	800 мл	0,2 мл
3 x 2000 доз	1200 мл	0,2 мл
4 x 2000 доз	1600 мл	0,2 мл
1 x 4000 доз	800 мл	0,2 мл
2 x 4000 доз	1600 мл	0,2 мл

5.9. Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Введення десятикратної дози не викликає жодних ускладнень у птиці і є безпечним.

5.10. Спеціальні застереження

Клітини і часточки вірусів, що входять до складу вакцини, дуже тендітні і вимагають дбайливого поводження. Неналежне зберігання, транспортування та поводження з вакциною може спричинити зниження її імунобіологічної активності.

Вакцину необхідно зберігати у рідкому азоті. Розріджену чи розморожену вакцину не можна заморозувати повторно.

5.11. Період виведення (каренції)

0 діб.

5.12. Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі вводять засоби захисту тваринам

Перед початком роботи ознайомтесь зі всіма правилами роботи з рідким азотом й ретельно їх дотримуйтесь. Рідкий азот може викликати важкі обмороження. Щоб уникнути шкоди для здоров'я, при роботі з азотом необхідно використовувати відповідні захисні засоби. Користуйтеся засобами індивідуального захисту (захисний халат, гумові рукавички, захисні окуляри, маска для обличчя та ін.) при роботі з рідким азотом.

Посудини Дьюара слід зберігати лише у добре вентильованому приміщенні. За відсутності достатньої вентиляції може виникнути задуха. Кімната повинна бути обладнана витяжним вентилятором і кисневим датчиком.

Ампули з азотом слід відкривати на відстані витягнутої руки, щоб уникнути будь-якого ризику отримання травм у разі розриву ампули. При раптових змінах температури ампули із рідким азотом можуть вибухнути.

Слід регулярно перевіряти вміст азоту у посудині Дьюара та поновлювати його для забезпечення повного занурення ампул з вакциною у рідкий азот.

При роботі з клітинно-асоційованими вакцинами слід проявляти обережність, щоб уникнути руйнування клітин; особливо важливо уважно ставитися до температури води і часу, який йде на розморожування та використання вакцини.

У разі самовведення промийте рану під проточною водою з милом, обробіть 70% розчином етилового спирту та негайно зверніться до лікаря.

6. Фармацевтичні особливості

6.1. Основні форми несумісності

Не встановлені.

6.2. Термін придатності

24 місяці.

6.3. Особливі застереження щодо зберігання

Вакцину слід зберігати та транспортувати в посудині Дьюара з рідким азотом за температури -196°C . Повторно не заморожувати! Вакцину розморожувати безпосередньо перед застосуванням. Термін придатності після розморожування – 2 години.

6.4. Природа і склад контейнера первинного упакування

Скляні запаяні ампули по 2000, 4000 та 8000 доз вакцини. Ампули з вакциною закріплені в спеціальних металевих фіксаторах та розміщені у посудині Дьюара у рідкому азоті.

6.5. Назва, місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Сева Санте Анімаль, 8 рю де Логроньо, 33500 Лібурн, Франція.

6.6. Назва, місцезнаходження виробника

Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд, Сзаллас 5, 1107 Будапешт, Угорщина.

6.7. Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним засобом

Утилізацію усіх відкритих під час проведення процедури вакцинації ампул з вакциною слід здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства України. Ампуле з вакциною, що зберігалися без рідкого азоту, слід утилізувати.

7. Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНДІЛДВСЕ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНДІЛДВСЕ.

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Некстмун, Nextmune – вакцина жива імунокомплексна заморожена проти інфекційної бурсальної хвороби птиці.

Склад

Одна доза вакцини містить:

Вірус інфекційної бурсальної хвороби, штам G-61 (Winterfield 2512) – щонайменше 0,7 log₁₀ CID₅₀.

Специфічні антитіла проти вірусу інфекційної бурсальної хвороби – щонайбільше 2,04 log₁₀ ВН-антитіл.

Вода для ін'єкцій.

CID₅₀ – доза, що викликає інфікування у 50% курей.

Імунобіологічні властивості

Вакцина рекомендована для активної імунізації курячих ембріонів на 18-19 день інкубації та для підшкірної вакцинації добових курчат-бройлерів з метою профілактики інфекційної бурсальної хвороби (хвороби Гамборо). Збільшення рівня антитіл у попередньо імунізованої птиці відмічається впродовж 3 тижнів після вакцинації й залежить від рівня материнських антитіл. Вакцинація забезпечує захист щеплених курчат-бройлерів щонайменше до семи тижневого в ку.

Вид тварин

Кури (курчата-бройлери).

Показання до застосування

Вакцину застосовують для активної імунізації курчат-бройлерів проти інфекційної бурсальної хвороби, з метою зниження рівня смертності, клінічних ознак, втрати маси тіла, гострих уражень фабрицієвої бурси та запобігання поширенню класичних та високовірулентних штамів вірусу інфекційної бурсальної хвороби птиці.

Протипоказання

Не можна вакцинувати клінічно хвору та/або ослаблену птицю. Не вакцинувати птицю, отриману від батьківського поголів'я, яке не було вакциноване проти інфекційної бурсальної хвороби, а також птицю, яка не має материнських антитіл проти інфекційної бурсальної хвороби.

Застереження при застосуванні

Вакцинована птиця може виділяти вакцинний штам вірусу з фекаліями, вакцинний штам може передаватися від вакцинованої до невакцинованої птиці, все стадо птиці слід вакцинувати одночасно. Вакцину треба використати одразу ж після її розрідження. Впродовж щонайменше двох тижнів після вакцинації слід суворо дотримуватись умов належного утримання та виробництва.

Взаємодія з іншими засобами

Інформація про нешкідливість та ефективність цієї вакцини при використанні з будь-яким іншим ветеринарним лікарським засобом відсутня. Рішення про використання цієї вакцини до або після будь-якого іншого ветеринарного лікарського засобу повинно прийматися у кожному конкретному випадку.

Спосіб застосування та дози

Вакцина рекомендована до застосування після попереднього розведення специфічним стерильним розріджувачем наступного складу:

1000 мл розріджувача містять:

Сахароза – 10 г

Гідролізат казеїну – 4 г

Сорбітол – 45 г

Гідроортофосфат калію – 1,2 г

Дигідрофосфат калію – 0,5 г

Феноловий червоний – 0,02 г

Вода для ін'єкцій - до 1000 мл

Підготовка вакцини повинна здійснюватися у чистому приміщенні з обмеженим доступом, віддаленому від місць утримання птиці.

Приміщення, де здійснюється підготовка вакцини, слід використовувати виключно для підготовки вакцини. Забороняється зберігати в цьому приміщенні будь-які органічні матеріали, наприклад, шафи, коробки для паперів тощо.

Ампули з вакциною обережно виймають з посудини Дьюара (використовуючи корнцанги) у кількості не більше чотирьох за один раз й розморожують, занурюючи на 60-90 секунд у контейнер з дистильованою водою, нагрітою до температури 27-39 °С (температуру води слід постійно контролювати за допомогою термометра, а час занурення – за допомогою таймера). Відразу після попереджувального сигналу таймера необхідно швидко витягти ампули з контейнера з водою для розморожування. Уникати торкання води руками; швидко і ретельно просушити ампули якісною паперовою серветкою.

Кожного дня необхідно замінювати воду та чистити контейнер.

Гумовий корок ін'єкційної канюлі пакета з розріджувачем протирають спиртом. Після повного випаровування спирту проколюють пробку, використовуючи стерильний шприц об'ємом 5-10 мл і відбирають 2-5 мл розріджувача. При змішуванні вакцин слід використовувати тільки одноразові стерильні шприци і одноразові стерильні голки 18G.

Після повного розморожування вакцини відкривають ампулу та повільно набирають у шприц з розріджувачем. Потім через ін'єкційну канюлю повільно, уникаючи тиску на поршень, вводять вакцину в пакет з розріджувачем. Вміст пакету злегка перемішують уникаючи утворення піни. Не можна сильно струшувати! На кожному пакеті слід вказати час підготовки вакцини (по завершенні підготовки пакета).

Розріджену вакцину використовують впродовж двох годин. Уникають дії прямих сонячних променів. Для забезпечення однорідності суспензії в процесі вакцинації вміст пакету перемішують кожні 10-15 хв.

Об'єм дози вакцини та розріджувача слід підбирати відповідно до таблиць наведених нижче.

In ovo

Одну разову дозу 0,05 мл вводять у кожен ембріон (на 18-19 день інкубації), за допомогою спеціального обладнання для введення вакцин *in ovo*. Вакцина вводиться в амніотичний мішок.

Шприци та голки перед вакцинацією стерилізують автоклавуванням за тиску 1,5 атм впродовж 15 хв чи кип'ятінням в дистильованій воді протягом 20 хв, або використовують стерильні одноразові голки та шприци.

Не допускається стерилізація інструментів хімічними засобами.

Курячим ембріонам вакцину вводять в алантоїсну порожнину в дозі 0,05 мл. З цією метою ембріони розміщують повітряною камерою догори та за допомогою спеціалізованого автоматичного обладнання чи шприца-автомата інокулюють розріджену вакцину.

Запропоноване розведення вакцини при введенні *in ovo*:

Кількість ампул з вакциною	Розріджувач	Об'єм однієї дози
4 x 2000 доз	400 мл	0,05 мл
2 x 4000 доз	400 мл	0,05 мл
4 x 4000 доз	800 мл	0,05 мл
1 x 8000 доз	400 мл	0,05 мл
2 x 8000 доз	800 мл	0,05 мл
3 x 8000 доз	1200 мл	0,05 мл
4 x 8000 доз	1600 мл	0,05 мл

Підшкірно

Добовим курчатам вакцину вводять підшкірно в ділянці верхньої третини шиї у дозі 0,2 мл на особину. Вакцину вводять за допомогою звичайних або автоматичних шприців чи дозаторів.

Курчат фіксують за шию, в основі голови, складку, що утворилася, обережно в'дтягують великим та вказівним пальцями. Голку (довжиною 0,9 чи 1,25 см) вводять в каудальному напрямку, уникаючи введення вакцини в шкіру, м'язи, хребці.

Запропоноване розведення вакцини при введенні підшкірно:

Кількість ампул з вакциною	Розріджувач	Об'єм однієї дози
1 x 2000 доз	400 мл	0,2 мл
2 x 2000 доз	800 мл	0,2 мл
3 x 2000 доз	1200 мл	0,2 мл
4 x 2000 доз	1600 мл	0,2 мл
1 x 4000 доз	800 мл	0,2 мл
2 x 4000 доз	1600 мл	0,2 мл

Побічні ефекти

У вакцинованих курчат після введення вакцини можливе легке/помірне виснаження лімфоцитів, що триває до 7 днів, після чого реакція зменшується і супроводжується репопуляцією лімфоцитів та регенерацією бурси Фабриціуса.

Період виведення (каренції)

0 діб.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВП

Перед початком роботи ознайомтесь зі всіма правилами роботи з рідким азотом й ретельно їх дотримуйтесь. Рідкий азот може викликати важкі обмороження. Щоб уникнути шкоди для здоров'я, при роботі з азотом необхідно використовувати відповідні захисні засоби. Користуйтеся засобами індивідуального захисту (захисний халат, гумові рукавички, захисні окуляри, маска для обличчя та ін.) при роботі з рідким азотом.

Посудини Дьюара слід зберігати лише у добре вентильованому приміщенні. За відсутності достатньої вентиляції може виникнути задуха. Кімната повинна бути обладнана витяжним вентилятором і кисневим датчиком.

Ампули з азотом слід відкривати на відстані витягнутої руки, щоб уникнути будь-якого ризику отримання травм у разі розриву ампули. При раптових змінах температури ампули із рідким азотом можуть вибухнути.

Слід регулярно перевіряти вміст азоту у посудині Дьюара та поновлювати його для забезпечення повного занурення ампул з вакциною у рідкий азот.

При роботі з клітинно-асоційованими вакцинами слід проявляти обережність, щоб уникнути руйнування клітин; особливо важливо уважно ставитися до температури води і часу, який йде на розморожування та використання вакцини.

У разі самовведення промийте рану під проточною водою з милом, обробіть 70% розчином етилового спирту та негайно зверніться до лікаря.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВП, способи його знешкодження і утилізації

Утилізацію усіх відкритих під час проведення процедури вакцинації ампул з вакциною слід здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства України. Ампули з вакциною, що зберігалися без рідкого азоту, слід утилізувати.

Термін придатності

24 місяці.

Умови зберігання і транспортування

Вакцину слід зберігати та транспортувати в посудині Дьюара з рідким азотом за температури -196 °С. Повторно не заморожувати! Вакцину розморожувати безпосередньо перед застосуванням.

Термін придатності після розморожування – 2 години.

Упаковка

Скляні запаяні ампули по 2000, 4000 та 8000 доз вакцини. Ампули з вакциною закріплені в спеціальних металевих фіксаторах та розміщені у посудині Дьюара у рідкому азоті.

Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності власника реєстраційного посвідчення
Сева Санте Анімаль, 8 рю де Логроньо, 33500 Лібурн, Франція.

Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності виробника

Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд., Сзаллас 5, 1107 Будапешт, Угорщина.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (ДНДІЛДВСЕ), та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНДІЛДВСЕ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНДІЛДВСЕ.

* - 2000, 4000, 8000

Некстмун, Nextmune -
вакцина жива

* доз.

Імунокомплексна заморожена проти
інфекційної бурсальної хвороби птиці
Підшкірно, *in ovo*
Перед застосуванням уважно прочитайте
листівку-вкладку!
Лише для ветеринарної медицини!
Сева-Філікс Ветеринарі Байоподжиналс
Ко Лтд, Угорщина
RTN: BA-01014-02-22
Серія №:
Придатний до:



NX14

product name: CTEXT NEXTMUNE 2000D 2ml UA			language: UA	item code: NX14	revision: 01	standand number: HUPH™-SPEC-00150
méret /size: 36 x 25,4 mm	modified item code: -	old revision: -	changing: COMS-CC-2024-1395		date: 2024.11.15.	
szín /colours: P Process Black			font (size [leading]): Myriad Pro (5pt)		graphi- version: v02	
					made/ modified by: HORVÁTH György	

Продовження до частини 3
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-01014-02-22
від 19.12.2025

**вакцина жива імунокомплексна заморожена
проти інфекційної
бурсальної хвороби птиці**

*** ДОЗ**



Склад

Одна доза вакцини містить:

Вірус інфекційної бурсальної хвороби, штам G-61 (Winterfield 2512) – щонайменше 0,7 log₁₀ CID₅₀.

Специфічні антитіла проти вірусу інфекційної бурсальної хвороби – щонайбільше 2,04 log₁₀ ВН-антитіл.

Вода для ін'єкцій.

Дозування

Вакцина рекомендована до застосування після попереднього розведення специфічним стерильним розріджувачем. Вакцину застосовують *in ovo* курячим ембріонам (на 18-19 день інкубації) за допомогою спеціального обладнання в дозі 0,05 мл (мл) або підшкірно добовим курчатом в дозі 0,2 мл (мл) на особину за допомогою звичайних чи автоматичних шприців чи дозаторів.

Перед застосуванням уважно прочитайте листівку-вкладку.

Застереження

Все стадо птиці слід вакцинувати одночасно. Повторно не заморозувати! Вакцину розморожуювати безпосередньо перед застосуванням. Термін придатності після розморожування – 2 години.

Впродовж щонайменше двох тижнів після вакцинації слід суворо дотримуватись умов належного утримання та виробництва.

Зберігання

Вакцину слід зберігати та транспортувати в посудині Дьюара з рідким азотом за температури -196°C .

Зберігати в недоступному для дітей місці!

РП№: ВА-01014-02-22

ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Виробник:

Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд,
1107 Будапешт, Сзаллас 5, Угорщина.

Серія №:

Дата виготовлення:

Придатний до:

Кількість ампул:

product name: C NEXTMUNE 2000D 2ml DEWAR UA		language: UA	item code: 62295	revision: 60	standard number: HUPH~S-PSEC-00040
meret /size: 108 x 159 mm	modified item code:	old revision:	changing: CQMS-CC-2024-1395		date: 2024.11.15.
szin /colours:  Black		font (size [leading]): Myriad Pro 7 pt/sorköz 100%		graphi. version: v2 made/ modified by: BALÁZS Erzsébet	