

01.11.2022

ЄвітСел
(емульсія для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Емульсія білого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини (мг):

α -токоферолу ацетат (вітамін Е) - 100,0;

селен (як натрію селеніт) - 0,30.

Допоміжні речовини: бутилгідрокситолуол, полісорбат-80, спирт бензиловий, кислота лимонна, вода високоочищена.

Фармакологічні властивості

АТС *vet* класифікаційний код: QA12C Інші мінеральні добавки QA12CE99 Селен, комбінації.

Діючі речовини препарату — вітамін Е та селен — є природними антиоксидантами з різними механізмами дії, які в різні періоди ефективно доповнюють один одного, протидіють утворенню вільних радикалів та попереджують їхній деструктивний вплив на мембрани клітин.

Вітамін Е запобігає окисненню ліпідних компонентів мембран клітин, гальмуючи процеси утворення перекисів водню. Селен шляхом гідроксилювання бере участь у створенні глутатіонпероксидази й здатний не лише перетворювати перекиси водню в менш небезпечні спирти, але й запобігати появі шкідливих для організму тварин вільних радикалів. Вітамін Е стимулює синтез багатьох ферментів, бере участь у метаболізмі нуклеїнових кислот і простагландинів, покращує тканинне дихання, стимулює синтез білків, захищає від окиснення вітамін А, інгібує синтез холестеринів та нормалізує вміст ліпідів у крові.

Селен відіграє значну роль в утворенні більш як 30 необхідних організму гормонів, ферментів та інших біологічно-активних речовин, стимулює еритроцитопоез, покращує живлення клітин киснем.

Вітамін Е з селеном опосередковано активізують захисні функції клітинного та гуморального імунітету, імунну систему організму в цілому, значно підвищують репродуктивність тварин, покращуючи спермоутворення у самців, активність матки та відновлення нормального функціонування яєчників у самок після родів.

Застосування

Препарат застосовують у комплексі терапевтичних заходів великій рогатій худобі, вівцям, козам, свиням для посилення загальної та специфічної резистентності організму, а також профілактики та терапії за хвороб, які розвиваються на фоні недостатності токоферолу і селену: м'язової дистрофії, білом'язової хвороби, гепатодистрофії, безплідності у самців, зниженні репродуктивності та неплідності у самок, ембріональної смертності, абортів, післяродових ускладнень, кетозів, затримках росту та розвитку молодняку, курям та індикам для збільшення приросту та яйценосності.

Дозування

Препарат застосовують внутрішньом'язово або підшкірно у дозах:

- самки (корови, свиноматки, вівці, кози) — 1 мл на 50 кг маси тіла, двічі, з інтервалом 1 місяць, за 30 діб до очікуваних родів;
- плідники — 1 мл на 50 кг маси тіла, тричі, з інтервалом три тижні, за місяць до активного парувального сезону;
- телята, ягнята, козенята — 0,2-0,3 мл препарату на 10 кг маси тіла;
- підсисні поросята — 1 мл на тварину за тиждень до відлучення;

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1

01.11.2022

• поросята, що відстають у рості та розвитку, — 1 мл на 10 кг маси тіла, 3-4 рази з інтервалом тиждень.

Птиці застосовують перорально з питною водою у дозах:

- кури, індики — 0,5 мл на 1 л води;
- молодняк птиці (курчата, індичата, каченята, гусенята) — 1 мл на 1,5 л води, у перший тиждень життя, курс — 3-5 діб.

Застереження

Не вводити в одне місце більш, як 10 мл препарату. У деяких тварин у місці введення можлива незначна припухлість, яка зникає через 2-3 доби без додаткового лікування.

Період виведення

Споживання тваринницької продукції після застосування препарату дозволено без обмежень.

Форма випуску

Скляні або поліпропіленові флакони з гумовими корками під алюмінієвими обкатками по 10, 20, 50, 100 або 200 мл. Скляні ампули по 2 мл (по 10 штук у картонному упакованні). Полімерні контейнери та каністри по 1 і 5 л.

Зберігання

Сухе темне місце за температури від 0 до 25 °С.

Термін придатності — 2 роки.

Лише для ветеринарної медицини!

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ «БРОВАФАРМА»

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

Виробник готового продукту:

ТОВ «БРОВАФАРМА»

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна