



РЕЕСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 “Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів” та на підставі експертного висновку від 16.12.2021 р. № 116 рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів від 14.02.2022 р. № 73 зареєстровано:

препарат **СЕВАК КОРИМУН 4 К, SEVAC CORYMUNE 4
К - вакцина інактивована бактеріальна
проти інфекційного риніту та сальмонельозу
птиці, викликаного *Salmonella enteritidis***

у формі суспензії для ін'єкцій

Власник реєстраційного посвідчення:

Сева Санте Анімаль,

Зоне Індустріелле Ла Баластієре, 33500 Лібурн, Франція

зареєстровано в Україні за №

ВА-01005-02-21

від

14.02.2022

Виробник:

*Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд,
1107 Будапешт, Сзалас 5, Угорщина*

При будь-якій зміні в реєстраційному досяє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2);
- етикетка (додаток 3);

Реєстраційне посвідчення дійсне до

13.02.2027

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного препарату.

Директор Департаменту безпеки харчових продуктів,
ветеринарної медицини та контролю у сфері органічного виробництва
Director of the Department for Food Safety, Veterinary Medicine and Control in
Organic Production



Д.А. Мороз

Коротка характеристика препарату

1. Назва ветеринарного препарату

СЕВАК КОРИМУН 4 К, SEVAC CORYMUNE 4 К - вакцина інактивована бактеріальна проти інфекційного риніту та сальмонельозу птиці, викликаного *Salmonella enteritidis*.

2. Якісний і кількісний склад

Одна доза (dose) вакцини містить (інактивовані бактерії):

Avibacterium paragallinarum, серотип А

щонайменше 7 log₁₀ КУО* до інактивації

Avibacterium paragallinarum, серотип В

щонайменше 7 log₁₀ КУО* до інактивації

Avibacterium paragallinarum, серотип С

щонайменше 7 log₁₀ КУО* до інактивації

Salmonella enteritidis

індукується щонайменше 4 log₂ ТМА**

*КУО - Колонієутворюючі одиниці

**ТМА (МАТ) - титр мікроаглютинації

Допоміжні речовини: гель гідроксиду алюмінію, розчин формальдегіду, тіомерсал, вода для ін'єкцій.

3. Фармацевтична форма

Суспензія для ін'єкцій.

4. Імунобіологічні властивості

Вакцина викликає формування імунної відповіді у птиці до інфекційного риніту, викликаного *Avibacterium paragallinarum* (серотипами А, В і С) та до сальмонельозу, викликаного *Salmonella enteritidis*. Тривалий антигенний ефект та стабільна імунна відповідь у період несучості обумовлені первинною вакцинацією з використанням СЕВАК КОРИМУН 4 К та наступною імунізацією вакциною з масляним ад'ювантом, що містить ті ж самі компоненти.

5. Клінічні особливості

5.1. Вид тварин

Кури.

5.2. Показання до застосування

Вакцина призначена для імунізації племінних та несучих стад курей проти інфекційного риніту, спричиненого *Avibacterium paragallinarum* та сальмонельозу, спричиненого *Salmonella enteritidis*, з метою зменшення клінічних ознак та уражень захворювань.

Ревакцинація проводиться через 4-6 тижнів, з використанням вакцини, інактивованої з масляним ад'ювантом, що містить ті ж самі компоненти.

5.3. Протипоказання

Відсутні.

5.4. Побічна дія

Вакцинація не викликає жодних системних реакцій або значних реакцій у місці ін'єкції.

5.5. Особливості застереження при використанні

Максимального захисту може досягнути лише клінічно здорова птиця. Для вакцинації слід використовувати лише стерильне обладнання.

Зберігайте вакцину при кімнатній температурі (15-25 ° С) протягом 3-4 годин перед використанням. Добре струшуйте пляшку до і під час використання.

Перевірте точність шприца, щоб переконатися, у введенні правильної дози.

Після відкриття флакону, його вміст необхідно використати протягом 24 годин.

5.6. Застосування під час вагітності, лактації, несучості

Не застосовується.

5.7. Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не змішувати вакцину в одному шприці з іншими імунобіологічними і лікарськими препаратами.

5.8. Дози і способи введення тваринам різного віку

Вакцина призначена для імунізації клінічно здорових племінних та несучих стад курчат, віком 8-12 тижнів.

Перед застосуванням вакцину витримують протягом 3-4 годин при кімнатній температурі (15-25°C). Перед і під час використання флакон з вакциною ретельно струшують для відновлення однорідності суспензії.

Вакцину вводять одноразово в дозі 0,5 мл (ml) підшкірно в ділянці шиї або внутрішньом'язово в грудний м'яз.

Ревакцинація проводиться через 4-6 тижнів, з використанням вакцини, інактивованої з масляним ад'ювантом, що містить ті ж самі компоненти.

Для вакцинації використовують звичайні або напівавтоматичні шприци та голки, які стерилізують кип'ятінням протягом 15-20 хвилин. Допускається використання одноразових шприців. Не допускається застосування для стерилізації інструментів хімічними дезінфікуючими засобами.

5.9. Передозування

Введення подвійної дози вакцини не викликає суттєвих побічних ефектів.

5.10. Спеціальні застереження

Не слід вакцинувати клінічно хвору та/або ослаблену птицю.

Слід уникати порушень схеми (термінів) проведення вакцинації, оскільки це може привести до зниження ефективності імунопрофілактики.

5.11. Період виведення (каренції)

Нуль діб.

5.12. Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі вводять засоби захисту тваринам

При роботі з вакциною слід дотримуватися загальних правил особистої гігієни і техніки безпеки, передбачених при роботі з лікарськими засобами ветеринарного призначення.

Всі особи, які беруть участь у проведенні вакцинації повинні бути одягнені у спецодяг (гумові чоботи, халат, штани, головний убір, гумові рукавички) і забезпечені окулярами закритого типу. У місцях роботи повинна бути аптечка долікарської допомоги.

При попаданні вакцини на шкіру та/або слизові оболонки їх необхідно промити великою кількістю водопровідної води. Після роботи з вакциною слід вимити руки з милом.

При випадковому самовведенні, слід негайно звернутися до лікаря.

6. Фармацевтичні особливості

6.1. Основні форми несумісності

Не змішувати вакцину в одному шприці з іншими імунобіологічними і лікарськими препаратами.

6.2. Термін придатності

24 місяці.

Після відкриття флакону, його вміст необхідно використати протягом 24 годин.

6.3. Особливі застереження щодо зберігання

В захищеному від світла місці за температури від +2 °C до +8°C. Не заморожувати.

6.4. Природа і склад контейнера первинного упакування

Пластикові флакони по 250, 500 і 1500 мл (ml), які закорковані гумовими пробками і завальцовані алюмінієвими ковпачками.

6.5. Назва, місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Сева Санте Анімаль, Зоне Індустріелле Ла Баластієре, 33500 Лібурн, Франція.

6.6. Назва, місцезнаходження виробника

Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд, 1107 Будапешт, Сзаллас 5, Угорщина.

6.7. Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним засобом

Невикористаний продукт або його залишки необхідно знешкодити відповідно до місцевих (державних) правил.

7. Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з

пошанцем у ДНКІБШМ напpавляють, відпoвідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламаций на біологічні пpепарати, що пpизначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії пpепарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

СЕВАК КОРИМУН 4 К, SEVAC CORYMUNE 4 К - вакцина інактивована бактеріальна проти інфекційного риніту та сальмонельозу птиці, викликаного *Salmonella enteritidis*.

Склад

Одна доза (dose) вакцини містить (інактивовані бактерії):

Avibacterium paragallinarum, серотип А

щонайменше $7 \log_{10}$ КУО* до інактивації

Avibacterium paragallinarum, серотип В

щонайменше $7 \log_{10}$ КУО* до інактивації

Avibacterium paragallinarum, серотип С

щонайменше $7 \log_{10}$ КУО* до інактивації

Salmonella enteritidis

індукується щонайменше $4 \log_{10}$ ТМА**

*КУО - Колонієутворюючі одиниці

**ТМА (МАТ) - титр мікроаглютинації

Фармацевтична форма

Суспензія для ін'єкцій.

Імунобіологічні властивості

Вакцина викликає формування імунної відповіді у птиці до інфекційного риніту, викликаного *Avibacterium paragallinarum* (серотипами А, В і С) та до сальмонельозу, викликаного *Salmonella enteritidis*. Тривалий антигенний ефект та стабільна імунна відповідь у період несучості обумовлені первинною вакцинацією з використанням СЕВАК КОРИМУН 4 К та наступною імунізацією вакциною з масляним ад'ювантом, що містить ті ж самі компоненти.

Вид тварин

Кури.

Показання до застосування

Вакцина призначена для імунізації племінних та несучих стад курей проти інфекційного риніту, спричиненого *Avibacterium paragallinarum* та сальмонельозу, спричиненого *Salmonella enteritidis*, з метою зменшення клінічних ознак та уражень захворювань.

Ревакцинація проводиться через 4-6 тижнів, з використанням вакцини, інактивованої з масляним ад'ювантом, що містить ті ж самі компоненти.

Протипоказання

Відсутні.

Застереження при застосуванні

Максимального захисту може досягнути лише клінічно здорова птиця. Для вакцинації слід використовувати лише стерильне обладнання.

Зберігайте вакцину при кімнатній температурі ($15-25^{\circ}\text{C}$) протягом 3-4 годин перед використанням.

Добре струшуйте пляшку до і під час використання.

Перевірте точність шприца, щоб переконатися, у введенні правильної дози.

Після відкриття флакону, його вміст необхідно використати протягом 24 годин.

Взаємодія з іншими засобами

Не змішувати вакцину в одному шприці з іншими імунобіологічними і лікарськими препаратами.

Спосіб застосування та дози

Вакцина призначена для імунізації клінічно здорових племінних та несучих стад курчат, віком 8-12 тижнів.

Перед застосуванням вакцину витримують протягом 3-4 годин при кімнатній температурі ($15-25^{\circ}\text{C}$). Перед і під час використання флакон з вакциною ретельно струшують для відновлення однорідності суспензії.

Вакцину вводять одноразово в дозі 0,5 мл (ml) підшкірно в ділянці шиї або внутрішньом'язово в грудний м'яз.

Ревакцинація проводиться через 4-6 тижнів, з використанням вакцини, інактивованої з масляним ад'ювантом, що містить ті ж самі компоненти.

Для вакцинації використовують звичайні або напіваавтоматичні шприци та голки, які стерилізують кип'ятінням протягом 15-20 хвилин. Допускається використання одноразових шприців. Не допускається застосування для стерилізації інструментів хімічними дезінфікуючими засобами.

Побічні ефекти

Вакцинація не викликає жодних системних реакцій або значних реакцій у місці ін'єкції.

Період виведення (каренції)

Нуль діб.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВІП

При роботі з вакциною слід дотримуватися загальних правил особистої гігієни і техніки безпеки, передбачених при роботі з лікарськими засобами ветеринарного призначення.

Всі особи, які беруть участь у проведенні вакцинації повинні бути одягнені у спецодяг (гумові чоботи, халат, штани, головний убір, гумові рукавички) і забезпечені окулярами закритого типу. У місцях роботи повинна бути аптечка долікарської допомоги.

При попаданні вакцини на шкіру та/або слизові оболонки їх необхідно промити великою кількістю водопровідної води. Після роботи з вакциною слід вимити руки з милом.

При випадковому самовведенні, слід негайно звернутися до лікаря.

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації

Невикористаний продукт або його залишки необхідно знешкодити відповідно до місцевих (державних) правил.

Термін придатності

24 місяці.

Після відкриття флакону, його вміст необхідно використати протягом 24 годин.

Умови зберігання і транспортування

В захищеному від світла місці за температури від +2 °C до +8°C. Не заморожувати.

Упаковка

Пластикові флакони по 250, 500 і 1500 мл (ml), які закорковані гумовими пробками і завальцовані алюмінієвими ковпачками.

Назва, місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Сева Санте Анімаль, Зоне Індустріелле Ла Баластієре
33500 Лібурн, Франція.

Назва, місцезнаходження виробника

Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд
1107 Будапешт, Сзаллас 5, Угорщина.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення реклаमाцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.

**СЕВАК КОРИМУН 4 К,
CEVAC CORYMUNE 4 К**

Вакцина інактивована бактеріально проти інфекційного риніту та сальмонельозу птиці, викликаного *Salmonella enteritidis*.
Осередження для ін'єкцій.
Підшкірно, внутрішньом'язово.
Стерильно.

5x250 мл (ml)/
5x500
ДОЗ (doses)



**СЕВАК КОРИМУН 4 К,
CEVAC CORYMUNE 4 К**

Вакцина інактивована бактеріально проти інфекційного риніту та сальмонельозу птиці, викликаного *Salmonella enteritidis*.
Осередження для ін'єкцій.
Підшкірно, внутрішньом'язово.
Стерильно.

5x250 мл (ml)/
5x500
ДОЗ (doses)



Одна доза вакцини містить *Avibacterium paragallinarum*, серотип А - щонайменше 7 log10 КУО, *Avibacterium paragallinarum*, серотип В - щонайменше 7 log10 КУО, *Avibacterium paragallinarum*, серотип С - щонайменше 7 log10 КУО, *Salmonella enteritidis* - щонайменше 4 log2 ТМА, гелі і адсорбційну алюмінію, розчин формальдегіду, померсалу, води для ін'єкцій.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Вакцина призначена для імунізації плевміних та несучих стад курей проти інфекційного риніту, спричиненого *Avibacterium paragallinarum* та сальмонельозу, спричиненого *Salmonella enteritidis*.

ДОЗУВАННЯ

Вакцина призначена для імунізації клінічно здорових плевміних та несучих стад курчат віком 8-17 тижнів. Перед застосуванням вакцину витримують протягом 3-4 годин при кімнатній температурі (15-25°C). Перед і під час використання флакон з вакциною ретельно струшують для відновлення однорідності суспензії. Вакцину вводять одноразово в дозі 0,5 мл (ml) підшкірно в дельту ший або внутрішньом'язово в грудний м'яз. Ревакцинація проводиться через 4-6 тижнів з використанням вакцини, інактивованої масляним ад'ювантом, що містить її ж самі компоненти.

Для вакцинації використовують звичайні або напівавтоматичні шприци та голки, які стерилізують кип'ятінням протягом 15-20 хвилин. Допускається використання одноразових шприців. Не допускається застосування для стерилізації інструментів хімічними дезінфікуючими засобами. Перед застосуванням уважно прочитайте листівку-вкладку!

500-000

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не слід вакцинувати клінічно хвору та/або ослаблену птицю. Не змішувати вакцину в одному шприці з іншими імунологічними і лікарськими препаратами.

Період виведення (каренції) - нуль днів.

ЗБЕРІГАННЯ


В захищеному від світла місці за температури від +2°C до +8°C. Не заморозувати.

Після відкриття флакону його вміст необхідно використати протягом 24 годин.

ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

РП№:

Виробник: Сева-Флаксія Ветеринарі Байоходжикалс Ко ЛТА
1107 Будапешт, Сєвмас 5, Угорщина.



Для
випуску:
Серія №:
Презентує:

Додаток 3
до реєстраційного
посвідчення
№ ВА-01005-02-21
від 14.02.2022

Одна доза вакцини містить *Avibacterium paragallinarum*, серотип А - щонайменше $7 \log_{10}$ КУО, *Avibacterium paragallinarum*, серотип В - щонайменше $7 \log_{10}$ КУО, *Avibacterium paragallinarum*, серотип С - щонайменше $7 \log_{10}$ КУО, *Salmonella enteritidis* - щонайменше $4 \log_{10}$ ТМД, гель підсохлого алюмінію, розчин формальдегіду, томеркал, вода для ін'єкцій.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Вакцина призначена для імунізації плевінних та несучих стад курей проти інфекційного ринту, спричиненого *Avibacterium paragallinarum* та сальмонельозу, спричиненого *Salmonella enteritidis*.

ДОЗУВАННЯ

Вакцина призначена для імунізації кінчно здорових плевінних та несучих стад курчат віком 8-12 тижнів. Перед застосуванням вакцину витримують протягом 3-4 годин при кімнатній температурі (15-25°C). Перед тим час використання флакон з вакциною ретельно струшують для відновлення однорідності суспензії. Вакцину вводять одноразово в об'єм 0,5 мл (мл) підшкірно в алангид ший або в пліччю, розділену в грудний м'яз. Реакція після введення вакцини через 4-6 тижнів з використанням вакцини, інактивованої масляним ад'ювантом, що містить ті ж самі компоненти.

Для вакцинації використовують зачіпачі або напівавтоматичні шприци та голки, які стерилізують кип'ятінням протягом 15-20 хвилин. Допускається використання одноразових шприців. Не допускається застосування для стерилізації інструментів хімічними дезінфікуючими засобами. Перед застосуванням уязно прослідкуйте місткість флакону.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не слід вакцинувати клінічно хвору та/або ослаблену птицю. Не змішувати вакцину в одному шприці з іншими імунізаційними і лікарськими препаратами. Перш од введення (кавенції) - нуль д.б.

ЗБЕРЕГАННЯ

В захищеному від світла місці за температури від +2°C до +8°C. Не заморозувати. Після відкриття флакону його вміст необхідно використати протягом 24 годин.

ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

РП№:

Виробник: Сева-Фармас Ветеринарі Байомоджикас Ко Лта 1107
Бухгалетт: Салмас 5. Угорщина.

СЕВАК КОРИМУН 4 К, SEVAC CORYMUNE 4 K

Вакцина інактивована бактеріальна проти інфекційного ринту та сальмонельозу птиці, викликаного *Salmonella enteritidis*. Суспензія для ін'єкцій. Підшкірно, внутрішньом'язово. Стерильно.

5x500 мл (ml)/
5 x 1000
доз (doses)



5x500 мл (ml)/
5 x 1000
доз (doses)



Код
Місця
Виробника

Продовження додатку 3
до реєстраційного
посвідчення
№ ВА-01005-02-21
від 14.02.2022

3

СЕВАК КОРИМУН 4 К,
CEVAC CORYMUNE 4 K

Вакцина інактивована бактеріальна проти інфекційного ринту та сальмонельозу птиці, викликаного *Salmonella enteritidis*. Суспензія для ін'єкції

Підшкірно, внутрішньом'язово

Стерильно

5x1500 мл (ml)/
5 x 3000
доз (doses)



СЕВАК КОРИМУН 4 К,
CEVAC CORYMUNE 4 K

Вакцина інактивована бактеріальна проти інфекційного ринту та сальмонельозу птиці, викликаного *Salmonella enteritidis*. Суспензія для ін'єкції

Підшкірно, внутрішньом'язово

Стерильно

5x1500 мл (ml)/
5 x 3000
доз (doses)



Одна доза вакцини містить: *Avibacterium paragallinarum*, серотип А - щонайменше 7 log10 КУО, *Avibacterium paragallinarum*, серотип В - щонайменше 7 log10 КУО, *Avibacterium paragallinarum*, серотип С - щонайменше 7 log10 КУО, *Salmonella enteritidis* - щонайменше 4 log2 ТМД, гель гідрооксиду алюмінію, розчин формальдегіду, томерсал, вода для ін'єкції.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ
Вакцина призначена для імунізації плевінних та несучих стад курей проти інфекційного ринту, спричиненого *Avibacterium paragallinarum* та сальмонельозу, спричиненого *Salmonella enteritidis*.


ДОЗУВАННЯ
Вакцина призначена для імунізації клінічно здорових плевінних та несучих стад, курчат віком 8-12 тижнів. Перед застосуванням вакцину витримують протягом 3-4 годин при кімнатній температурі (15-25°C). Перед тим час використання флакон з вакциною ретельно струшують для відновлення однорідності суспензії. Вакцину вводять одноразово в дозі 0,5 мл (ml) підшкірно в діяні ший або внутрішньом'язово в грудний м'яз. Рвацинація проводиться через 4-6 тижнів з використанням вакцини інактивованої масляним ад'ювантом, що містить ті ж самі компоненти.
Для вакцинації використовують звичайні або напівавтоматичні шпризи та голки, які стерилізують кип'ятінням протягом 15-20 хвилин. Допускається використання одноразових шприців. Не допускається застосування для стерилізації інструментів хімічними дезінфікуючими засобами. Перед застосуванням уважно прочитайте листівку-вкладку.

ЗАСЕРЕЖЕННЯ
Не слід вакцинувати клінічно хвору та/або ослаблену птицю. Не змішувати вакцину в одному шприці з іншими імунобіологічними і лікарськими препаратами.
Перод виведення (каренції) - нуль дб.

ЗБЕРІГАННЯ
В захищеному від світла місці за температури від +2°C до +8°C. Не заморозувати.
Після відкриття флакону його вист несбхідно використати протягом 24 годин.

ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
РПІВ:
Виробник: Сева-Філіаксія Ветеринарі Байолюджикас Ко Лта 1107 Будапешт, Салазас 5, Уорщина.

0 000000 000000



Продовження додатку 3
до реєстраційного
посвідчення
№ ВА-01005-02-21
від 14.02.2022



00000

Вакцина інактивована бактеріальна проти
інфекційного риніту та сальмонельозу птиці,
викликаного *Salmonella enteritidis*
Суспензія для ін'єкцій
Підшкірно, внутрішньом'язово
Стерильно

250 мл (ml)
500
доз (doses)



Одна доза вакцини містить *Avibacterium paragallinarum*, серотип А - щонайменше 7 log10 КУО, *Avibacterium paragallinarum*, серотип В - щонайменше 7 log10 КУО, *Avibacterium paragallinarum*, серотип С - щонайменше 7 log10 КУО, *Salmonella enteritidis* - щонайменше 4 log2 ТМА, гель гідроксиду алюмінію, розчин формальдегіду, тіомерсал, вода для ін'єкцій.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Вакцина призначена для імунізації племінних та несучих стад курей проти інфекційного риніту, спричиненого *Avibacterium paragallinarum* та сальмонельозу, спричиненого *Salmonella enteritidis*.

ДОЗУВАННЯ

Вакцину вводять одноразово в дозі 0,5 мл (ml) підшкірно в ділянці шиї або внутрішньом'язово в грудний м'яз. Перед застосуванням уважно прочитайте листівку-вкладку!

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не слід вакцинувати клінічно хвору та/або ослаблену птицю.

Не змішувати вакцину в одному шприці з іншими імунобіологічними і лікарськими препаратами. Період виведення (каренції) - нуль діб.

ЗБЕРІГАННЯ

В захищеному від світла місці за температури від +2°C до +8°C. Не заморожувати.

Після відкриття флакону, його вміст необхідно використати протягом 24 годин.

ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ РП№:

Виробник: Сева-Філаксія Ветеринарі
Байолоджикалс Ко Лтд 1107 Будапешт,
Сзалмас 5, Угорщина.

Дата
виготовлення:
Серія №:
Придатний до:



СЕВАК КОРИМУН 4 К, CEVAC CORYMUNE 4 K

Вакцина інактивована бактеріальна проти
інфекційного риніту та сальмонельозу птиці,
викликаного *Salmonella enteritidis*
Суспензія для ін'єкцій
Підшкірно, внутрішньом'язово
Стерильно

00000

500мл (ml)
1 0 0 0
доз (doses)



Одна доза вакцини містить *Avibacterium paragallinarum*, серотип А - щонайменше 7 log10 КУО, *Avibacterium paragallinarum*, серотип В - щонайменше 7 log10 КУО, *Avibacterium paragallinarum*, серотип С - щонайменше 7 log10 КУО, *Salmonella enteritidis* - щонайменше 4 log2 ТМА, гель гідроксиду алюмінію, розчин формальдегіду, тіомерсал, вода для ін'єкцій.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Вакцина призначена для імунізації племінних та несучих стад курей проти інфекційного риніту, спричиненого *Avibacterium paragallinarum* та сальмонельозу, спричиненого *Salmonella enteritidis*.

ДОЗУВАННЯ

Вакцину вводять одноразово в дозі 0,5 мл (ml) підшкірно в ділянці шиї або внутрішньом'язово в грудний м'яз. Перед застосуванням уважно прочитайте листівку-вкладку!

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не слід вакцинувати клінічно хвору та/або ослаблену птицю.

Не змішувати вакцину в одному шприці з іншими імунобіологічними і лікарськими препаратами.

Період виведення (каренції) - нуль діб.

ЗБЕРІГАННЯ

В захищеному від світла місці за температури від +2°C до +8°C. Не заморозувати.

Після відкриття флакону, його вміст необхідно використати протягом 24 годин.

ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

РПН:

Виробник: Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд І 107 Будапешт, Сзалас 5, Угорщина.

STD 487

Для
виповнення
Серія №:
Підпис:



СЕВАК КОРИМУН 4 К, SEVAC CORYMUNE 4 K

00000

Вакцина інактивована бактеріальна проти
інфекційного риніту та сальмонельозу птиці,
викликаного *Salmonella enteritidis*
Суспензія для ін'єкцій
Підшкірно, внутрішньом'язово
Стерильно

1500 мл (ml)
3000
доз (doses)



Одна доза вакцини містить *Avibacterium paragallinarum*, серотип А - щонайменше 7 log10 КУО, *Avibacterium paragallinarum*, серотип В - щонайменше 7 log10 КУО, *Avibacterium paragallinarum*, серотип С - щонайменше 7 log10 КУО, *Salmonella enteritidis* - щонайменше 4 log2 ТМА, гель гідроксиду алюмінію, розчин формальдегіду, тіомерсал, вода для ін'єкцій. STD 487

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Вакцина призначена для імунізації племінних та несучих стад курей проти інфекційного риніту, спричиненого *Avibacterium paragallinarum* та сальмонельозу, спричиненого *Salmonella enteritidis*.

ДОЗУВАННЯ

Вакцину вводять одноразово в дозі 0,5 мл (ml) підшкірно в ділянці шиї або внутрішньом'язово в грудний м'яз. Перед застосуванням уважно прочитайте листівку-вкладку!

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не слід вакцинувати клінічно хвору та/або ослаблену птицю.

Не змішувати вакцину в одному шприці з іншими імунобіологічними і лікарськими препаратами.

Період виведення (каренції) - нуль діб.

ЗБЕРІГАННЯ

В захищеному від світла місці за температури від +2°C до +8°C. Не заморозувати.

Після відкриття флакону, його вміст необхідно використати протягом 24 годин.

ЛИШЕ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

РП№:

Виробник: Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд І І 07 Будапешт, Сзаллас 5, Угорщина.