

SUIMUN ADIVAC+, СУІМУН АДІВАК+	
вакцина жива маркована gE – негативна суха культуральна проти хвороби Ауескі	
СКЛАД	Вакцина в дозі: вірусу хвороби Ауескі, gE–негативний штам “КБ” (штам Барта K61) ≥ 10 ⁵ ТЦД ₅₀ . Розчинник.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА	Ліофілізат; ліофілізат та розчинник.
ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	Після вакцинації у свиней імунний захист настає через 48 годин, а оптимальний рівень імунітету формується впродовж 7 діб і зберігається до 6 місяців. Методом імуноферментного аналізу можна визначити в сироватках крові вакцинованих свиней рівень антитіл до глікопротеїну gE або gB, що дозволить відрізнити вакцинованих від інфікованих свиней. Препарат лікувальними властивостями не володіє.
ВИД ТВАРИН	Свині.
ПОКАЗАННЯ	Для профілактики хвороби Ауескі.
ПРОТИПОКАЗАННЯ	Вакцину не застосовують виснаженим і хворим свиням.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ	Лікар ветеринарної медицини перед застосуванням вакцини повинен врахувати епізоотичну ситуацію в господарстві та районі. В роботі керуватися вимогами “Інструкції щодо заходів з профілактики та ліквідації хвороби Ауескі сільськогосподарських тварин та хутрових звірів”. Не використовують вакцину та розчинник у флаконах з тріщинами, без етикеток, порушенням укупорювання, зі зміною кольору, а також із закінченням терміном придатності та не використану впродовж 3-х годин з моменту розчинення.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ	В разі необхідності дегельмінтизацію свиней проводять за 2 тижні до вакцинації або через 2 тижні після.
ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ (ПРИ ПОРОСНОСТІ, ЛАКТАЦІЇ)	Поросних свиноматок не рекомендується вакцинувати за тиждень до опоросу. Під час лактації застережень до вакцинації немає.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ	Вакцину безпосередньо перед застосуванням розчиняють розчинником з розрахунку 2,0 мл на дозу. В якості розчинника дозволяється використовувати стерильний фізіологічний розчин. Вакцину вводять по 2,0 мл внутрішньом’язово в ділянці шийних м’язів або інтраназально по 1,0 мл в кожную ніздрю. Схема вакцинації: Все поголів’я свиней, яке щеплюється вперше, вакцинують внутрішньом’язово двічі з інтервалом 3-4 тижні (масова вакцинація). В подальшому: Свиноматки і хряки – масова вакцинація 3 рази на рік. Якщо в господарстві присутній інтенсивний тиск польового вірусу – протягом першого року проводять 4 масові вакцинації (кожні три місяці). Ремонтний молодняк вакцинують двократно. Перший раз – за два місяці до осіменіння з ревакцинацією – через 3-4 тижні. Поросят вакцинують двократно. Перший раз вакцинують у віці 9 тижнів, другий – в 12 тижнів. Якщо інфікування поросят в господарстві має місце до 10-тижневого віку (раннє інфікування), то поросят вакцинують інтраназально по 1,0 мл в кожную ніздрю в підсисний період в віці 2-3 тижні та дворазово внутрішньом’язово в віці 6-8 і 9-12 тижнів. Оптимальну схему вакцинації для кожного господарства розробляють за результатами серологічного моніторингу проб сировоток крові свиней.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ	В окремих випадках введення вакцини може викликати у свиней алергічну реакцію або короточасне підвищення температури тіла на один градус при задовільному загальному стані і збереженні апетиту. У неблагополучних пунктах (господарствах) після імунізації можлива загибель тварин, які раніше були інфіковані епізоотичним вірусом хвороби Ауескі або перебували в інкубаційному періоді захворювання.
ПЕРІОД ВИВЕДЕННЯ	Забій тварин на м'ясо не залежить від строку вакцинації.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ І ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ, КОТРІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ВІП	Дотримуватись правил асептики, особистої гієни та правил роботи з тваринами.
ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З НЕВИКОРИСТАНИМ ВІП, СПОСОБИ ЙОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ І УТИЛІЗАЦІЇ	Вакцину з закінченим терміном дії, залишки вакцини, шприці з голками необхідно знешкодити кип'ятінням впродовж 30 хвилин.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	24 місяці. Три години після розчинення вакцини.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ	Вакцина у темному недоступному для дітей місці при температурі від 2 до 8 °С або до мінус 20 °С. Розчинник у темному місці при температурі від 2 до 8 °С.
УПАКОВКА	Вакцина у флаконах зі скла по 5, 10, 20, 50, 100 доз. Розчинник у скляних або пластикових флаконах по 10, 20, 40, 100 або 200 мл відповідно.
ПРАВИЛА ВІДПУСКУ	За рецептом.
НАЗВА ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВЛАСНИКА РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ І ВИРОБНИКА	ТОВ „БІОТЕСТЛАБ” 08601 Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська 57-А.
АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА:	08601 Київська обл., м. Васильків, вул. Лістрового Олександра, буд. 1/3.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред'явлення рекламцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.