

SUIMUN ADIVAC, АДІВАК	
Вакцина інактивована маркована gE-негативна проти хвороби Ауєскі.	
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА	Емульсія.
СКЛАД	Вірус хвороби Ауєскі gE-негативний, штам «77/3В» (клон штаму Barta K61) ≥ 8 Іg ТЦД ₅₀ в мл до інактивації.
ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТІВОСТІ	Вакцина забезпечує захист щепленого поголів'я від захворювання на хворобу Ауєскі. Лікувальними властивостями не володіє. Імунітет у тварин настає через 7-10 діб після вакцинації і зберігається до 6 місяців. Методом імуноферментного аналізу можна визначити в сироватках крові вакцинованих свиней рівень антитіл до глікопротеїну gE або gВ, що дозволить відрізнити вакцинованих від інфікованих тварин.
ВИД ТВАРИН	Свині, ВРХ, вівці, хутрові звірі та м'ясоїдні.
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ	Для профілактики хвороби Ауєскі.
ПРОТИПОКАЗАННЯ	Не вакцинують виснажених і хворих тварин.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ	Дотримуватись правил асептики. Не використовувати вакцину з флаконів з тріщинами, без етикеток, порушенням укупорювання, зміною кольору та консистенції вмістимого, а також вакцину, не використану впродовж 3-х годин після її відкупорювання або заморожену. Допускається розшарування вакцини на олійну та водну фракції у верхній частині флакону, що зникає після збовтування.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ	Не змішувати з іншими лікувальними та профілактичними засобами.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ЛАКТАЦІЇ	Ремонтних свинок вакцинують за два місяці до осіменіння. Під час лактації застережень до вакцинації немає.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ	Вакцину вводять внутрішньом'язово: свиням в ділянці шийних м'язів або внутрішньої поверхні стегна: старшим 6-ти тижневого віку по 2,0 мл, молодшим - по 1,0 мл. Оптимальну схему вакцинації, для кожного господарства розробляють за результатами серологічного моніторингу проб сироваток крові свиней. Все поголів'я свиней, яке щеплюється вперше, вакцинують двічі з інтервалом 3-4 тижні (масова вакцинація). В подальшому: Свиноматки і хряки - масова вакцинація 3 рази на рік. Якщо в господарстві присутній інтенсивний тиск польового вірусу протягом першого року проводять 4 масові вакцинації (кожні три місяці). Ремонтний молодняк вакцинують двократно. Перший раз - за два місяці до осіменіння з ревакцинацією - через 3-4 тижні. Поросят вакцинують двократно. Перший раз вакцинують у віці 6-8 тижнів, та повторно через 3-4 тижні. Якщо інфікування поросят в господарстві має місце до 10-тижневого віку (раннє інфікування), то поросят вакцинують в дозі 1,0 мл з 15-ти денного віку, повторно - через 3-4 тижні в дозі 2,0 мл; великий рогатій худобі вакцину вводять у ділянці крупу: старшим 6-ти тижневого віку по 2,0 мл, молодшим - по 1,0 мл; вівцям тільки у неблагополучному господарстві. Ягнят у віці 1-6 місяців щеплять у дозі 0,5 мл; овець старше 6 місяців - у дозі 1,0 мл; здоровим та умовно здоровим хутровим звірям та м'ясоїдним з 60-денного віку у дозі 0,5 мл. Звірів основного стада ревакцинують у дозі 0,5 мл через 4 місяці, в подальшому через кожні 6 місяців.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ	В окремих випадках введення вакцини може викликати у тварин алергічну реакцію або короточасне підвищення температури тіла на один градус при задовільному загальному стані і збереженні апетиту. У неблагополучних свинарських господарствах після імунізації можлива загибель тварин, які раніше були інфіковані епізоотичним вірусом хвороби Ауескі.
ПЕРЕДОЗУВАННЯ (СИМПТОМИ, НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ)	Не викликає захворювання тварин на хворобу Ауескі при передозуванні вакцини в два рази.
ПЕРІОД ОЧІКУВАННЯ	Нуль днів.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ І ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ВІП	Дотримуватись правил асептики та роботи з тваринами. У випадку випадкової самоін'єкції необхідно негайно звернутись за медичною допомогою, маючи при собі листівку-вкладку на даний препарат.
ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З НЕВИКОРИСТАНИМ ВІП, СПОСОБИ ЙОГО НЕШКОДЖЕННЯ І УТИЛІЗАЦІЇ	Не використану вакцину із закінченням терміном дії, голки, шприці та флакони з залишками вакцини знезаражують кип'ятінням впродовж 30 хвилин.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	24 місяці. Після першого відбору вакцину у флаконі використати впродовж 3-х годин.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ	В темному, не доступному для дітей місці при температурі від 2 до 8 °С. Не заморожувати! При транспортуванні вакцини допускаються коливання температури в межах від 0 до 20 °С впродовж 5 діб що не спричиняє негативного впливу на якість препарату
УПАКОВКА ТА ФАСУВАННЯ	Вакцина у флаконах зі скла або пластику, закритих гумовою пробкою та алюмінієвим ковпачком, що містять по 10, 50 або 100 доз вакцини.
ВЛАСНИК РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» вул. Володимирська, буд. 57-А, м. Васильків, Київська обл., 08600, Україна
ВИРОБНИК ГОТОВОГО ПРОДУКТУ	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» вул. Володимирська, буд. 57-А, м. Васильків, Київська обл., 08600, Україна
ПРАВИЛА ВІДПУСКУ	За рецептом.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2 по три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.