

ДЕКОКЦИЛ
(гранули для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Гранули від світло-коричневого до коричневого кольору зі слабким специфічним запахом.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину:

декоквінат - 60 мг.

Допоміжні речовини: борошно пшеничне, діоксид кремнію, лецитин.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP51_t антипротозойні ветеринарні препарати (ATCvet QP51AX14, декоквінат)

Декоквінат, що входить до складу препарату, має широкий спектр антипротозойної дії, ефективний щодо *Toxoplasma spp*, *E. bovis*, *E. zuernii*, *E. ellipsoidalis*, *E. cylindrica*, *Eimeria arloingi*, *E. ninaekohljakimovae*, *E. intricata*, *E. faurei* та інших видів еймерій.

Декоквінат є 4-гідроксиквіноліну анти протозойною сполукою, стримує розвиток еймерій на початкових стадіях їх розвитку. Механізм дії декоквінату полягає в порушенні транспорту електронів у системі мітохондріальних цитохромів еймерій.

Декоквінат виявляє свою дію в травному каналі тварині, слабо абсорбується і незмінним виводиться з фекаліями. Внаслідок цього залишки декоквінату в тканинах є незначними та швидко виводяться.

Сумісний з вітамінами і кормовими добавками, які використовують в тваринництві. Препарат помірно токсичний для теплокровних тварин.

Застосування

Лікування еймеріозів великої рогатої худоби (телят) та овець (ягнят), спричиненими еймеріями:

- велика рогата худоба (телята): *Eimeria bovis*, *E. zuernii*, *E. ellipsoidalis*, *E. cylindrica*;
- вівці (ягнята): *Eimeria arloingi*, *E. ninaekohljakimovae*, *E. intricata*, *E. faurei*; *Toxoplasma gondii*-

Лікування вівцематок при ураженні токсоплазмозом для упередження абортів і перинатальних втрат.

Дозування

Лікування ягнят та телят при еймеріозах:

Доза препарату становить 1,67 кг препарату/1 т корму, що еквівалентно 100 мг декоквінату /1 кг комбікорму (100 ppm).

Рекомендована доза для тварин становить 1 мг декоквінату/кг маси тіла на добу. Якщо ягням згодовується обмежена кількість комбікорму (напр., менше 100 г/10 кг маси тіла щоденно) або телятам згодовують корму менше від рекомендованого 500 г/50 кг маси тіла на добу, то дозу препарату необхідно відповідно підвищити, щоб досягнути рекомендованої дози (1 мг декоквінату /кг маси тіла на добу).

Застосовують з кормом впродовж 28 діб. За необхідності курс лікування може бути тривалішим.

Наприклад: Добове споживання комбікорму

Ягнята (г/кг маси тіла)	Телята (г/кг маси тіла)	ДЕКОКЦИЛ® (доза кг/т)
100/10	500/50	1,67
75/10	375/50	2,22
50/10	250/50	3,34

Лікування еймеріозів ягнят та телят:

Рекомендована доза декоквінату становить 50 мг/кг корму (50 ppm), що відповідає 833 г препарату ДЕКОКЦИЛ®/т комбікорму. Якщо ягнята і телята отримують обмежену кількість корму (напр., менше 500 г /50 кг маси тіла на добу), то дозу препарату необхідно відповідно підвищити, щоб досягнути рекомендованої дози 0,5 мг декоквінату/кг маси тіла на добу.

24.02.2022

Препарат згодовують із комбікормом щонайменше впродовж 28 діб вівцематкам у період можливого виділення ооцист і небезпеки зараження ягнят (тобто перед, протягом або після окоту) та телятам у період загрози виникнення еймеріозів.

Такий спосіб застосування препарату ДЕКОКЦИЛ* з комбікормом забезпечує ефективний контроль виділення ооцист від вівцематок. У більш серйозних випадках дозу препарату необхідно збільшити удвічі.

Лікування вівцематок при ураженні токсоплазмозом.

Застосування препарату ДЕКОКЦИЛ® з комбікормом для вівцематок:

Застосовують вівцематкам у період вагітності (суягності) для упередження абортів і перинатальних втрат. Рекомендована лікувальна доза діючої речовини препарату становить 2,0 мг/кг маси тіла на добу:

другий триместр вагітності (середній період суягності): 6,68 кг препарату ДЕКОКЦИЛ*/т комбікорму, згодовувати такий корм у дозі 250 г/50 кг маси тіла на добу;

третій триместр вагітності (пізній період суягності): 3,34 кг препарату ДЕКОКЦИЛ*/т комбікорму, згодовувати такий корм у дозі 500 г/50 кг маси тіла на добу.

Якщо вівцематки отримують іншу кількість корму, то необхідно розрахувати відповідно кількість препарату, щоб тварини отримували рекомендовану дозу декоквінату (2,0 мг/кг маси тіла).

Препарат необхідно згодовувати протягом останніх двох триместрів вагітності (останні 14 тижнів).

На фермах, де раніше були зареєстровані випадки абортів, пов'язані із токсоплазмозом, рекомендують з економічної точки зору чутливих до токсоплазмозу вівцематок (придбані, і введені у стадо нові тварини) утримувати окремо від інших та своєчасно згодовувати їм препарат з комбікормом, оскільки більшість старших вівцематок мають набутий імунітет до токсоплазмозу.

При змішуванні препарату з кормом необхідно забезпечити його рівномірний розподіл (багатоступінчасте змішування).

Протипоказання

Не застосовують самкам (вівцематкам, коровам) під час лактації, молоко яких використовують в їжу людям!

Застереження

Період виведення (каренції): м'ясо великої рогатої худоби, вівці - 0 діб.

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватися основних правил гігієни та безпеки, що прийняті при роботі з ветеринарними препаратами.

Форма випуску

Пакети з плівки поліетиленової по 50, 100, 500 г, 1 кг та мішки по 5, 10, 20 та 25 кг: Контейнери полімерні по 100, 500 г та 1 кг.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 0 до 25 °С.

Термін придатності

1 рік з дати виробництва.

Після відкриття первинної упаковки термін придатності - 3 місяці, термін зберігання у готовому кормі - 3 місяці.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення та виробника:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Встсинтез"

61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна