



Д.А. Мороз

### Коротка характеристика препарату

#### 1. Назва ветеринарного препарату

AviPro™ THYMOVAC - вакцина жива ліофілізована проти інфекційної анемії курчат.

#### 2. Якісний і кількісний склад

Кожна доза вакцини містить:

живий вірус анемії курчат, штам Сух-1: щонайменше  $10^{4.5}$  ТЦД<sub>50</sub> (TCID<sub>50</sub>).

#### 3. Фармацевтична форма

Ліофілізат.

#### 4. Імунобіологічні властивості

Стимулює активний імунітет проти збудника вірусної анемії курчат у курей батьківського поголів'я та передає пасивний імунітет потомству. Імунітет формується впродовж 4 тижнів та триває щонайменше 43 тижні. Курчата захищені з першого дня життя.

#### 5. Клінічні особливості

##### 5.1. Вид тварин

Кури.

##### 5.2. Показання до застосування

Для активної імунізації курей проти віремії, виділення та трансмісії вірусу анемії курчат на яйця. Для пасивного захисту, що передається потомству, від клінічних проявів та уражень інфекційною анемією курчат.

##### 5.3. Протипоказання

Вакцину не можна застосовувати клінічно хворій та ослабленій птиці.

##### 5.4. Побічна дія

Не виявлено.

##### 5.5. Особливі застереження при використанні

Слід використати увесь вміст флакону після його відкупорення якнайшвидше для того, щоб уникнути забруднення та втрати активності вакцини.

##### 5.6. Застосування під час періоду несучості

Не слід застосовувати. Не застосовувати за шість тижнів до початку періоду несучості.

##### 5.7. Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Необхідно слідкувати, щоб питна вода та ємності для води не містили дезінфектантів та миючих засобів.

Інформація щодо безпечності та ефективності вакцини при застосуванні з іншими ветеринарними лікувальними препаратами відсутня. Тому вакцину не можна змішувати з іншими ветеринарними лікувальними препаратами. Рішення щодо застосування вакцини до чи після застосування інших ветеринарних лікувальних препаратів слід приймати індивідуально у кожному конкретному випадку.

##### 5.8. Дози і способи введення птиці

Застосовують методом випоювання. Одну дозу вакцини використовують одній птиці, починаючи з 8-ми тижневого віку.

#### Метод застосування

Використовуйте лише прохолодну, чисту та свіжу воду, не хлоровану та без іонів металу.

Видаліть алюмінієвий ковпачок та пробку з флакону із вакциною.

Відкрийте флакон з вакциною під водою. Розчиніть вміст флакону у відповідній кількості води та ретельно змішайте.

Необхідно приготувати лише ту кількість вакцинного розчину, яка може бути використана впродовж 2-х годин.

Після розчинення застосовуйте готовий до використання вакцинний розчин негайно.

**Застосування методом випоювання:**

Все обладнання, що застосовується для вакцинації (труби, поїлки і т.д.) повинно бути повністю чистим та не містити залишків дезінфектантів, миючих засобів і т.д.

Поїлки та поїльні лінії необхідно звільнити від води, щоб рівень води перед додаванням вакцинного розчину у поїлках був мінімальним. Всі труби повинні бути спорожнені від звичайної води, щоб у поїлках містилася лише суміш води з вакциною.

Визначте необхідну кількість води відповідно до кількості птиці, яку будете вакцинувати (див. далі).

Додавання Avibblue позитивно впливає на стабільність вакцини. Прочитайте інструкцію на Avibblue перед додаванням його до вакцинного розчину.

Спочатку старанно розчиніть вакцину в невеликій ємності (наприклад, 1 літровій) та добре збовтайте. Флакон з вакциною старанно сполосніть та повністю спорожніть його. Потім розбавте отриману вакцинну суспензію у 5 чи 10 літровій ємності та ще раз добре перемішайте. Слід використовувати увесь вміст флаконів з вакциною лише на один пташник чи одну поїльну систему, оскільки розподіл вакцинного розчину може привести до помилок у дозуванні.

До вакцинної суспензії додають прохолодну свіжу воду із розрахунку орієнтовно 1000 доз вакцини розчиняють у 1 літрі води на кількість днів життя для 1000 курей, тобто 10 літрів води було б необхідно для 1000 курей 10-денного віку.

В разі сумніву, визначте кількість води, спожитої за день до вакцинації.

Оскільки птиця п'є воду по-різному, може виникнути необхідність відмовити їй у воді за 2-3 години перед вакцинацією, щоб гарантувати що вся птиця прийме вакцинний розчин під час періоду вакцинації.

**5.9. Передозування**

Не відмічено.

**5.10. Спеціальні застереження**

Із організму вакцинованої птиці може виділятися вакцинний штам до 4 тижнів після вакцинації. Тому впродовж цього часу необхідно уникати контакту між вакцинованою та невакцинованою птицею.

Слід використати увесь вміст флакону відразу після його відкупорення.

**5.11. Період виведення (каренції)**

Нуль днів.

**5.12. Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які вводять засоби захисту птиці**

Вакцина містить живий вірус. Уникати контамінації при розбризкуванні чи розливанні. Необхідно використовувати захисні рукавиці та окуляри під час проведення вакцинації.

Обслуговуючому персоналу рекомендовано мити та дезінфікувати руки після вакцинації.

**6. Фармацевтичні особливості**

**6.1. Основні форми несумісності**

Не змішувати з іншими ветеринарними лікувальними препаратами.

**6.2. Термін придатності**

24 місяці.

**6.3. Особливі застереження щодо зберігання**

Зберігати в сухому, темному місці за температури від 2 до 8 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Берегти від дії прямих сонячних променів та від морозу.

Готовий до використання вакцинний розчин берегти від дії прямих сонячних променів та зберігати за температури не вище 25 °С. Не заморозувати.

Термін придатності після розчинення: 2 години.

Після закінчення терміну придатності вакцину не використовувати.

**6.4. Природа і склад контейнера первинного упакування**

Скляні флакони по 500, 1000, 2500, 5000, 10000 доз, закриті гумовими корками під алюмінієву обкатку.

**6.5. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення**

Еланко ГмбХ, Хайнц-Ломан-Штр. 4, 27472 Куксхафен, Німеччина.

**6.6. Назва та місцезнаходження виробника**

Ломан Анімал Хелс ГмбХ, Хайнц-Ломан-Штр. 4, 27472 Куксхафен, Німеччина.

**6.7. Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним засобом**

Пусті та відкриті флакони знешкоджують згідно з нормами місцевого законодавства.

**6.8. Правила відпуску**

Без рецепту.

**7. Додаткова інформація**

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 №2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.

### Листівка-вкладка

**Назва ветеринарного препарату**

AviPro™ THYMOVAC - вакцина жива ліофілізована проти інфекційної анемії курчат.

**Склад**

Кожна доза вакцини містить:

живий вірус анемії курчат, штам Cux-1: щонайменше  $10^{4.5}$  ТЦД<sub>50</sub> (TCID<sub>50</sub>).

**Фармацевтична форма**

Ліофілізат.

**Імунобіологічні властивості**

Стимулює активний імунітет проти збудника вірусної анемії курчат у курей батьківського поголів'я та передає пасивний імунітет потомству. Імунітет формується впродовж 4 тижнів та триває щонайменше 43 тижні. Курчата захищені з першого дня життя.

**Вид тварин**

Кури.

**Показання до застосування**

Для активної імунізації курей проти віремії, виділення та трансмісії вірусу анемії курчат на яйця. Для пасивного захисту, що передається потомству, від клінічних проявів та уражень інфекційною анемією курчат.

**Протипоказання**

Вакцину не можна застосовувати клінічно хворій та ослабленій птиці.

**Застереження при застосуванні**

Слід використати увесь вміст флакону після його відкупорення якнайшвидше для того, щоб уникнути забруднення, та втрати активності вакцини.

Із організму вакцинованої птиці може виділятися вакцинний штам до 4 тижнів після вакцинації. Тому впродовж цього часу необхідно уникати контакту між вакцинованою та невакцинованою птицею.

**Взаємодія з іншими засобами**

Необхідно слідкувати, щоб питна вода та ємності для води не містили дезінфектантів та миючих засобів.

Інформація щодо безпечності та ефективності вакцини при застосуванні з іншими ветеринарними лікувальними препаратами відсутня. Тому вакцину не можна змішувати з іншими ветеринарними лікувальними препаратами. Рішення щодо застосування вакцини до чи після застосування інших ветеринарних лікувальних препаратів слід приймати індивідуально у кожному конкретному випадку.

**Особливі вказівки під час несучості**

Не слід застосовувати. Не застосовувати за шість тижнів до початку періоду несучості.

**Спосіб застосування та дози**

Застосовують методом випоювання. Одну дозу вакцини використовують одній птиці, починаючи з 8-ми тижневого віку

**Метод застосування**

Використовуйте лише прохолодну, чисту та свіжу воду, не хлоровану та без іонів металу.

Видаліть алюмінієвий ковпачок та пробку з флакону із вакциною.

Відкрийте флакон з вакциною під водою. Розчиніть вміст флакону у відповідній кількості води та ретельно змішайте.

Необхідно приготувати лише ту кількість вакцинного розчину, яка може бути використана впродовж 2-х годин.

Після розчинення застосовуйте готовий до використання вакцинний розчин негайно.

#### **Застосування методом випоювання:**

Все обладнання, що застосовується для вакцинації (труби, поїлки і т.д.) повинно бути повністю чистим та не містити залишків дезінфектантів, миючих засобів і т.д.

Поїлки та поїльні лінії необхідно звільнити від води, щоб рівень води перед додаванням вакцинного розчину у поїлках був мінімальним. Всі труби повинні бути спорожнені від звичайної води, щоб у поїлках містилася лише суміш води з вакциною.

Визначте необхідну кількість води відповідно до кількості птиці, яку будете вакцинувати (див. далі).

Додавання Avibblue позитивно впливає на стабільність вакцини. Прочитайте інструкцію на Avibblue перед додаванням його до вакцинного розчину.

Спочатку старанно розчиніть вакцину в невеликій ємності (наприклад, 1 літровій) та добре збовтайте. Флакон з вакциною старанно сполосніть та повністю спорожніть його. Потім розбавте отриману вакцинну суспензію у 5 чи 10 літровій ємності та ще раз добре перемішайте. Слід використовувати увесь вміст флаконів з вакциною лише на один пташник чи одну поїльну систему, оскільки розподіл вакцинного розчину може привести до помилок у дозуванні.

До вакцинної суспензії додають прохолодну свіжу воду із розрахунку орієнтовно 1000 доз вакцини розчиняють у 1 літрі води на кількість днів життя для 1000 курей, тобто 10 літрів води було б необхідно для 1000 курей 10-денного віку.

В разі сумніву, визначте кількість води, спожитої за день до вакцинації.

Оскільки птиця п'є воду по-різному, може виникнути необхідність відмовити їй у воді за 2-3 години перед вакцинацією, щоб гарантувати що вся птиця прийме вакцинний розчин під час періоду вакцинації.

#### **Побічні ефекти**

Не виявлено.

#### **Період виведення (каренції)**

Нуль днів.

#### **Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП**

Вакцина містить живий вірус. Уникати контамінації при розбризкуванні чи розливанні. Необхідно використовувати захисні рукавиці та окуляри під час проведення вакцинації.

Обслуговуючому персоналу рекомендовано мити та дезінфікувати руки після вакцинації.

#### **Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації**

Пусті та відкриті флакони знешкоджують згідно з нормами місцевого законодавства.

#### **Термін придатності**

24 місяці.

#### **Умови зберігання і транспортування**

Зберігати в сухому, темному місці за температури від 2 до 8 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Берегти від дії прямих сонячних променів та від морозу.

Готовий до використання вакцинний розчин берегти від дії прямих сонячних променів.

Зберігати за температури не вище 25 °C. Не заморожувати.

Термін придатності після розчинення: 2 години.

Після закінчення терміну придатності вакцину не використовувати.

#### **Упаковка**

Скляні флакони по 500, 1000, 2500, 5000, 10000 доз, поміщені по 10 штук у картонні коробки.

#### **Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення**

Еланко ГмбХ, Хайнц-Ломан-Штр. 4, 27472 Куксхафен, Німеччина.

#### **Назва та місцезнаходження виробника**

Ломан Анімал Хелс ГмбХ, Хайнц-Ломан-Штр. 4, 27472 Куксхафен, Німеччина.

**Правила відпуску**

Без рецепту.

**Додаткова інформація**

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 №2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.

Додаток № 3  
до реєстраційного посвідчення  
№ BA-00668-02-13  
від 14.02.2022



**Макет етикетки  
Маркування на первинне пакування\***



\*Вакцина міститься у флаконах по 500, 1000, 2500, 5000, 10000 доз.

Продовження додатку № 3  
до реєстраційного посвідчення  
№ ВА-00668-02-13  
від 14.02.2022

**Макет етикетки  
Маркування на вторинне пакування\***



Серія №:

До:

\*Вакцина міститься у флаконах по 500, 1000, 2500, 5000, 10000 доз.  
Флакони поміщені у картонні коробки по 10 шт. у кожній