

29.03.2024

Апраміцину сульфат 50%
(водорозчинний порошок для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Порошок світло-жовтого або світло-коричневого кольору.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину:

апраміцину сульфат — 500,0 мг.

Допоміжна речовина: мальтодекстрин.

Фармакологічні властивості

АТС-vet класифікаційний код: QJ01 — антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01GB90 — Апраміцин.

Апраміцину сульфат — антибіотик із групи аміноглікозидів. Діє бактерицидно проти грамнегативних бактерій — *Escherichia Coli*, *Vibrio Coli*, *Salmonella spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Proteus spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Klebsiella spp.*, *Shigella spp.*, *Campylobacter spp.*, *Brachyspira hyodysenteriae*, деяких грампозитивних бактерій — *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, деяких видів мікоплазм *Mycoplasma hyopneumoniae*. Не активний відносно анаеробних мікроорганізмів. Пригнічує синтез білка мікроорганізмів шляхом незворотного зв'язування з 30S-субодиницею рибосом.

При пероральному застосуванні слабо всмоктується з травного каналу, що забезпечує там високу антибактеріальну концентрацію. Не метаболізується в організмі тварин, виводиться в незміненому вигляді переважно з фекаліями, частково — із сечею.

Застосування

Телята та ягнята, віком до 6 тижнів: лікування тварин, хворих на гастроентерит, що спричинений *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Proteus spp.*, чутливими до апраміцину.

Поросята віком до 4 місяців: лікування тварин, хворих на гастроентерит, дизентерію, що спричинені *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Proteus spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Campylobacter spp.*, *Brachyspira hyodysenteriae*, чутливими до апраміцину.

Курчата-бройлери, ремонтний молодняк курей-несучок: лікування птиці при захворюваннях травного каналу, спричинених *Escherichia coli*, чутливою до апраміцину.

Кролі: лікування тварин при захворюваннях травного каналу, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до апраміцину.

Дозування

Препарат застосовують перорально з питною водою, телятам і ягням дають з молоком або його замінником молока 1 раз на добу, у дозах:

телята віком до 6 тижнів — 40-80 мг препарату (20-40 мг апраміцину сульфату) на 1 кг маси тіла, протягом 5 діб;

поросята віком до 4 місяців — 15-25 мг препарату (7,5-12,5 мг апраміцину сульфату) на 1 кг маси тіла або 250-500 мг препарату (125-250 мг апраміцину сульфату) на 1 л питної води, протягом 7 діб;

29.03.2024

ягнята віком до 6 тижнів — 20 мг препарату (10 мг апраміцину сульфату) на 1 кг маси тіла. Курс лікування— 3-5 діб;

ремонтний молодняк курей-несучок, курчата-бройлери — 50-100 мг препарату (25-50 мг апраміцину сульфату) на 1 кг маси тіла або 0,5-1 г препарату (250-500 мг апраміцину сульфату) на 1 л питної води. Курс лікування - 5 діб;

кролі — 20-30 мг препарату (10-15 мг апраміцину сульфату) на 1 кг маси тіла або 100-200 мг препарату (50-100 мг апраміцину сульфату) на 1 л питної води. Курс лікування становить 5-7 діб.

Перед застосуванням дозу препарату додають до води, молока чи його замітника у співвідношенні 1 : 5-10, розчиняють протягом 3-5 хвилин, перемішують і доводять об'єм розчину до необхідної кінцевої концентрації.

При використанні препарату з питною водою дозу антибіотика змішують з половиною добового об'єму споживання води.

Розчин не можна готувати в іржавих металевих ємностях, оскільки іони заліза знижують активність антибіотика.

Протипоказання

Не використовувати тваринам із підвищеною чутливістю до апраміцину та інших аміноглікозидів.

Не застосовувати тваринам з нирковою недостатністю.

Не застосовувати жуйним тваринам з функціонально розвиненими передшлунками.

Не застосовувати вагітним та лактуючим тваринам, молоко яких споживають люди.

Не застосовувати одночасно з β -лактамами антибіотиками через зниження антибактеріальної активності та іншими аміноглікозидами через можливе посилення нефротоксичної дії.

Не використовувати курам-несучкам, яйця яких споживають люди, та молодим курам за чотири тижні до початку яйцекладки.

Не застосовувати для профілактики! Не застосовувати котам.

Застереження

Побічна дія

При застосуванні в рекомендованих дозах побічної дії не виникає. В окремих випадках у телят, поросят та кролів може спостерігатися діарея, яка швидко зникає після припинення застосування препарату.

Особливі застереження при використанні

Не застосовувати для профілактики! Перед лікуванням провести тест на чутливість збудника до апраміцину.

Перед використанням очистити від іржі систему водопοїння.

Застосування під час вагітності, лактації

Не застосовують.

Період виведення (каренція)

Після останнього застосування препарату забій телят на м'ясо дозволяють через 28 діб, людям вживати в їжу м'ясо поросят, ягнят, кроликів, курчат можна без обмежень. М'ясо, отримане раніше зазначеного терміну, утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

29.03.2024

Форма випуску

Полімерні пакети або контейнери по 500, 1000 г.

Зберігання

У сухому темному, недоступному для дітей місці за температури від 4 до 25 °С.

Термін придатності

2 роки.

Водний розчин препарату використати протягом 3 діб, розчин на основі молока або його замінильника — в день приготування.

Лише для ветеринарної медицини!

Власник реєстраційного посвідчення:

ТОВ „БРОВАФАРМА”

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400

Україна

Виробник готового продукту:

ТОВ „БРОВАФАРМА”

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400

Україна