

POLIMUN La-Sota inac, ПОЛІМУН Ла-Сота інак



вакцина проти ньюкаслської хвороби, інактивована.

СКЛАД	0,1 мл (ml) вакцини містить: Активуючі речовини: інактивовані антиген вірусу Ньюкаслської хвороби штам «Ла-Сота», що індукує утворення специфічних антитіл в титрах $\geq 4,5 \log_2 \text{HI}^*$; * HI – титр антитіл, визначений в РЗГА. Допоміжні речовини: Інактиватор – формальдегід ≤ 50 мкг (mcg) або бінарний етиленмін (не є компонентом кінцевого продукту). Ад'ювант – парафін рідкий легкий Консервант – тіомерсал ≤ 10 мкг (mcg).
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА	Емульсія.
ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	Вакцина стимулює формування специфічного імунітету у птиці проти захворювання на Ньюкаслську хворобу починаючи з 14-ї доби після введення. Лікувальних властивостей не має.
ВИД ТВАРИН	Свійська птиця (кури, голуби).
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ	Для профілактичної імунізації птиці проти Ньюкаслської хвороби.
ПРОТИПОКАЗАННЯ	Забороняється вакцинувати птицю яка: - знаходиться в інкубаційному періоді інфекційного захворювання; - знаходиться у стані виснаження; - уражена гельмінтами; - перебуває у стресовому стані, викликаному транспортуванням, впливом зовнішнього середовища, або у іншому імуносупресивному стані. Напруженість імунітету може бути недостатньою у випадках, коли вакцина була застосована не відповідно до листівки вкладки.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ	Перед використанням вакцину підігрівають до температури 20-25°C, флакони ретельно струшують. При вакцинації необхідно дотримуватись правил асептики та особистої безпеки. Дозволяється використовувати вакцину з незначним розшаруванням у верхній частині флакону, що зникає при струшуванні.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ТА ІНШІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ	Не вивчалась. Не рекомендується змішувати з іншими лікувальними та профілактичними засобами.
ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ (В ПЕРІОД НЕСУЧОСТІ)	Не вакцинувати птицю в період несучості.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ	Вакцину вводять птиці з добового віку внутрішньом'язово в ділянку стегна або грудних м'язів чи підшкірно – в область шиї. Рекомендований об'єм дози для курей у різному віці: 1–70 діб життя – 0,1 - 0,2 мл; старше 70 добового віку - 0,2-0,3 мл. Рекомендований об'єм імунізуючої дози для голубів - 0,2 мл починаючи із 28-добового віку.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ	Вакцина не спричинює клінічно виражену реакцію на введення.
ПЕРЕДОЗУВАННЯ	Введення двох доз вакцини не впливає негативно на птицю.
ПЕРІОД ВИВЕДЕННЯ (КАРЕНЦІЇ)	Нуль діб.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ І ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ВІП (ВЕТЕРИНАРНИЙ ІМУНОБІОЛОГІЧНИЙ ПРЕПАРАТ)	Флакони з вакциною перед застосуванням підігрівають до кімнатної температури та ретельно струшують. Не використовують вакцину у флаконах з тріщинами, без етикеток, порушеним укрупнюванням, заморожену, не використану впродовж 10 годин з моменту першого відбору або із закінченим терміном придатності.
ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З НЕВИКОРИСТАНИМ ВІП, СПОСОБИ ЙОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ І УТИЛІЗАЦІЇ	Вакцину із закінченим терміном придатності, порожні флакони, шприці та флакони з залишками вакцини знешкоджують кип'ятінням впродовж 15 хвилин.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	24 місяці. Вакцину після першого відбору препарату з флакону необхідно використати впродовж 10 годин.
ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ	Зберігати в темному, недоступному для дітей місці при температурі від 2 до 8°C. Не заморожувати!
УПАКОВКА ТА ФАСУВАННЯ	Флакони із пластику або скла по 5,0 (50 доз); 10,0 (100 доз); 100,0 (1000 доз); 200,0 (2000 доз); 250,0 (2500 доз) або 500,0 (5000 доз) мл вакцини, закриті гумовими пробками та закатані алюмінієвими ковпачками.
НАЗВА, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І МІСЦЕ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ	ТОВ „БІОТЕСТАБ” 08601 Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська 57-А. Адреса виробництва: 08601 Київська обл., м. Васильків, вул. Лістрового Олександра, буд. 1/3.
ПРАВИЛА ВІДПУСКУ	Без рецепту.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення реклаमाцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.