

06.02.2023

**Ацепромал**  
**(розчин для ін'єкцій)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Розчин світло-жовтого кольору, прозорий.

**Склад**

1 мл препарату містить діючу речовину (мг):

ацепромазину малеат — 10,0.

Допоміжні речовини: хлорбутанолу гідрат, метилпарабен, пропілпарабен, натрію гідроокис, пропіленгліколь, вода високоочищена.

**Фармакологічні властивості**

АТС-vet класифікаційний код: QN05AA04 — Ацепромазин.

Ацепромазину малеат — нейролептик групи фенотіазинів, препаратів седативної дії, які знижують чутливість до зовнішніх факторів шляхом блокування дофамінових рецепторів різного рівня у центральній нервовій системі.

Розчин для ін'єкцій 1% знижує збудження центральної нервової системи й забезпечує заспокійливу і міорелаксуючу дію. Крім того, препарат дає гіпотермічний, гіпотензивний, протигістамінний, адренолітичний, спазмолітичний, протиблювотний ефект, пришвидшує і посилює вплив снодійних та місцево анестезуючих засобів. При внутрішньовенному введенні препарат діє через 5-8 хвилин, при внутрішньом'язовому — через 15-25 хвилин. Заспокійливий ефект триває до години. При парентеральному введенні швидко проникає в усі тканини. Максимальна концентрація у крові досягається через 30-60 хвилин.

Ацепромазину малеат належить до ліпофільних сполук, має великий обсяг розподілу і високий ступінь зв'язування з плазмовими білками крові (до 90%), особливо з альбумінами. При потраплянні в організм добре розподіляється в усіх органах і тканинах. Метаболізується у печінці, виводиться з сечею, в основному як метаболіт глюкуронової кислоти. Період напіввиведення з плазми у коня займає близько 3 години.

За ступенем впливу на організм належить до помірно небезпечних речовин.

**Застосування**

Препарат застосовують тваринам для премедикації за 15-20 хвилин до хірургічного втручання (перед базовим анестетиком), для послаблення болю, як заспокійливий засіб для агресивних тварин перед оглядом і транспортуванням, як спазмолітик для коней (при спастичних коліках).

**Дозування**

Препарат вводять одноразово, повільно, внутрішньовенно або глибоко внутрішньом'язово. Дози для різних видів тварин вказані у таблиці.

Таблиця 1

| Вид тварин | Спосіб застосування                                   | Дозування                       |                                           |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                                                       | мл препарату на 10 кг маси тіла | мг ацепромазину малеату на 1 кг маси тіла |
| коні       | внутрішньовенно повільно<br>внутрішньом'язово глибоко | 0,05-0,06                       | 0,05-0,06                                 |
|            |                                                       | 0,05-0,1                        | 0,05-0,1                                  |
| собаки     | внутрішньовенно повільно<br>внутрішньом'язово глибоко | 0,05-0,1                        | 0,05-0,1                                  |
|            |                                                       | 0,2-0,3                         | 0,2-0,3                                   |
| коти       | внутрішньом'язово глибоко                             | 0,2-0,3                         | 0,2-0,3                                   |

КОНТРОЛЬОВАНИЙ  
ПРИМІРНИК № 1

06.02.2023

### **Протипоказання**

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до діючої речовини препарату, порушеннями функцій печінки, серця, легенів, цукровим діабетом, а також вагітним самкам.

Не використовувати за гіпотермії, гіпотензії, кровотечах зі значною втратою крові та при інтоксикації стрихніном.

Не застосовувати разом з органофосфатами (інсектицидами), місцевими анестетиками.

### **Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)**

Передозування викликає симптоми гіпотензії. Це потребує симптоматичної терапії. Як антидоти застосовувати  $\alpha$ -адреноміметики та дихальні analeптики.

### **Застереження**

#### *Побічна дія*

Можливі явища брадикардії, звуження дихальних шляхів, незначне зниження температури тіла.

При швидкому внутрішньовенному введенні може виникнути серцева аритмія.

Пріапізм та пролапс пеніса у жеребців (іноді настає повний параліч).

#### *Особливі застереження при використанні*

Внутрішньовенно вводити повільно!

При швидкому внутрішньовенному введенні може виникнути серцева аритмія.

Жеребцям-плідникам препарат застосовувати лише внутрішньом'язово та дотримуватися мінімальної дози, аби уникнути пролапсу пеніса, який зазвичай триває до 2 годин та не потребує спеціального лікування. При пролапсі пеніса понад 24 години тварина потребує допомоги лікаря ветеринарної медицини.

Препарат не має анальгетичного ефекту, тому для знеболювання слід застосовувати анальгетик.

Підвищену чутливість до препарату мають собаки крупних порід, а також грейхаунди, боксери та інші представники брахіцефальних порід.

Підвищення дози не призводить до пролонгації дії препарату.

#### *Використання під час вагітності, лактації*

Не застосовувати вагітним самкам!

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати препарат разом з органофосфатами (інсектицидами)!

Не застосовувати препарат разом з місцевими анестетиками!

#### *Період виведення*

Не застосовувати продуктивним тваринам!

### **Форма випуску**

Флакони з темного скла або поліпропілену з гумовими корками під алюмінієвою обкаткою по 10 і 50 мл.

### **Зберігання**

Суше темне, недоступне для дітей місце за температури від +4 до +25 °С.

Після відкриття флакона препарат зберігати в холодильнику та використати протягом 30 діб.

Термін придатності — 2 роки.

### **Для застосування у ветеринарній медицині!**

### **Власник реєстраційного посвідчення**

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна

### **Виробник готового продукту**

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна