

АСК-70
(порошок для приготування перорального розчину)
листівка-вкладка

Опис

Порошок від білого до сірого кольору.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину (мг):

кислоту ацетилсаліцилову - 700,0.

Допоміжні речовини: кислота лимонна, натрію додецилсульфат (лаурілсульфат), натрію цитрат, натрію карбонат.

Фармакологічні властивості

АТС-vet класифікаційний код: QN02 - ветеринарні препарати, що впливають на нервову систему. Анальгетики. QN02BA01 - Ацетилсаліцилова кислота.

Кислота ацетилсаліцилова — нестероїдний протизапальний препарат групи саліцилатів, що має протизапальну, жарознижувальну і анальгезуючу дію, перешкоджає тромбоутворенню, сприяє швидкому одужанню молодняка і знижує втрати продуктивності.

Головним у механізмі дії кислоти ацетилсаліцилової є інактивація нею ферменту ЦОГ (циклооксигенази), внаслідок чого зменшується продукування медіаторів запалення: простагландинів, простацикліну і тромбосану. Сповільнення синтезу простагландинів призводить до зниження підвищеної температури тіла, зменшення чутливості нервових закінчень до медіаторів болю. Незворотне пригнічення синтезу тромбосану А2 у тромбоцитах ацетилсаліциловою кислотою перешкоджає спонтанній та індукованій агрегації тромбоцитів.

Після перорального прийому препарату, кислота ацетилсаліцилова швидко і повністю всмоктується з травного тракту. Вона швидко метаболізується до саліцилової кислоти, період напіввиведення становить 15-30 хвилин. Саліцилова кислота піддається метаболізму в печінці. Її метаболітами є гліцин, кон'югати глюкуронової кислоти і сліди гентизинової кислоти. Саліцилова кислота та її метаболіти виводяться з організму переважно нирками.

Застосування

Симптоматичне лікування телят (віком до 3 місяців), свиней і свійської птиці (курей-бройлерів, індиків, племінних курей, ремонтного молодняка) при патологічних станах, які супроводжуються гіпертермією, запальним і больовим синдромами слабкої та середньої інтенсивності, а саме: гарячка, захворювання респіраторні та травного каналу, синдром ММА (метрит-мастит-агалактія), ревматоїдний артрит, остеоартрит, м'язові і післяопераційні болі, тепловий стрес.

Дозування

Препарат застосовують перорально з питною водою або рідким кормом у дозах:

телята - 1,0 г препарату на 7 кг маси тіла (що еквівалентно 100 мг кислоти ацетилсаліцилової на 1 кг маси тіла);

свині - 1,5 кг препарату на 1000 л води питної (що еквівалентно 100 мг кислоти ацетилсаліцилової на 1 кг маси тіла);

свійська птиця (кури-бройлери, індички, племінні кури, ремонтний молодняк) - 300-600 г препарату на 1000 л води питної (що еквівалентно 210-420 мг кислоти ацетилсаліцилової на 1 л питної води, або 50 мг-100 мг ацетилсаліцилової кислоти на 1 кг маси тіла).

Застосовують препарат один раз на добу впродовж 3-5 діб.

Потрібну кількість препарату попередньо розчиняють у воді питній (температура води 35 °C) у співвідношенні 1:10 (1 частина препарату на 10 частин води), енергійно перемішують протягом 20-25 хвилин, при цьому розчин утворює багато піни. Через 20-25 хвилин отриманий розчин препарату додають до добової кількості питної води або рідкого корму.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам із підвищеною чутливістю до саліцилатів або інших нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ).

Не застосовувати тваринам зі хронічними захворюваннями травного каналу та нирок, порушеннями процесу згортання крові.

Не застосовувати одночасно із антикоагулянтами та за два тижні до планової операції.

Не застосовувати курям-несучкам, яйця яких призначені для споживання людьми.

Не застосовувати поросятam віком до 1 місяця.

Не застосовувати новонародженим телятам та телятам віком до 2 тижнів.

Не застосовувати вагітним та лактуючим свиноматкам.

Не застосовувати разом з іншими НПЗЗ, глюкокортикостероїдами та аміноглікозидами.

Застереження

Побічна дія

Можливе виникнення свербіжy, подразнення шлунку та кішечника, виразки, розлади травного каналу, тремору м'язів, що передбачає припинення застосування препарату.

Особливі застереження при використанні

Не застосовувати за два тижні до планової операції.

Лікування препаратом АСК-70 проводять у комплексі з етіотропною терапією.

Використання під час вагітності, лактації, несучості

Не застосовувати вагітним та лактуючим свиноматкам.

Не застосовувати курям-несучкам, яйця яких призначені для споживання людьми.

При застосуванні препарату необхідно провести оцінку співвідношення користь/ризик для кожного випадку, коли виникають сумніви.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати одночасно із антикоагулянтами та за два тижні до планової операції.

Не застосовувати разом з іншими нестероїдними протизапальними засобами, глюкокортикостероїдами та аміноглікозидами.

Не рекомендовано застосовувати разом з діуретичними засобами, тому що знижується ступінь клубочкової фільтрації завдяки зниженню синтезу простагландинів у нирках.

Період виведення

М'ясо цільових видів тварин - 0 діб.

Форма випуску

Порошок у полімерних пакетах, полімерних контейнерах або банках, об'ємом 1, 2, 5, 10, 50, 100 і 500 г, 1, 10, 15, 20 і 25 кг.

Зберігання

Сухе, захищене від світла місце за температури від 5 до 30 °С.

Термін придатності препарату — 24 місяці від дати виготовлення.

Термін придатності із початого контейнера при дотриманні умов зберігання та забезпечення герметичного закриття пакування з препаратом — 28 діб.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна

Виробник готового продукту

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

61002, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна