

12.07.2021

ЦИПРОФЛОКВЕТ® 10%
(розчин для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Масляниста рідина, від безбарвного до світло-жовтого кольору.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

ципрофлоксацин – 100 мг.

Допоміжні речовини: 1,2 – пропіленгліколь, кислота молочна, кислота оцтова, трилон Б, вода очищена.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01MA02 – Ципрофлоксацин.

Ципрофлоксацин – антибіотик групи фторхінолонів.

Ципрофлоксацин активний проти грамнегативних мікроорганізмів, а саме *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Serratia spp.*, *Camphylobacter spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Yersinia spp.*, *Vibrio spp.*, *Aeromonas spp.*, *Haemophilus spp.*, *Brucella spp.*, та грампозитивних мікроорганізмів, а саме *Staphylococcus spp.* (включаючи пеніциліназо-продукуючі та метицилін-стійкі штами) *Streptococcus spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Corynebacterium spp.* та інші), а також *Mycoplasma spp.*, *Mycobacterium spp.* *Chlamydia trachomatis*.

Механізм дії препарату полягає в інгібуванні бактеріальної ДНК-гірази (топоізомерази II), таким чином, зупиняє процес спіралізації та синтезу ДНК.

Біодоступність ципрофлоксацину при пероральному застосуванні становить більше 70 %. Максимальна концентрація ципрофлоксацину при цьому досягається через 1,5 - 2 години та зберігається в терапевтичній концентрації протягом 24 годин. Пікові концентрації ципрофлоксацину у собак складають 1,9 µg/mL. Він проникає практично в усі органи та тканини, але максимальний рівень спостерігають у легенях, печінці, жовчі, репродуктивних органах та нирках. Період напіввиведення препарату у собак складає 4,35 години. У низьких концентраціях ципрофлоксацин виявляється у цереброспінальній рідині, досягаючи тільки 6-10 % від його концентрації у сироватці крові. Виводиться з організму, в основному, у незміненому вигляді та у вигляді метаболітів, маючих меншу активність, чим сам ципрофлоксацин, шляхом канальцевої секреції та клубочкової фільтрації, а також через печінку.

Застосування

Лікування собак та котів, хворих на мастит, дерматит, артрит, перитоніт, а також при захворюваннях органів дихання (тонзиліт, пневмонії, бронхіт, риніт, синусит), травного каналу (гастрит, ентерит), сечостатевої системи (пієлонефрит, уретрит, метрит, цистит), що спричинені мікроорганізмами, чутливими до ципрофлоксацину.

Дозування

Перорально з питною водою або кормом у дозах:

коти - 0,25 мл препарату на 10 кг маси тіла тварини (2,5 мг ципрофлоксацину на 1 кг маси тіла тварини). Застосовують препарат з інтервалом 24 години, курс лікування – 3-5 діб.

собаки - 0,25 мл препарату на 10 кг маси тіла тварини (2,5 мг ципрофлоксацину на 1 кг маси тіла тварини). Застосовують препарат з інтервалом 24 години, курс лікування – 3-5 діб.

Слід уникати пропуску чергової дози препарату, оскільки це може привести до зниження ефективності лікування.

Протипоказання

Підвищена чутливість до ципрофлоксацину.

12.07.2021

Не застосовувати тваринам з порушенням функції нирок та печінки.

Не застосовувати одночасно з тетрациклінами, лінкозамідами, макролідами, циклоспоринами, хлорамфеніколом, а також з нестероїдними протизапальними засобами.

Не застосовувати собакам дрібних порід до 8-місячного віку, собакам великих порід - до 18-місячного віку, котам - до 8-місячного віку, оскільки ципрофлоксацин негативно діє на формування хрящової та кісткової тканин.

Не застосовувати при наявності резистентних штамів збудника.

Застереження

Побічна дія

У рекомендованих дозах побічних явищ, як правило не спостерігається. При виникненні побічних явищ (свербіж, нудота, блювота, тремор м'язів) припиняють застосування препарату, застосовують десенсибілізуючу терапію.

Особливі застереження при використанні

Можливі алергічні реакції (свербіж, набряк), при виникненні даних симптомів застосовують десенсибілізуючу терапію. Застосування препарату допускається тільки у тому випадку, коли ефект від застосування переважає можливі негативні наслідки.

Перед застосуванням рекомендують визначити чутливість мікроорганізмів до ципрофлоксацину.

Застосування під час вагітності, лактації, несучості

Вагітним тваринам препарат не рекомендують застосовувати, оскільки можлива нейротоксична дія. Застосування препарату допускається тільки у тому випадку, коли очевидно, що ефект від застосування переважає можливі негативні наслідки.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не застосовувати одночасно з тетрациклінами, макролідами, лінкозамідами, циклоспоринами, хлорамфеніколом.

Не застосовувати одночасно з нестероїдними протизапальними засобами.

При застосуванні одночасно з препаратами, що містять у своєму складі катіони Mg^{2+} , Al^{3+} , Ca^{2+} , останні зв'язуються з ципрофлоксацином та перешкоджають його абсорбції.

При застосуванні одночасно з теофіліном (еуфіліном), ципрофлоксацин може підвищити рівень теофіліну в крові.

При одночасному призначенні препарату із аміноглікозидами, цефалоспоринами третього покоління та пеніцилінами широкого спектру дії може виникнути синергізм по відношенню до деяких бактерій (особливо, *Pseudomonas aeruginosa* та інших бактерій родини *Enterobacteriaceae*).

Препарат не рекомендують змішувати з іншими лікарськими засобами.

Форма випуску

Ампули з нейтрального скла марки НС-1, НС-2, УСП-1 по 0,5 та 1 мл.

Флакони з нейтрального скла марки НС-1, НС-2, УСП-1 по 50 та 100 мл. Вторинна упаковка – картонна коробка.

Полімерні флакони по 240 мл.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.

Термін придатності - 2 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна

Виробник готового продукту:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна