

POLIMUN REO 1133 інас, ПОЛІМУН РЕО 1133 інас

Вакцина проти Інфекційного артрит (теносиновіту) птиці, інактивована.

Склад	Ревірус штам "S-1133" $\geq 10^{7,0}$ ТЦД ₅₀ в дозі до інактивації.
Фармацевтична форма	Емульсія.
Імунобіологічні властивості	Препарат стимулює за 14-21 добу формування специфічного імунітету у домашньої птиці проти захворювання на вірусний артрит (теносиновіт).
Вид тварин	Кури.
Показання до застосування	Для профілактики вірусного артрит (теносиновіту).
Протипоказання	Не дозволяється вакцинувати ослаблену та хвору птицю.
Застереження при застосуванні	Не використовувати вакцину у флаконах з тріщинами, без етикеток, порушенням укупорювання, з розшаруванням емульсії в нижній частині флакону і вакцину не використати впродовж шести годин з моменту відкриття та з закінченням терміном дії. Допускається застосування вакцини при наявності розшарування емульсії у верхній частині флакону, що зникає після збовтування.
Взаємодія з іншими засобами	Не змішувати з іншими лікарськими та профілактичними препаратами.
Особливі вказівки при несучості	Застосування вакцини не впливає негативно на несучість.
Спосіб застосування та дози	Перед використанням флакони ретельно струшують, вакцину підігрівають до кімнатної температури (20-25°C) і вводять в дозі по 0,5 мл підшкірно в верхню третину шиї або внутрішньом'язово в грудний м'яз не пізніше ніж за 4 тижні до початку несучості. Під час проведення щеплення флакони з вакциною необхідно струшувати.

Побічні ефекти	Не виявлені.
Передозування (симптоми, невідкладні заходи)	Застосування двох доз, не має негативного впливу на птицю.
Період виведення (каренції)	Нуль діб.
Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП	Необхідно дотримуватись правил асептики, особистої гігієни та техніки безпеки при роботі з птицею. У разі випадкової самоін'єкції необхідно негайно звернутися за медичною допомогою, маючи при собі листівку-вкладку на даний препарат.
Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, спосіб його знешкодження і утилізації	Не використану вакцину, з закінченим терміном дії, шприці та голки знезаражують кип'ятінням впродовж 30 хвилин.
Термін придатності	24 місяці.
Умови зберігання і транспортування	В сухому, не доступному для дітей місці при температурі від 2°C до 8°C.
Упаковка та фасування	Скляні або пластикові флакони по 250 мл (500 доз) та 500 мл (1000 доз), укрупнені гумовими пробками та завальцьовані алюмінієвими ковпачками.
Власник реєстраційного посвідчення	ТОВ "БІОТЕСТЛАБ" вул. Володимирська, буд. 57-А, м. Васильків, Київська обл., 08600, Україна
Виробники готового продукту	ТОВ "БІОТЕСТЛАБ" вул. Володимирська, буд. 57-А, м. Васильків, Київська обл., 08600, Україна
Правила відпуску	Без рецепта.