



РЕЕСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України “Про ветеринарну медицину”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1349 “Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів” та на підставі експертного висновку від 15.12.2022 р. № 100 рекомендацій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, наказу Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів від 21.12.2022 р. №591 зареєстровано:

препарат **Ентеропорк COLI AC, Enteroporc COLI AC –
вакцина проти неонатальної діареї свиней,
спричиненої токсином Clostridium Perfringens
тип A, C і ентероадгезивними Escherichia Coli**

у формі **ліофілізату і суспензії**

Власник реєстраційного посвідчення:

Сева Санте Анімаль,

10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн, Франція

зареєстровано в Україні за №

ВА-01016-02-22

від

21.12.2022

Виробник:

ІДТ Біологіка ГмбХ (IDT Biologika GmbH),

Ам Фармапарк, 06861 Дессау-Росслау, Німеччина

Фалорні С.р.л., Віа дей Фрілі,

25, 50019 Сесто-Фьорентіно, Італія

Сева Санте Анімаль,

10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн, Франція

Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд,

1107 Будапешт, Сзаллас 5, Угорщина

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2);
- етикетка (додаток 3);

Реєстраційне посвідчення дійсне до

20.12.2027

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного препарату.

Головний державний ветеринарний інспектор України
Chief State Veterinary Inspector of Ukraine



Ольга ШЕВЧЕНКО

Коротка характеристика препарату

1. Назва ветеринарного препарату

Ентеропорк COLI AC, Enteroporc COLI AC – вакцина проти неонатальної діареї свиней, спричиненої токсином *Clostridium Perfringens* тип А, С і ентероадгезивними *Escherichia Coli*.

2. Якісний і кількісний склад

Одна доза (2 мл) вакцини містить:

Ліофілізат

Анатоксини *Clostridium perfringens*, тип А, С:

Альфа анатоксин	≥ 125 rU/мл*
Бета 1 анатоксин	≥ 3354 rU/мл*
Бета 2 анатоксин	≥ 794 rU/мл*

Суспензія

Інактивовані фімбріальні адгезини <i>Escherichia coli</i> F4ab	≥ 23 rU/мл *
Інактивовані фімбріальні адгезини <i>Escherichia coli</i> F4ac	≥ 19 rU/мл *
Інактивовані фімбріальні адгезини <i>Escherichia coli</i> F5	≥ 13 rU/мл *
Інактивовані фімбріальні адгезини <i>Escherichia coli</i> F6	≥ 37 rU/мл *

Ад'ювант

Алюміній (у вигляді гідроксиду) 2,0 мг/мл

* вміст анатоксинів та фімбріальних адгезинів вимірюється у відносних одиницях на мл, визначених методом ІФА щодо внутрішнього стандарту

3. Фармацевтична форма

Ліофілізат та суспензія для приготування суспензії для ін'єкцій.

4. Імунобіологічні властивості

Код ATCvet: QI09AB08

Вакцина застосовується для активної імунізації супоросних свиноматок і ремонтних свинок та індукуює утворення антитіл проти альфа, бета 1 і бета 2 токсинів *Clostridium perfringens* типів А і С та проти фімбріальних адгезинів *Escherichia coli* F4ab, F4ac, F5 і F6. Поросята від вакцинованих свиноматок отримують пасивну імунізацію шляхом поглинання молозива, яке містить специфічні антитіла.

Вакцинація спричинює формування пасивної імунної відповіді (після споживання молозива):

- *E. coli* F4ab, F4ac, F5, F6: впродовж 12 годин після народження;
- *C. perfringens* типу А, С: впродовж першого дня життя;

У поросят отриманих від вакцинованих свиноматок (після споживання молозива), захисні рівні антитіл тримаються впродовж:

- *E. coli* F4ab, F4ac, F5, F6: перших днів життя;
- *C. perfringens* типу А: 14 днів життя;
- *C. perfringens* типів С: 21 дня життя.

5. Клінічні особливості

5.1. Вид тварин

Свині.

5.2. Показання до застосування

Вакцина призначена для пасивної імунізації поросят шляхом активної імунізації свиноматок або ремонтних свинок проти неонатального ентеротоксикозу:

- Для зменшення клінічних ознак (діареї) і смертності, викликаних штамами *Escherichia coli*, що експресують фімбріальні адгезини F4ab, F4ac, F5 і F6;
- Для зменшення клінічних ознак (діареї) впродовж перших днів життя, викликаних *Clostridium perfringens* типу А, що експресує альфа та бета 2 анатоксини;

- Для зменшення клінічних ознак та смертності, викликаних геморагічним та некротизуючим ентеритом, спричиненим *Clostridium perfringens* типу C, що експресує бета1 анатоксин.

5.3. Протипоказання

Відсутні.

5.4. Побічна дія

У вакцинованих ремонтних свинок і свиноматок у день вакцинації може спостерігатись короткочасне підвищення температури тіла (у середньому на 0,5 °C, у окремих свиней до 2 °C), що повертається до норми впродовж 24 годин, а також тимчасовий набряк і почервоніння в місці ін'єкції (у середньому 2,8 см, у окремих свиней до 8 см), що зникають без лікування впродовж 7 днів. У день вакцинації зазвичай спостерігається злегка пригнічена поведінка.

5.5. Особливості застереження при використанні

Вакцинувати слід клінічно здорових тварин.

5.6. Застосування під час вагітності, лактації

Вакцина застосовується супоросним та лактуючим свиноматкам.

5.7. Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Інформація щодо нешкідливості та ефективності цієї вакцини при застосуванні з будь-яким іншим ветеринарним лікарським засобом відсутня, тому рішення про використання цієї вакцини до або після будь-якого іншого ветеринарного лікарського засобу повинно прийматися відповідальним ветеринарним лікарем у кожному конкретному випадку.

5.8. Дози і способи введення тваринам різного віку

Вакцину застосовують внутрішньом'язово, в ділянці шиї за вухом, у дозі 2 мл

Первинна вакцинація

- Перше введення вакцини: 2 мл за 5 тижнів до очікуваної дати опоросу;
- Друге введення вакцини: 2 мл за 2 тижні до очікуваної дати опоросу.

Ревакцинація

Ревакцинацію проводять перед кожним наступним опоросом: одна доза за 2 тижні до очікуваної дати опоросу.

Рекомендації щодо приготування вакцинної суспензії:

1. Щоб розчинити вакцину, необхідно набрати приблизно 5 мл суспензії за допомогою стерильного шприца відповідного розміру та перенести її у флакон із ліофілізатором.
2. Флакон з ліофілізатором слід обережно струсити, поки ліофілізат повністю не розчиниться в суспензії.
3. Після чого необхідно набрати весь вміст флакона з ліофілізатором у той же шприц та перенести його назад у флакон із суспензією.
4. Флакон з суспензією необхідно добре струсити до повного перемішування.
5. Після чого необхідно набрати приблизно 5 мл відновленої суспензії вакцини, перенести її у флакон з ліофілізатором, добре струсити та набрати весь вміст та перемістити його назад у флакон із вакцинною суспензією. Вакцина готова до використання.

5.9. Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Не встановлено.

5.10. Спеціальні застереження

Вакцинувати слід клінічно здорових тварин.

5.11. Період виведення (каренції)

Нуль діб.

5.12. Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі вводять засоби захисту тваринам

У разі випадкового самовведення або прийому всередину слід негайно звернутися до лікаря та показати йому інструкцію з експлуатації або етикетку на вакцину. При роботі з ветеринарним лікарським засобом слід обов'язково користуватися засобами індивідуального захисту.

Персонал, який бере участь у відвідуванні вакцинованих свиней, повинен дотримуватися загальних гігієнічних принципів (носити захисний одяг, взуття, засоби індивідуального захисту).

6. Фармацевтичні особливості

6.1. Основні форми несумісності

Не змішувати з іншими ветеринарними та імунобіологічними препаратами.

6.2. Термін придатності

21 місяць.

Після розчинення вакцину слід використати впродовж 8 годин за умови зберігання за температури від 2 до 8°C. Після того, як розчинену вакцину вийняли із місця зберігання 2-8 °C, її слід негайно використати.

6.3. Особливі застереження щодо зберігання

Суше, темне, недоступне для дітей місце, за температури від 2 до 8°C. Не заморожувати.

6.4. Природа і склад контейнера первинного упакування

Вакцину фасують у формі комплекту, що складається з ліофілізату та суспензії в картонній коробці:

- 10 доз: коробка, що містить 1 флакон з ліофілізатом та 1 флакон (20 мл) з суспензією;
- 25 доз: коробка, що містить 1 флакон з ліофілізатом та 1 флакон (50 мл) з суспензією.

6.5. Назва та місцезнаходження власника реєстраційного посвідчення

Сева Санте Анімаль, 10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн, Франція.

6.6. Назва та місцезнаходження виробника

Виробництво та контроль:

ІДТ Біологіка ГмбХ (IDT Biologika GmbH), Ам Фармапарк, 06861 Дессау-Росслау, Німеччина.

Вторинне пакування:

Фалорні С.р.л., Віа дей Фріллі, 25, 50019 Сесто-Фьорентіно, Італія

Сева Санте Анімаль, 10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн, Франція

ІДТ Біологіка ГмбХ (IDT Biologika GmbH), Ам Фармапарк, 06861 Дессау-Росслау, Німеччина.

Випуск серії:

Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд, 1107 Будапешт, Сзаллас 5, Угорщина.

ІДТ Біологіка ГмбХ (IDT Biologika GmbH), Ам Фармапарк, 06861 Дессау-Росслау, Німеччина.

6.7. Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним засобом

Утилізацію усіх відкритих під час проведення процедури вакцинації ампул з вакциною слід здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства України.

7. Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “ Вказівки про порядок пред’явлення реклаमाцій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині ” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.

Листівка-вкладка

Назва ветеринарного препарату

Ентеропорк COLI AC, Enteroporc COLI AC – вакцина проти неонатальної діареї свиней, спричиненої токсином *Clostridium Perfringens* тип А, С і ентероадгезивними *Escherichia Coli*.

Склад

Одна доза (2 мл) вакцини містить:

Ліофілізат

Анатоксини *Clostridium perfringens*, тип А, С:

Альфа анатоксин	≥ 125 rU/мл*
Бета 1 анатоксин	≥ 3354 rU/мл*
Бета 2 анатоксин	≥ 794 rU/мл*

Суспензія

Інактивовані фімбріальні адгезини <i>Escherichia coli</i> F4ab	≥ 23 rU/мл *
Інактивовані фімбріальні адгезини <i>Escherichia coli</i> F4ac	≥ 19 rU/мл *
Інактивовані фімбріальні адгезини <i>Escherichia coli</i> F5	≥ 13 rU/мл *
Інактивовані фімбріальні адгезини <i>Escherichia coli</i> F6	≥ 37 rU/мл *

Ад'ювант

Алюміній (у вигляді гідроксиду) 2,0 мг/мл

* вміст анатоксинів та фімбріальних адгезинів вимірюється у відносних одиницях на мл, визначених методом ІФА щодо внутрішнього стандарту

Фармацевтична форма

Ліофілізат та суспензія для приготування суспензії для ін'єкцій.

Імунобіологічні властивості

Код ATCvet: QI09AB08

Вакцина застосовується для активної імунізації супоросних свиноматок і ремонтних свинок та індукує утворення антитіл проти альфа, бета 1 і бета 2 токсинів *Clostridium perfringens* типів А і С та проти фімбріальних адгезинів *Escherichia coli* F4ab, F4ac, F5 і F6. Поросята від вакцинованих свиноматок отримують пасивну імунізацію шляхом поглинання молозива, яке містить специфічні антитіла.

Вакцинація спричинює формування пасивної імунної відповіді (після споживання молозива):

- *E. coli* F4ab, F4ac, F5, F6: впродовж 12 годин після народження;
- *C. perfringens* типу А, С: впродовж першого дня життя;

У поросят отриманих від вакцинованих свиноматок (після споживання молозива), захисні рівні антитіл тримаються впродовж:

- *E. coli* F4ab, F4ac, F5, F6: перших днів життя;
- *C. perfringens* типу А: 14 днів життя;
- *C. perfringens* типів С: 21 дня життя.

Вид тварин

Свині.

Показання до застосування

Вакцина призначена для пасивної імунізації поросят шляхом активної імунізації свиноматок або ремонтних свинок проти неонатального ентеротоксикозу:

- Для зменшення клінічних ознак (діареї) і смертності, викликаних штамами *Escherichia coli*, що експресують фімбріальні адгезини F4ab, F4ac, F5 і F6;
- Для зменшення клінічних ознак (діареї) впродовж перших днів життя, викликаних *Clostridium perfringens* типу А, що експресує альфа та бета 2 анатоксини;
- Для зменшення клінічних ознак та смертність, викликаних геморагічним та некротизуючим ентеритом, спричиненим *Clostridium perfringens* типу С, що експресує бета1 анатоксин.

Протипоказання

Відсутні.

Застереження при застосуванні

Вакцинувати слід клінічно здорових тварин.

Взаємодія з іншими засобами

Інформація щодо нешкідливості та ефективності цієї вакцини при застосуванні з будь-яким іншим ветеринарним лікарським засобом відсутня, тому рішення про використання цієї вакцини до або після будь-якого іншого ветеринарного лікарського засобу повинно прийматися відповідальним ветеринарним лікарем у кожному конкретному випадку.

Особливі вказівки при вагітності, лактації

Вакцина застосовується супоросним та лактуючим свиноматкам.

Спосіб застосування та дози

Вакцину застосовують внутрішньом'язово, в ділянці шиї за вухом, у дозі 2 мл

Первинна вакцинація

- Перше введення вакцини: 2 мл за 5 тижнів до очікуваної дати опоросу;
- Друге введення вакцини: 2 мл за 2 тижні до очікуваної дати опоросу.

Ревакцинація

Ревакцинацію проводять перед кожним наступним опоросом: одна доза за 2 тижні до очікуваної дати опоросу.

Рекомендації щодо приготування вакцинної суспензії:

1. Щоб розчинити вакцину, необхідно набрати приблизно 5 мл суспензії за допомогою стерильного шприца відповідного розміру та перенести її у флакон із ліофілізатором.
2. Флакон з ліофілізатором слід обережно струсити, поки ліофілізат повністю не розчиниться в суспензії.
3. Після чого необхідно набрати весь вміст флакона з ліофілізатором у той же шприц та перенести його назад у флакон із суспензією.
4. Флакон з суспензією необхідно добре струсити до повного перемішування.
5. Після чого необхідно набрати приблизно 5 мл відновленої суспензії вакцини, перенести її у флакон з ліофілізатором, добре струсити та набрати весь вміст та перемістити його назад у флакон із вакцинною суспензією. Вакцина готова до використання.

Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Не встановлено.

Побічні ефекти

У вакцинованих ремонтних свинок і свиноматок у день вакцинації може спостерігатись короткочасне підвищення температури тіла (у середньому на 0,5 °С, у окремих свиней до 2 °С), що повертається до норми впродовж 24 годин, а також тимчасовий набряк і почервоніння в місці ін'єкції (у середньому 2,8 см, у окремих свиней до 8 см), що зникають без лікування впродовж 7 днів. У день вакцинації зазвичай спостерігається злегка пригнічена поведінка.

Період виведення (каренції)

Нуль діб.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, котрі застосовують ВП

У разі випадкового самовведення або прийому всередину слід негайно звернутися до лікаря та показати йому інструкцію з експлуатації або етикетку на вакцину. При роботі з ветеринарним лікарським засобом слід обов'язково користуватися засобами індивідуального захисту.

Персонал, який бере участь у відвідуванні вакцинованих свиней, повинен дотримуватися загальних гігієнічних принципів (носити захисний одяг, взуття, засоби індивідуального захисту).

Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВПІ, способи його знешкодження і утилізації

Утилізацію всіх відкритих флаконів з вакциною слід здійснювати у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Термін придатності

21 місяць.

Після розчинення вакцину слід використати впродовж 8 годин за умови зберігання за температури від 2 до 8 °С. Після того, як розчинену вакцину вийняли із місця зберігання 2-8 °С, її слід негайно використати.

Умови зберігання і транспортування

Сухе, темне, недоступне для дітей місце, за температури від 2 до 8 °С. Не заморожувати.

Упаковка

Пластикові флакони по 50, 100, 250 та 500 мл, закорковані гумовими пробками і завальцьовані алюмінієвими ковпачками.

Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності власника реєстраційного посвідчення

Сева Санте Анімаль, 10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн, Франція.

Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності виробника

Виробництво та контроль:

ІДТ Біологіка ГмбХ (IDT Biologika GmbH), Ам Фармапарк, 06861 Дессау-Росслау, Німеччина.

Вторинне пакування:

Фалорні С.р.л., Віа дей Фріллі, 25, 50019 Сесто-Фьорентіно, Італія

Сева Санте Анімаль, 10 авеню де ла балластієре, 33500 Лібурн, Франція

ІДТ Біологіка ГмбХ (IDT Biologika GmbH), Ам Фармапарк, 06861 Дессау-Росслау, Німеччина.

Випуск серії:

Сева-Філаксія Ветеринарі Байолоджикалс Ко Лтд, 1107 Будапешт, Сзаллас 5, Угорщина.

ІДТ Біологіка ГмбХ (IDT Biologika GmbH), Ам Фармапарк, 06861 Дессау-Росслау, Німеччина.

Додаткова інформація

Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.

00000
57x31x72
Black/P137

вакцина проти неонатальної діареї свиней,
спричиненої токсинами *Clostridium Perfringens* тип A, C
і ентеротоксинами *Escherichia Coli*
Enteroporc COLI AC

СКЛАД
Одна доза (2 мл (ml)) вакцини містить:
Анатоксини
Анатоксини *Clostridium perfringens* тип A, C:
Альфа анатоксин ≥ 125 rU/ml (ml)*
Бета 1 анатоксин ≥ 3354 rU/ml (ml)*
Бета 2 анатоксин ≥ 794 rU/ml (ml)*
Суспиції
Інактивовані фімбріальні адгезини *Escherichia coli* F4ab ≥ 25 rU/ml (ml)*
Інактивовані фімбріальні адгезини *Escherichia coli* F4ac ≥ 15 rU/ml (ml)*
Інактивовані фімбріальні адгезини *Escherichia coli* F5 ≥ 15 rU/ml (ml)*
Інактивовані фімбріальні адгезини *Escherichia coli* F6 ≥ 37 rU/ml (ml)*
* пайт потужний та фімбріальних адгезинів вимірюється у відношенні одиначек на мл визначено методом ІФА щодо внутрішнього стандарту

ЗАСТОСУВАННЯ
Вакцинація після народження новонароджених поросят шляхом активної інфузії свиноматок або ремонтних свинок проти неонатального ентеротоксикозу.

- Для зменшення клінічних ознак (діареї) і смертності, викликаних штаммами *Escherichia coli*, що експресують фімбріальні адгезини F4ab, F4ac, F5 і F6;

- Для зменшення клінічних ознак (діареї) і смертності, викликаних першою доїмчиття викликаних *Clostridium perfringens* типу A, що експресує альфа 1, 6a та 2 анатоксини;

- Для зменшення клінічних ознак та смертності, викликаних "темораїччям" та неконтрольованим ентеритом, спричиненим *Clostridium perfringens* типу C, що експресує бета 1 анатоксин.

Перед застосуванням уважно прочитайте листівку-вкладку!

ЗБЕРЕГАННЯ
Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури

Enteroporc COLI AC
вакцина проти неонатальної діареї свиней,
спричиненої токсинами *Clostridium Perfringens* тип A, C
і ентеротоксинами *Escherichia Coli*

Ліофілізат та суспензія для приготування суспензії для ін'єкції
Внутрішньом'язово
Стерильно

10 доз

Дана інструкція:
Серія №:
Продукційна дата:

+2 до +8°C. Не заморозувати. Після розчинення вакцину слід використати протягом 8 годин за умови зберігання за температури від +2 до +8°C.

ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНИЙ МЕДИЦИНИ!

ВИРОБНИК
ІДТ Біологіка ГмбХ (ІДТ Біологіка GmbH), Ам Фармапарк 16861 Дуксгау-Рослау, Німеччина.


Імпортёр в Україні: ТОВ «СЕВА САЙТЛ АЗІА ПЛАЗМА УНІВЕРСАЛ»
04280, м. Київ, вул. ВХерсон 18/14, корпус 1 офіс 301-303.
тел: +38 044 492 25 12.

РПН:

БТЕ ENTEROPORC COLI AC 10D UA
57x31x72
CODE ARTICLE : 00000
Black
P137

ENTEROPORC COLI AC 10D UA
ID : 75953
CORPS : 7 pts

VALERIE 24/05/22



ETQ Susp. ENTEROPORC COLI AC 10D UA	ENTEROPORC COLI AC 10D UA
35x80/3 pages	
CODE ARTICLE : 00000	ID : 75953
Black	
P137	CORPS : 7 pts

VALERIE 24/05/22

Page 1 - Recto

Ентеропорк COLI AC, Enteroporc COLI AC вакцина проти неонатальної діареї свиней, спричиненої токсичним <i>Clostridium Perfringens</i> тип А, С і ентеротоксичним <i>Escherichia Coli</i>		Дата використання: Серія №: Продатний дос:
Суспензія		00000
10 доз		

Page 2 - Verso

СКЛАД Одна доза (2 мл (ml)) вакцини містить: інактивовані фімбріальні адгезини <i>Escherichia coli</i> F4ab ≥ 23 rU/мл (ml); інактивовані фімбріальні адгезини <i>Escherichia coli</i> F4ac ≥ 19 rU/мл (ml); інактивовані фімбріальні адгезини <i>Escherichia coli</i> F5 ≥ 13 rU/мл (ml); інактивовані фімбріальні адгезини <i>Escherichia coli</i> F6 ≥ 37 rU/мл (ml).
ЗАСТОСУВАННЯ Вакцина призначена для пасивної імунізації поросят шляхом активної імунізації свиноматок або ремонтних свинок проти неонатального ентеротоксикозу. Внутрішньом'язово. Перед застосуванням уважно прочитайте листівку-вкладку!

Page 3 (si tient s/ 2p : remplir page 1 puis page 3 ; si tient s/ 3p : remplir normalement)

ЗБЕРІГАННЯ Сухе, темне, недоступне для дітей місце, за температури від +2 до +8°C. Не заморожувати. Після розчинення вакцину слід використати протягом 8 годин за умови зберігання за температури від +2 до +8°C.
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ!
ВИРОБНИК: IDT Біологіка ГмбХ (IDT Biologika GmbH), Ам Фармапарк, 06861 Дессау-Росслау, Німеччина.
РПН:

Продовження додатку 3
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-01016-02-22
Від 21.12.2022

ETQ Lyo ENTEROPORC COLI AC 10D UA	ENTEROPORC COLI AC 10D UA
25x65/3 pages	ID : 75953
CODE ARTICLE : 00000	CORPS : 6 pts
Black	
P137	

VALERIE 24/05/22

Page 1 - Recto

Ентеропорк COLI AC, Enteroporc COLI AC вакцина проти без-ацетил-водня спорова, споришкового токсину Clostridium Perfringens тип А, С і е-теротоксину Escherichia Coli	Дата виконання: Серія №: Придатний до:
Профіль нат	00000
10 доз	

Page 2 - Verso

СКЛАД Одна доза (2 мл (ml)) вакцини містить анатоксини Clostridium perfringens тип А, С: альфа-анатоксин ≥ 125 IU/мл (ml), бета-1 анатоксин ≥ 3354 IU/мл (ml), бета-2 анатоксин ≥ 794 IU/мл (ml).
ЗАСТОСУВАННЯ Вакцина призначена для пасивної імунізації поросят шляхом активної імунізації свиноматок або ремонтних свинок проти неонатального е-теростоккозу. Внутрішньом'язово. Перед застосуванням уважно прочитайте листі-ку-вказку!

Page 3 (si tient s/ 2p : remplir page 1 puis page 3 ; si tient s/ 3p : remplir normalement)

ЗБЕРІГАННЯ Уже: темне, недоступу не для дітей місце, за температури від +2 до +8°C, не заморозувати. Після розчинення вакцину слід використати протягом 8 годин за умови зберігання за температури від +2 до +8°C.
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ! ВИРОБНИК: IDT Біологіка ГмбХ (IDT Biologika GmbH), Ам Сампарт, 06661 Дессау-Росслау, Німеччина. РПН:

Продовження додатку 3
до реєстраційного посвідчення
№ ВА-01016-02-22
від 21.12.2022


ETQ Lyo ENTEROPORC COLI AC 25D UA	ENTEROPORC COLI AC 25D UA
23x68/3 pages	
CODE ARTICLE : 00000	ID : 75952
Black	
P137	CORPS : 6,5 pts

VALERIE 24/05/22


Page 1 - Recto



Page 2 - Verso



Page 3 (si tient s/ 2p : remplir page 1 puis page 3 ;
si tient s/ 3p : remplir normalement)



ETQ Susp. ENTEROPORC COLI AC 25D UA	ENTEROPORC COLI AC 25D UA
40x95/3 pages	ID : 75952
CODE ARTICLE : 00000	CORPS : 8 pts
Black	
P137	

VALERIE 24/05/22

Page 1 - Recto



Page 2 - Verso

СКЛАД
Одна доза (2 мл (ml)) вакцини містить: інактивовані фimbріальні адгезини *Escherichia coli* F4ab ≥ 23 rU/мл (ml); інактивовані фimbріальні адгезини *Escherichia coli* F4ac ≥ 19 rU/мл (ml); інактивовані фimbріальні адгезини *Escherichia coli* F5 ≥ 13 rU/мл (ml); інактивовані фimbріальні адгезини *Escherichia coli* F6 ≥ 37 rU/мл (ml).

ЗАСТОСУВАННЯ
Вакцина призначена для пасивної імунізації поросят шляхом активної імунізації свиноматок або ремонтних свинок проти неонатального ентеротоксикозу.
Внутрішньом'язово.
Перед застосуванням уважно прочитайте листівку-вкладку!

Page 3 (si tient s/ 2p : remplir page 1 puis page 3 ; si tient s/ 3p : remplir normalement)

ЗБЕРІГАННЯ
Суше, темне, недоступне для дітей місце, за температури від +2 до +8°C. Не заморожувати.
Після розчинення вакцину слід використати протягом 8 годин за умови зберігання за температури від +2 до +8°C.

ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ!
ВИРОБНИК: IDT Біологіка ГмбХ (IDT Biologika GmbH), Ам Фармапарк, 06861 Дессау-Росслау, Німеччина.
РПН: