

SUIMUN ERY inac, СУИМУН ЕРІ інак



вакцина проти бешихи свиней, інактивована.

СКЛАД	До інактивації в дозі: вакцинний штам бешихи свиней WR2B $\geq 2 \times 10^{10}$ КУО. Допоміжні речовини: - ад'ювант - аеросил SiO ₂ (А-300) – 10-15 мг в дозі; - інактиватор – формальдегід $\leq 0,5$ г/л.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА	Суспензія.
ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	У щеплених тварин через 2 тижні вакцина стимулює імунну відповідь, яка зберігається впродовж 6 місяців. Лікувальними властивостями не володіє.
ВИД ТВАРИН	Свині.
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ	Профілактика бешихи свиней.
ПРОТИПОКАЗАННЯ	Не дозволяється вакцинувати слабких та хворих тварин.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ	Перед використанням вакцину підігривають до кімнатної температури (20-25 °C), флакони ретельно струшують. При довготривалому зберіганні можливе утворення незначного осаду, що легко розбивається при зтрушуванні в гомогенну суспензію.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ	Не виявлено.
ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ПРИ ВАГІТНОСТІ, ЛАКТАЦІЇ	Не рекомендується вакцинувати супоросних свиноматок за тиждень до опоросу. Лактуючих свиноматок вакцинують без обмежень.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ	Вакцину вводять внутрішньом'язово в дозі по 2,0 мл в ділянку за вухом. Свиноматок основного стада вакцинують однократно за 2 тижні до осіменіння. Свиней вакцинують з 2-х місячного віку, вагою не менше 15 кг. Ревакцинацію тварин проводять через кожні 6 місяців
ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ	В окремих випадках можливі спорадичні алергічні реакції у окремих чутливих тварин, що проходять через 2-3 доби без лікування.
ПЕРЕДОЗУВАННЯ	Застосування двох доз не впливає негативно на свиней.
ПЕРІОД ОЧІКУВАННЯ	Нуль діб.

СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ І ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ВІП	При роботі з вакциною необхідно дотримуватися загальних правил асептики, особистої гігієни і техніки безпеки передбачених при роботі з лікарськими засобами для тварин. У разі випадкової само ін'єкції необхідно негайно звернутись за медичною допомогою, маючи при собі листівку –вкладку на даний препарат.
ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З НЕВИКОРИСТАНИМ ВІП, СПОСОБИ ЙОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ І УТИЛІЗАЦІЇ	Не використану вакцину, з закінченим терміном придатності, шприці і голки необхідно знезаразити кип'ятінням впродовж 30 хвилин.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	24 місяці. Після першого відбору вакцини впродовж 3-х годин.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ	Зберігати в темному, не доступному для дітей місці, при температурі від 2 до 8°C Не заморозувати.
УПАКОВКА ТА ФАСУВАННЯ	Скляні або пластикові флакони по 25, 50 або 100 доз, закриті гумовими пробками та закатані алюмінієвими ковпачками.
НАЗВА ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВЛАСНИКА РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ І ВИРОБНИКА	ТОВ „БІОТЕСТЛАБ” 08601 Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська 57-А. Адреса виробництва: 08601 Київська обл., м. Васильків, вул. Лістрового Олександра, буд. 1/3.
ПРАВИЛА ВІДПУСКУ	Без рецепта
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до «Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині» від 03.06.98 № 2 три флакони вакцини цієї серії за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.