

АНТИСТРЕС**краплі для перорального застосування, розчин**

ОПИС	В'язка опалесцююча рідина, від світло-жовтого до жовтого кольору, з ароматом м'яса.
СКЛАД	1 мл препарату містить діючу речовину: фенібут – 100 мг. Допоміжні речовини: пропіленгліколь, метилпарабен, пропілпарабен, гідроксиметилцелюлоза, ароматизатор, сахароза, сахарин натрію, вода очищена.
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	АТС vet класифікаційний код: QN06BX Інші ветеринарні препарати, які виявляють психостимулювальну і ноотропну дію. QN06BX22 Фенібут. <i>Фенібут</i> , що входить до складу препарату, є фенільним похідним ГАМК та фенілетиламіну. Позитивно впливає на метаболічні процеси в нервових клітинах головного мозку. <i>Фенібут</i> проявляє ноотропну активність, а як похідне ГАМК має анксіолітичну (транквілізуючу) дію. Не впливає на холіно- і адренорецептори. Посилюючи гальмівні ГАМК-ергічні процеси, впливає на функціональний стан за рахунок нормалізації метаболізму та впливу на мозковий кровообіг. Має виражену стрес-коригуючу дію, забезпечує нормалізацію процесів збудження та гальмування в центральній нервовій системі. Препарат швидко всмоктується після перорального введення та добре проникає в усі тканини організму, включаючи гематоенцефалічний бар'єр. 80-95% препарату метаболізується в печінці до неактивних метаболітів. 5% виводиться з організму нирками в незміненому вигляді.
ЗАСТОСУВАННЯ	Препарат АНТИСТРЕС застосовують для зниження збудження та корекції психогенних порушень поведінки у котів і собак при стресах, фобіях, агресії без видимих причин та при підвищеному статевому збудженні (сумісно з контрацептивами), для профілактики захитувань.
ДОЗУВАННЯ	Краплі АНТИСТРЕС застосовують котам і собакам перорально на корінь язика 2 рази на добу у дозах: коти – 1 крапля препарату (що еквівалентно 4 мг фенібуту) на 1 кг маси тіла; собаки – 2 краплі препарату (що еквівалентно 8 мг фенібуту) на 1 кг маси тіла. Курс застосування препарату становить 10-15 днів. За наявності ознак сильного збудження та психогенних порушень поведінки (агресія, страх, гіперактивність, гіперсексуальна поведінка) курс може бути продовжено до 20-ти днів. При повторному прояві у тварини ознак збудження і/або порушень поведінки – курс застосування препарату повторюють у тих самих дозах, за тією самою схемою. З метою профілактики стресів (транспортування, зміна обстановки, вибухи піротехніки, від'їзд хазяїна, участь у виставках і змаганнях) препарат застосовують за 3-5 днів до майбутнього заходу та протягом 1-4 днів після його закінчення. Для профілактики захитування застосовують одноразово у вищезгаданих дозах за 1-2 години до визначеного початку транспортування тварини. За появи виражених ознак захитування (блювота) прийом препарату малоефективний. Для корекції поведінки при підвищеній статевій активності краплі АНТИСТРЕС застосовують у тих самих дозах сумісно з контрацептивами. Тривалість курсу застосування залежить від індивідуальної чутливості тварини і ступеню її збудження.
ПРОТИПОКАЗАННЯ	Індивідуальна чутливість до компонентів препарату (у тому числі в анамнезі), гостра та хронічна ниркова недостатність, діабет. Не застосовувати вагітним та лактуючим самицям.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	Перед застосуванням ретельно струсити. <i>Побічна дія</i> При застосуванні препарату згідно з листівкою-вкладкою побічних реакцій не виявлено. При підвищеній індивідуальній чутливості до компонентів препарату, можливі прояви збудження, сонливості, дратівливості, нудоти та алергічні реакції. У таких випадках проводять симптоматичну та десенсибілізуючу терапію. Рідко, при першому введенні препарату, у тварин може спостерігатися сонливість і нудота, які проходять самостійно та не потребують лікування.
ФОРМА ВИПУСКУ	Флакони-крапельниці полімерні по 10, 30 мл, у картонних пачках по 1 шт.
ЗБЕРІГАННЯ	Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25 °С. При зберіганні допускається випадіння осаду, що легко розбивається при струшуванні. Термін придатності препарату – 2 роки. Після першого відкриття флакону – 28 днів, за умови зберігання його в темному місці за температури від 5 до 25 °С.

ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ!

ВЛАСНИК РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» Україна, 08601, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 57А
ВИРОБНИК ГОТОВОГО ПРОДУКТУ	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» Україна, 08601, Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Лістрогов Олександра, 1/3 www.bioteslab.ua