

ТЕРМОНОРМ	
Порошок для приготування перорального розчину	
ОПИС	Порошок від білого до світло-сірого кольору.
СКЛАД	1 г порошку містить діючу речовину: кислоту ацетилсаліцилову - 700 мг. Допоміжні речовини: карбонат натрію безводний, аеросил.
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	ATCvet класифікаційний код: QN02 – ветеринарні препарати, що впливають на нервову систему. Анальгетики. QN02BA01 - Ацетилсаліцилова кислота. Кислота ацетилсаліцилова — ненаркотичний анальгетик групи саліцилатів. Має протизапальний, знеболюючий, жарознижуючий ефект та перешкоджає агрегації тромбоцитів, чим проявляє свою антиагрегантну дію. Кислота ацетилсаліцилова пригнічує циклооксигеназу (простагландинову синтетазу), чим саме і сприяє зниженню синтезу простагландинів та тромбоксанів. Завдяки цим ефектам кислота ацетилсаліцилова виконує свою знеболюючу, жарознижуючу та протизапальну функцію. Більшість клітин може синтезувати циклооксигеназу знову, але у тромбоцитів такої здатності немає. Тому кислота ацетилсаліцилова виявляє незворотний вплив на агрегацію тромбоцитів. Після перорального застосування ацетилсаліцилова кислота швидко і повністю всмоктується з шлунково-кишкового тракту. Вона швидко метаболізується до саліцилової кислоти за періодом напіввиведення 15-30 хвилин. Саліцилова кислота метаболізується переважно в печінці. Метаболітами саліцилової кислоти є гліцин, кон'югати глюкуронової кислоти та сліди гентизинової кислоти. Саліцилати та їх метаболіти швидко виводяться нирками шляхом фільтрації та канальцевої секреції.
ЗАСТОСУВАННЯ	Препарат застосовують для симптоматичного лікування телят, свиней та свійської птиці (курчата-бройлери, племінні кури, ремонтний молодняк) при патологічних станах, що супроводжуються гіпертермією, запальним та больовим синдромом слабкої та середньої інтенсивності різного генезу (в тому числі запального), включаючи гарячковий стан, респіраторні захворювання, синдром ММА (метрит-мастит-агалактія), ревматоїдний артрит, остеоартрит, ламініт, м'язові та післяопераційні болі, тепловий стрес.
ДОЗУВАННЯ	Перорально, шляхом випоювання з питною водою або індивідуально, у дозі 1 г препарату на 7 кг маси тіла тварини (що еквівалентно 100 мг кислоти ацетилсаліцилової на 1 кг маси тіла) на добу, протягом 3-5 діб. Необхідну кількість препарату попередньо змішують не менше, ніж із десятиразовим об'ємом води питної температурою не менше 35 °С, інтенсивно перемішують протягом 20-30 хвилин до повного розчинення, яке супроводжується інтенсивним піноутворенням. Отриманий розчин телятам застосовують індивідуально, розділивши добову потребу на два прийоми, а свиням та птиці — додають у воду, що призначена для денного випоювання. У період лікування птиця та свині повинні отримувати тільки воду, що містить препарат. При застосуванні препарату з питною водою розчин готують із розрахунку необхідної кількості питної води (згідно з нормами випоювання води для окремих видових та вікових категорій тварин), дози та маси тіла тварин. Приклади дозування: • 1,5 кг препарату на 1000 л питної води для свиней; • 300-600 г препарату на 1000 л питної води для свійської птиці. Свіжий розчин препарату із питною водою необхідно готувати щоденно.

ПРОТИПОКА- ЗАННЯ	Підвищена індивідуальна чутливість до саліцилатів. Захворювання травного каналу, зокрема виразкова хвороба. Порушення згортання крові. Не застосовувати поросятam віком до 1 місяця. Не застосовувати вагітним та лактуючим самкам. Не застосовувати курям-несучкам, яйця яких призначені для споживання людьми. Не застосовувати разом з препаратами, які залужнюють або закислюють сечу, разом з антибіотиками групи тетрацикліну та аміноглікозидами, кортикостероїдами та іншими нестероїдними протизапальними препаратами (НПЗП), сечогінними препаратами: фуросемідом та спіронолактоном, дигоксином, гепарином та іншими антикоагулянтами.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	<i>Побічна дія</i> Можливі прояви свербіжу, тремору м'язів, розладів травного каналу, блювоти, подразнення шлунку та кишечника, виразки. При виявленні небажаних явищ, застосування препарату необхідно припинити. <i>Особливі застереження при використанні</i> Слід застосовувати з обережністю у тварин з вираженою печінковою недостатністю та зниженням ниркової функції. Слід припинити застосування за 2 тижні до оперативних втручань. Препарат застосовують в комплексі з етіотропною терапією. Слід застосовувати з обережністю у тварин з вираженою печінковою недостатністю та зниженням ниркової функції. <i>Спеціальні застереження</i> Слід припинити застосування за 2 тижні до оперативних втручань. Не застосовувати тваринам, молоко або яйця яких призначені для споживання людьми. <i>Період виведення (каренції)</i> Не вимагається.
ФОРМА ВИПУСКУ	Пакети з полімерних матеріалів по 10, 50, 100, 150, 200, 250 і 500 г, 1, 2 і 5 кг.
ЗБЕРІГАННЯ	Сухе темне, недоступне для дітей місце при температурі від 5 до 25 °С. Термін придатності - 2 роки. Термін придатності після першого відкриття (відбору) — 28 днів за умови зберігання щільно закритим у темному сухому, недоступному для дітей та тварин місці за температури від 5 до 25 °С.
для застосування у ветеринарній медицині!	
ВЛАСНИК РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ:	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» Україна, 08601, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 57А.
ВИРОБНИК ГОТОВОГО ПРОДУКТУ:	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» Україна, 08601, Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Лістрогого Олександра, 1/3 www.biotestlab.ua.