

**ОФЛОКСАЦИНВЕТ® 10%**  
**(розчин для перорального застосування)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Маслянистий розчин від безбарвного до світло-жовтого кольору.

**Склад**

1 мл препарату містить діючу речовину:

офлоксацин - 100,0 мг.

Допоміжні речовини: 1,2 - пропіленгліколь, трилон Б, калію гідроксид, вода очищена.

**Фармакологічні властивості**

АТС vet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01MA01 - Офлоксацин.

Діючою речовиною препарату є антибіотик офлоксацин, групи фторхінолонів.

Офлоксацин активний проти грамнегативних бактерій, а саме: *E.coli*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Klebsiella spp.*, *Proteus spp.*, *Serratia spp.*, *Camphylobacter spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Yersinia spp.*, *Vibrio spp.*, *Aeromonas spp.*, *Haemophilus spp.*, *Brucella spp.*. До препарату також чутливі грампозитивні бактерії, такі як *Staphylococcus spp.* (включаючи пеніциліназо-продуктуючі та метицилін-стійкі штами), та інші мікроорганізми, включно з *Chlamydia spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Mycobacterium spp.*.

Механізм дії препарату полягає в інгібуванні бактеріальної ДНК-гірази (топоізомерази II), що, таким чином, зупиняє процес спіралізації та синтез ДНК.

Офлоксацин після перорального застосування проникає практично у всі органи та тканини, але найбільший його рівень спостерігають у лейкоцитах, альвеолярних макрофагах, легенях, печінці, жовчі, репродуктивних органах та нирках. Біодоступність офлоксацину при пероральному застосуванні становить 96-100%. Максимальна концентрація офлоксацину в сироватці крові відзначається через 1,5-2 години, терапевтична концентрація зберігається протягом 24 годин. Період напіввиведення становить 4,5-7 годин (незалежно від дози). Виводиться з організму собак та котів нирками, в основному, у незміненому вигляді (до 75-90 %), та у вигляді метаболітів шляхом канальцевої секреції та клубочкової фільтрації, а також з жовчю (близько 4%).

**Застосування**

Лікування собак та котів при захворюваннях органів дихання (пневмонії, бронхіт, бронхопневмонії та інші), травного каналу (гастрит, ентерит), сечостатевої системи (пієлонефрит, метрит, цистит), хворих на мастит, дерматити, перитоніт, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до офлоксацину.

**Дозування**

Перорально з питною водою або кормом у дозах:

коти - 0,1 мл препарату на 2 кг маси тіла тварини (5 мг ципрофлоксацину на 1 кг маси тіла тварини). Застосовують препарат з інтервалом 24 години, курс лікування - 3-5 діб.

собаки - 0,5 мл препарату на 10 кг маси тіла тварини (5 мг ципрофлоксацину на 1 кг маси тіла тварини). Застосовують препарат з інтервалом 24 години, курс лікування - 3-5 діб.

Слід уникати пропуску чергової дози препарату, оскільки це може привести до зниження ефективності лікування.

### **Протипоказання**

Підвищена чутливість до офлоксацину.

Не застосовувати тваринам із порушенням функції нирок та печінки.

Не застосовувати одночасно з тетрациклінами, макролідами, лінкозамідами, циклоспоринами, хлорамфеніколом.

Не застосовувати одночасно з теофіліном і нестероїдними протизапальними засобами, а також з препаратами, що містять катіони магнію, алюмінію і кальцію, які, зв'язуючись з офлоксацином, перешкоджають його адсорбції.

Не лікувати тварин з ознаками захворювань центральної нервової системи, що супроводжуються судомними.

Не застосовувати коням.

Не застосовувати собакам дрібних порід до 8-місячного віку, собакам великих порід - до 18-місячного віку, котам - до 8-місячного віку, оскільки офлоксацин негативно діє на формування хрящової та кісткової тканин.

Не застосовувати при виявленні резистентних штамів збудників.

### **Застереження**

#### *Побічна дія*

У рекомендованих дозах побічних явищ, як правило не спостерігається. При виникненні побічних явищ (свербіж, нудота, блювота, тремор м'язів) припиняють застосування препарату, застосовують десенсибілізуючу терапію.

#### *Особливі застереження при використанні*

Можливі алергічні реакції (свербіж, набряк), при виникненні цих симптомів застосовують десенсибілізуючу терапію.

Перед застосуванням рекомендують визначити чутливість мікроорганізмів-збудників до офлоксацину.

#### *Застосування під час вагітності, лактації, несучості*

Вагітним тваринам препарат не рекомендують застосовувати, оскільки можлива нейротоксична дія. Можливість застосування препарату визначає відповідальний лікар ветеринарної медицини, зважуючи можливий позитивний ефект чи ризик.

#### *Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії*

Не застосовувати одночасно з тетрациклінами, макролідами, лінкозамідами, циклоспоринами, хлорамфеніколом.

Не застосовувати одночасно з нестероїдними протизапальними засобами.

При застосуванні одночасно з препаратами, що містять у своєму складі катіони  $Mg^{2+}$ ,  $Al^{3+}$ ,  $Ca^{2+}$ , останні зв'язуються з офлоксацином та перешкоджають його абсорбції.

При застосуванні одночасно з теофіліном (еуфіліном), офлоксацин може підвищити рівень теофіліну в крові.

При одночасному призначенні препарату із аміноглікозидами, цефалоспоринами третього покоління та пеніцилінами широкого спектру дії може виникнути синергізм по відношенню до деяких бактерій (особливо, *Pseudomonas aeruginosa* та інших бактерій родини *Enterobacteriaceae*).

Препарат не рекомендують змішувати з іншими лікарськими засобами.

Продовження додатку 2

до реєстраційного посвідчення АВ-02432-01-11

12.07.2021

**Форма випуску**

Ампули з нейтрального скла марки НС-1, НС-2, УСП-1 по 0,5 та 1,0 мл.

Флакони з нейтрального скла марки НС-1, НС-2, УСП-1 по 50 та 100 мл. Вторинна упаковка - картонна коробка.

Полімерні флакони по 240 мл.

**Зберігання**

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °С до 25 °С.

Термін придатності - 2 роки.

**Для застосування у ветеринарній медицині!**

**Власник реєстраційного посвідчення:**

Товариство з обмеженою відповідальністю “Ветсинтез”

61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна