

04.03.2026

Апіхелс
(гель для застосування у вуликах)
листівка-вкладка

Опис

Гель білого або світло-жовтого кольору.

Склад

1 г препарату містить діючі речовини (мг):

тимол	– 250;
олія ефірна евкаліпту	– 50;
ментол	– 12.

Допоміжні речовини: карбопол, триетаноламін, гліцерин, метилпарабен, вода високоочищена.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код: *QP53AX30 – Комбінації інших паразитоцидів для місцевого застосування.*

Всі діючі речовини препарату Апіхелс є компонентами рослинного походження, завдяки чому забезпечують значну безпеку для бджолиних сімей і не погіршують якість меду.

Тимол отримують із ефірної олії чебрецю (*Thymus vulgaris*) або синтетичним шляхом. Він має виражені акарицидні, бактерицидні, віруліцидні та фунгіцидні властивості.

Евкаліптову олію, отримують із листя різних видів евкаліптів. Вона містить ефірну олію, цинеол (не менше 60%), пінен, інші терпеноїдні фенолальдегіди, тритерпеноїди та забезпечує антисептичну дію по відношенню до ряду бактерій, вірусів, мікроміцетів та найпростіших. Комплекс активно діючих речовин евкаліптової олії стимулює посилення неспецифічної резистентності бджіл та підвищує їх опірність до інфекційних захворювань.

Ментол – органічна речовина, яку отримують із ефірної олії м'яти (*Mentha piperita* L.). Ментол має виражені акарицидні, антисептичні та фітонцидні властивості.

Комплекс трьох активно діючих компонентів, завдяки синергічному підсиленню їх фармакологічної ефективності, забезпечує високу терапевтичну дію (понад 95%) щодо збудників вароатозу, акарапідозу та личинок воскової молі, а також попереджає розвиток мікозів (аспергільозу і аскоферозу), збудників інфекційних хвороб бджіл (американського та європейського гнильцю).

При використанні у рекомендованих дозах та тривалості курсів, залишки активно діючих речовин не накопичуються в меді, перзі та воску.

Застосування

Лікування бджіл при вароозі; профілактика акарапозу, аскоферозу, аспергільозу, американського і європейського гнильцю та розвитку личинок воскової молі.

Дозування

Для сильної бджолосім'ї доза становить 50 г, для слабкої – 20-25 г.

Контейнер з препаратом розміщують у центрі вулика, зверху на рамках. Між поверхнею контейнера з препаратом і кришкою вулика залишають 0,5-1 см вільного простору.

Через 21 добу рештки препарату видаляють та вносять нову дозу препарату в тій же кількості, залишають її у вулику до повного спорожнення контейнера.

Препарат з туби рівномірно наносять на аркуш офісного або пергаментного паперу формату А4, видавлюючи 4-6 доріжок. Аркуш з препаратом розташовують зверху на рамках, у центрі вулика на 21 добу.

У весняно-літній період обробки закінчують за сім днів до початку основного медозбору. Літньо-осінню обробку проводять після відкачування товарного меду при зовнішній температурі повітря в межах 15-27°C.

Протипоказання

Препарат не має протипоказань щодо застосування у вуликах з робочими бджолами, матками та розплодом.

Застереження

Мед використовують без обмежень.

Всі роботи з препаратом проводять у спецодязі. Слід уникати безпосереднього контакту препарату зі шкірою і попадання його в очі. Після закінчення роботи слід ретельно вимити руки з милом. При потраплянні препарату на шкіру необхідно змити водою з милом, а при потраплянні в очі - промити великою кількістю проточної води. Не вдихати.

Форма випуску

Туби по 50, 200, 250 г.

Пластикові контейнери по 50 або 1000 г.

Зберігання

Сухе, темне, недоступне для дітей місце на відстані від нагрівальних елементів, окремо від продуктів харчування та кормів за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності

2 роки. Термін придатності після першого відкриття – 20 діб, за умови зберігання в упакованні виробника та щільного закриття, в темному місці при температурі від 5 до 25 °С.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400