

ЕФЕКТВЕТ спрей
(спрей для зовнішнього застосування, розчин)
листівка-вкладка

Опис

Рідина від безбарвного до жовтуватого кольору зі специфічним запахом складових компонентів.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини:

фентіон - 2,0 мг;

α -циперметрин - 2,0 мг.

Допоміжні речовини: диметилсульфоксид, спирт бензиловий, 1,2 - пропіленгліколь, гліцерин, спирт ізопропіловий.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP53, ектопаразитоциди, інсектициди і репеленти.

ЕФЕКТВЕТ — комбінований препарат, до складу якого входять фентіон та α -циперметрин.

Фентіон - інсектицид групи тіофосфорорганічних сполук, механізм дії якого полягає в блокуванні ферменту ацетилхолінестерази в нервових синапсах паразита, що призводить до його загибелі. Фентіон погано проникає через гематоенцефалічний бар'єр теплокровних тварин, але при зовнішньому застосуванні всмоктується через шкіру і проникає в кров. Кровосисні паразити гинуть через попадання у їх організм фентіону з кров'ю тварин.

α -циперметрин - репелент, контактний синтетичний піретроїд з широким спектром інсектицидної дії, який блокує передачу нервових імпульсів, викликаючи порушення координації рухів, параліч та загибель ектопаразитів. Він швидко метаболізується та виводиться з організму, тому не накопичується в тканинах тварин.

Після нанесення препарату на шкіру діючі речовини потрапляють у кровоносне русло, кумулюються в епідермісі, волосяних цибулинах та жирових залозах тварини і мають тривалу інсекто-акарицидну дію.

Застосування

Профілактика і лікування собак та котів при ураженні ектопаразитами: блохами (*Ctenocephalides spp.*, *Pulex irritans*); вошами (*Linognathus setosus*); волосоїдами (*Trichodectes canis*, *Felicola subrostratus*) саркоптоїдними кліщами (*Notoedres cati*, *Otodectes cynotis*) та паразитиформними кліщами (*Ixodes spp.*, *Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis SPP*).

Дозування

Обробку тварин проводять на відкритому повітрі або в добре вентиляованих приміщеннях. Для попередження злизування препарату щелепи тварин фіксують петлею або на шию одягають "захисний комір". Перед застосуванням флакон ретельно струшують і, тримаючи флакон вертикально, натискають на кришку-розпилювач спрею, направляючи струмінь препарату з відстані 10-15 см на тулуб тварини проти шерсті впродовж декількох секунд, зволожуючи шерсть і шкіру. Прикриваючи очі тварини, обробляють вушні раковини і груди, кінчиками пальців препарат наносять навколо очей і носа, далі обробляють шию, кінцівки, живіт і хвіст. Препарат наносять на тварину з розрахунку 0,5-1,0 мл на 1 кг маси тіла, тобто від 4 до 9 натискань на розпилювач об'ємом

100 мл або 2-5 натискань для флаконів об'ємом 250 мл. Повторні обробки тварин рекомендується проводити через 3-4 тижні, в сезон підвищеної активності паразитів обробки можна проводити частіше.

При обробці тварин уникати потрапляння препарату в очі та на слизові оболонки!

При обробці довгошерстих тварин шерсть розчісують щіткою таким чином, щоб нанести препарат безпосередньо на шкіру. При ураженні тварин паразитиформними кліщами препарат наносять безпосередньо на кліща і місце його прикріплення до шкіри (одне

натискання на розпилювач). Якщо протягом 20-30 хвилин кліщ самовільно не відпаде, то його акуратно витягують пінцетом.

З метою запобігання повторної інвазії тварин ектопаразитами необхідно періодично замінювати або обробляти підстилки препаратом з розрахунку 4-6 мл (35-52 натискань на розпилювач флаконів об'ємом 100 мл або 17-26 натискань для флаконів об'ємом 250 мл) на 1 м² поверхні, що обробляється. Після обробки підстилки можна застосовувати для тварин лише через 3 доби.

При нотоєдрозі тварин препарат наносять на заздалегідь очищені від струпів і кірок уражені ділянки тіла із захопленням пограничної здорової шкіри до 1 см.

Обробку препаратом проводять злегка зволожуючи місця ураження з розрахунку 1 мл (9 натискань на розпилювач для флаконів об'ємом 100 мл або 5 натискань для флаконів об'ємом 250 мл) на 10 см² ураженої ділянки, 2-5 разів з інтервалом 7-10 діб до клінічного одужання тварини.

Тварин з великими ділянками ураження обробляють двічі через 1 добу, наносячи препарат на уражені місця спочатку з однієї, а потім з іншої половини тіла.

При отодектозі тварин внутрішню поверхню вушної раковини і зовнішній слуховий прохід очищають від вушної сірки, ексудату і струпів, потім розпилюють препарат у кожне вухо по 1-2 натискань на розпилювач флаконів об'ємом 100 мл або 1 натискання для флаконів об'ємом 250 мл. Обробку проводять 2-3 рази з інтервалом 5-7 діб.

Для рівномірного розподілу препарату вушну раковину складають і злегка масажують, фіксуючи голову тварини впродовж 5-10 хвилин, для запобігання розбризкування препарату. Препаратом обробляють два вуха!

Протипоказання

Підвищена чутливість до складових компонентів препарату!

Не застосовувати хворим, виснаженим та ослабленим тваринам!

Не застосовувати цуценят і кошенят віком до 3-х місяців!

Не застосовувати препарат самкам під час вагітності та лактації!

Застереження

При роботі з препаратом дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.

Обробку тварин необхідно проводити в гумових рукавицях. Після закінчення обробки вимити руки теплою водою з милом. Впродовж 48 годин після обробки тварин уникати їх контакту з дітьми віком до 2-х років.

У чутливих тварин після обробки можливі ускладнення (слинотеча, неспокій), які швидко проходять. При алергічних ускладненнях (висипання на шкірі, свербіж та набряки) рекомендують десенсибілізуючу терапію. Антитокс - атропіну сульфат.

Не купати тварин 48 годин до та після обробки препаратом!

Форма випуску

Полімерні флакони з кришкою-розпилювачем по 100, 250 мл.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей, місце за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності

2 роки.

Після першого відбору з флакону препарат необхідно використати протягом 6 місяців за умови зберігання його за температури від 5 до 25 °С.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Товариство з обмеженою відповідальністю “Ветсинтез”
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна

Виробник готового продукту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Ветсинтез”
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна