

SUIMUN CSF ЛК-М, СУІМУН КЧС ЛК-М**вакцина проти класичної чуми свиней, жива.**

СКЛАД	Активні діючі речовини: вірус класичної чуми свиней штаму ЛК-М $\geq 3,0 \lg \text{TKID}_{50}$ в дозі; Допоміжні речовини: сухе молоко, ГЛА або пептон 120 мг у флаконі. Розчинник з розрахунку 2,0 мл на дозу.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА	Ліофілізат; ліофілізат та розчинник.
ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	Вакцина забезпечує захист щепленого поголів'я від захворювання на класичну чуму свиней. Поствакцинальний захист у свиней настає на 4-6 день після вакцинації і зберігається не менше одного року. Лікувальними властивостями не володіє.
ВИД ТВАРИН	Свині.
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ	Профілактика захворювання на класичну чуму свиней.
ПРОТИПОКАЗАННЯ	Вакцину не застосовують виснаженим та хворим свиням.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ	Дотримуватись правил асептики. Не використовувати вакцину у флаконах з тріщинами, без етикеток, порушенням укупорювання, не використану впродовж чотирьох годин з моменту її розчинення або з закінченим терміном придатності.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ	Вакцинацію іншими препаратами можна проводити не раніше ніж через 14 днів після введення вакцини проти класичної чуми свиней.
ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ПРИ ВАГІТНОСТІ, ЛАКТАЦІЇ	При загрозі виникнення захворювання свиноматок вакцинують одноразово незалежно від строку поросності та лактації. Вакцина не має негативного впливу під час вагітності та лактації.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ	Для розчинення вакцини використовують «Розчинник для вакцини проти класичної чуми свиней» або стерильний фізіологічний розчин. Безпосередньо перед використанням вакцину розчиняють із розрахунку 2,0 мл розчинника на одну дозу. Із флакону розчинника необхідно відібрати шприцем п'ять мілілітрів розчинника і перенести у флакон з ліофілізатом, злегка збовтати, до повного розчинення ліофілізату, відібрати шприцем розчинений матеріал та перенести до флакону з розчинником. Процедуру проводять двічі, для перенесення всього об'єму вірусу КЧС у флакон з розчинником. Вакцину вводять внутрішньом'язово в ділянці шиї «за вухом» або внутрішньої поверхні стегна. В благополучних по класичній чумі свиней господарствах дорослих свиней та ремонтний молодняк, по досягненню трьохмісячного віку, вакцинують один раз на рік, свиноматок – один раз на рік за 20-15 днів до осіменіння. В господарствах, де існує загроза інфікування, поросят вакцинують дворазово: перший раз в віці 30-45 днів; повторно через 3-4 тижні; в подальшому – раз на рік.
ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ	В окремих випадках введення вакцини може викликати підвищення температури тіла на один градус через 3-7 днів після імунізації при задовільному загальному стані і збереженні апетиту.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ	Впродовж 10-14 днів після щеплення під час паталогоанатомічного розтину в разі забою або загибелі свиней можливе виявлення характерних крапкових крововиливів, що свідчить на вплив вакцинного штаму вірусу на ослаблений організм. У неблагополучних пунктах (господарствах) після імунізації можлива загибель тих тварин, які уже були інфіковані епізоотичним вірусом класичної чуми свиней або знаходились в інкубаційному періоді хвороби.
ПЕРЕДОЗУВАННЯ (СИМПТОМИ, НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ)	Введення свиням 10 доз вакцини не викликає захворювання. На місці введення не виникає видимих змін.
ПЕРІОД ОЧІКУВАННЯ	Нуль діб.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ І ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ВІП	Дотримуватись правил асептики, особистої гігієни і правил роботи з тваринами. У разі випадкової самоін'єкції необхідно негайно звернутися за медичною допомогою, маючи при собі листівку-вкладку на даний препарат.
ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З НЕВИКОРИСТАНИМ ВІП, СПОСОБИ ЙОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ І УТИЛІЗАЦІЇ	Не використану вакцину з закінченням терміном дії, голки, шприци та флакони з залишками вакцини знезаражують кип'ятінням впродовж 30 хвилин.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	24 місяці. Використати впродовж чотирьох годин з моменту її розчинення.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ	Вакцину зберігають у темному недоступному для дітей місці при температурі від 2 до 8°C, або до мінус 20°C. Розчинник зберігають у темному не доступному для дітей місці при температурі від 2 до 8°C.
УПАКОВКА ТА ФАСУВАННЯ	Вакцина у флаконах зі скла або пластику, закриті гумовою пробкою та алюмінієвим ковпачком, що містять по 10; 20; 50 або 100 доз вакцини. Розчинник у флаконах зі скла або пластику, закриті гумовою пробкою та алюмінієвим ковпачком, що містять по 20; 40; 100 або 200 мл.
НАЗВА ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВЛАСНИКА РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» 08600 Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська 57-А
АДРЕСА ВИРОБНИЦТВА	03143 м. Київ, вул. Академіка Лебедева, 1; 08600 Київська обл., м. Васильків, вул. Лістового Олександра, буд. 1/3, Україна www.biotestlab.ua.
ПРАВИЛА ВІДПУСКУ	За рецептом.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.