



МЕЛОКСИВЕТ суспензія

(суспензія для перорального застосування)

лістівка-вкладка

Опис

Суспензія світло-жовтого кольору. При зберіганні допускається розшарування.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

мелоксикам - 1 мг.

Допоміжні речовини: натрію бензоат, гліцерин, колідон К 25, калію сорбат, ксантанова камедь, натрію фосфат двоохаміщений двоховдний (динатрію фосфат дигідрат), натрію фосфат однозаміщений двоховдний (натрію дигідроген фосфат дигідрат), лимонна кислота, вода очищена.

Фармакологічні властивості

ATC-vet класифікаційний код: QM01A. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. QM01AC06 Мелоксикам.

Мелоксикам належить до нестероїдних протизапальних лікарських засобів класу оксикамів, є селективним інгібітором ЦОГ-2. Виявляє протизапальну, анальгезуючу та жарознижувальну дію. Механізм дії пов'язаний зі зниженням біосинтезу простагландинів внаслідок пригнічення ферментативної активності ЦОГ-2, що бере участь у синтезі простагландинів у вогнищі запалення; незначно впливає на ЦОГ-1, що зменшує ризик розвитку побічної дії.

У собак і котів мелоксикам добре абсорбується з травного каналу після перорального застосування, (абсолютна біодоступність препарату становить 90%) і досягає максимальної концентрації в плазмі крові протягом 4,5 годин.

Мелоксикам дуже сильно зв'язується з білками плазми, головним чином з альбуміном (99%). Він проникає в синовіальну рідину, концентрація в якій у половину менша, ніж у плазмі крові. Мелоксикам майже повністю метаболізується в печінці з утворенням 4 неактивних похідних. Основний метаболіт, 5'-карбоксимелоксикам (60% від дози), утворюється шляхом окислення проміжного метаболіту 5'-гідрокси-метилмелоксикаму, який також екскретується, але в менших кількостях (9% від дози).

Виводиться в рівній мірі з калом і сечею, переважно у вигляді метаболітів. У незміненому вигляді з фекаліями виводиться менше 5% від величини добової дози, у сечі в незміненому вигляді препарат виявляється тільки в дуже малих кількостях. Середній період напіввиведення ($T_{1/2}$) становить 20 годин. Плазмовий кліренс в середньому становить 8 мл/хв. Мелоксикам демонструє лінійну фармакокінетику в дозах 7,5-15 мг при внутрішньом'язовому введенні. Печінкова або ниркова недостатність середньої тяжкості не робить істотного впливу на кінетику мелоксикаму.

Застосування

Собаки: для зменшення запалення та болю при запальних і больових синдромах різного походження, таких як гострі та хронічні захворювання опорно-рухового апарату (артрити, артрози, синовіти, вивихи).

Коти: для зменшення запалення та болю при запальних і больових синдромах різного походження, включаючи гострі та хронічні захворювання опорно-рухового апарату (артрити, артрози, синовіти, вивихи), а також в якості анальгезуючого і протизапального лікарського засобу в післяопераційний період.

Дозування

Перорально індивідуально, під час годування з кормом або за допомогою шприца-дозатора, один раз на добу.

Перед застосуванням флакон з препаратом необхідно струсити.

Собаки: при порушеннях опорно-рухового апарату в першу добу лікування препарат застосовують у дозі 0,2 мл (4 краплі) препарату на 1 кг маси тіла тварини (що відповідає 0,2 мг мелоксикаму на 1 кг маси тіла тварини), в наступні дні - 0,1 мл (2 краплі) препарату на 1 кг маси тіла тварини (що відповідає 0,1 мг мелоксикаму на 1 кг маси тіла тварини).

Коти: при порушеннях опорно-рухового апарату препарат застосовують у перший день лікування у дозі 0,1 мл (2 краплі) препарату на 1 кг маси тіла тварини (що відповідає 0,1 мг мелоксикаму), в наступні дні - 0,05 мл (1 крапля) препарату на 1 кг маси тіла тварини (що відповідає 0,05 мг мелоксикаму). Для зменшення післяопераційного болю та запалення після хірургічних процедур: після початкового лікування препаратом МЕЛОКСИВЕТ (розчин для ін'єкцій) у відповідній дозі, продовжують лікування через 24 години препаратом МЕЛОКСИВЕТ суспензія у дозі 0,05 мл (1 крапля) препарату на 1 кг маси тіла тварини (що відповідає 0,05 мг мелоксикаму на 1 кг маси тіла тварини).



Кожна упаковка по 50 мл забезпечена шприцем-дозатором, що дозволяє максимально точно дозувати лікарський препарат собакам великих і середніх порід (від 5 кг).

Кожна споживча упаковка по 10 мл забезпечена вставками-крапельницями для дозування препарату собакам дрібних порід та котам (до 5 кг).

Тривалість курсу лікування залежить від показань і стану тварини і визначається лікуючим лікарем ветеринарної медицини, але не повинна перевищувати 10 діб. У разі відсутності поліпшення клінічного стану тварини після 10-денного курсу лікування застосування лікарського препарату припиняють.

Слід уникати пропусків при введенні чергової дози препарату, так як це може призвести до зниження терапевтичної ефективності. У разі пропуску однієї дози необхідно ввести її якомога швидше. Далі інтервал до наступного введення препарату не змінюється.

Протипоказання

Не застосовувати тваринам при підвищеній чутливості до мелоксикаму, а також тваринам з виразкою шлунка і 12-палої кишки, при виражених нирковій і печінковій недостатностях, геморагічному синдромі.

Не застосовувати вагітним і лактуючим самкам, цуценят та кошенят молодше 6-тижневого віку.

Препарат протипоказаний тваринам з захворюваннями серцево-судинної системи, при захворюваннях кровотворних органів.

Застереження

Побічна дія

У деяких випадках спостерігаються короткочасна блювота і діарея, а також втрата апетиту, незначні домішки крові в фекаліях і загальне пригнічення.

Особливі застереження при використанні

Оскільки ризик, пов'язаний із застосуванням мелоксикаму, може підвищуватися залежно від дозування та тривалості застосування, необхідно призначати якомога коротшими період застосування та мінімальні ефективні добові дози. У разі появи ознак побічної дії, застосування препарату слід припинити. Не слід застосовувати препарат тваринам в стані дегідратації, гіповолемії і гіпотензії, через можливість токсичного впливу лікарського препарату на нирки. За крайньої необхідності, лікування таких тварин препаратом проводять під постійним наглядом ветеринарного лікаря, при цьому добову дозу препарату зменшують у 2 рази.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Не рекомендується застосовувати препарат одночасно, а також протягом 24 годин до і 24 годин після закінчення застосування інших нестероїдних протизапальних засобів та ацетилсаліцилової кислоти, глюкокортикоїдів, антикоагулянтів та гепарину, діуретиків, інгібіторів АПФ та антагоністів ангіотензину II і потенційно нефротоксичних препаратів.

Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Не можна перевищувати вказані дози. При передозуванні можлива поява блювоти, діареї, анорексії, пригніченого стану, кровотеч і виразок травного каналу. При симптомах передозування необхідно негайно звернутися до ветеринарного фахівця. При передозуванні лікування симптоматичне.

Форма випуску

Пластиковий флакон по 10 мл зі вставкою-крапельницею, вкладений в коробку, пластиковий флакон по 50 мл, вкладений в коробку в комплекті зі шприцем-дозатором.

Зберігання

У сухому темному та недоступному для дітей місці за температури від 0 до 25 °С.

Термін придатності - 3 роки.

Термін придатності після першого відбору з флакону - не більше 3 місяців при зберіганні за температури від 2 до 8 °С.

Власник реєстраційного посвідчення та виробник:

ТОВ «ВП «Укрзооветпромпочаст»

вул. Кавказька, 1, с. Плахтянка, Бучанський р-н.,

Київська обл., 08030, Україна

ukrzoovet.com.ua

А Лише для
ветеринарної
медицини

Виробник:

ТОВ «ЕКОБІОЗАХИСТ»

вул. Житомирська, 100

м. Звягель

Житомирська обл.

11703, Україна

