

10.03.2025

Бровадазол порошок
(порошок для перорального застосування)

листівка—вкладка

Опис

Порошок білого або світло-сірого кольору, зі слабким специфічним запахом.

Склад

1 г препарату містить діючу речовину:

фенбендазол — 50,0 мг.

Допоміжні речовини: мальтодекстрин.

Фармакологічні властивості

АТСvet класифікаційний код: QP52 — антигельмінтні ветеринарні препарати. QP52AC13 — фенбендазол.

Фенбендазол має високу антигельмінтну активність і широкий спектр нематодоцидної та цестодоцидної дії. Він порушує енергетичний обмін, руйнує мікроканальці травних клітин та спричиняє нейротоксичний ефект у гельмінтів. Згубно діє на личинки різних стадій та порушує цілісність оболонок яєць гельмінтів, які при потраплянні в навколишнє середовище не спроможні далі розвиватися.

Після перорального застосування швидкість всмоктування фенбендазолу невисока, але в одношлункових тварин вона вище. Залежно від дози і виду тварини вміст фенбендазолу в сироватці крові досягає максимуму через 6-30 годин. Середній період напіввиведення — 10-27 годин. У свиней після введення дози 5 мг/кг максимальний рівень незміненого препарату (0,45 мг/л) відзначається через 6-12 годин. Середній період напіввиведення становить 10 годин. Концентрація падає нижче межі виявлення через 48 годин.

Фенбендазол слабо зв'язується з білками плазми крові. Метаболізується до оксфендазолу (сульфоксиду), оксфендазолсульфонових та оксфендазоламініх метаболітів, що знаходяться в плазмі. Основним метаболітом, який виводиться з сечею, є 4-гідроксіфенбендазол, а також оксфендазол та оксфендазолсульфон. Лікувальний ефект досягається завдяки сумарній дії фенбендазолу та його основних метаболітів — фенбендазолсульфоксиду (оксфендазолу) і оксфендазолсульфону. Період напіввиведення дорівнює 2,8-9 годин. Більша частина фенбендазолу виводиться з калом у незміненому вигляді та у вигляді метаболітів, близько 1% — з сечею. Резорбований препарат накопичується, головним чином, в печінці і жировій тканині. Близько 40% препарату, що надходить з жовчю в просвіт тонкого кишечника, реабсорбується, що подовжує контакт антигельмінтика з кишковими паразитами. В організмі перетворюється на фенбендазол, оксфендазол та інші метаболіти.

Фенбендазол не чинить ембріотоксичного, тератогенного, сенсibilізуючого впливу, не подразнює шкіру і слизові оболонки, не впливає на перебіг вагітності у тварин.

Застосування

Дегельмінтизація великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, спортивних коней, хутрових звірів (лисиці, песці, нутрії, норки, фретки, декоративні кролики), курей, гусей при ураженні нематодами (зрілими і незрілими формами), деякими видами цестод і трематод.

Дозування

Перед застосуванням препарат змішують з кормом і дають на початку ранкової годівлі індивідуально або груповим методом.

Перед груповою дегельмінтизацією кожен партію препарату попередньо випробовують на невеликій кількості тварин, за якими спостерігають протягом доби. За відсутності ускладнень проводять масову дегельмінтизацію.

При груповому методі загальну дозу препарату збільшують на 5%.

11 0. 03. 2025

Дози для різних видів тварин та курс застосування вказані в таблиці.

Вид тварин і захворювання	Доза, г/10 кг маси тіла	Курс застосування
Велика рогата худоба:		
нематоди дихальних шляхів та травного каналу: <i>Dictyocaulus viviparus</i> , <i>Haemonchus placei</i> , <i>Ostertagia spp.</i> , <i>Nematodirus spp.</i> , <i>Oesophagostomum spp.</i> , <i>Cooperia oncophora</i> , <i>Trichostrongylus spp.</i> , <i>Bunostomum spp.</i> , <i>Chabertia spp.</i> , <i>Strongyloides spp.</i>	2	одноразово
трематоди: <i>Dicrocoelium lanceatum</i>	6,6	одноразово
Дрібна рогата худоба:		
нематоди дихальних шляхів: <i>Dictyocaulus filaria</i> цестоди преімагінальні та імагінальні: <i>Moniezia expansa</i>	2	одноразово
нематоди травного каналу: <i>Trichuris spp.</i>	3	2 доби
трематоди печінки: <i>Dicrocoelium lanceatum</i>	4,4	2 доби
Свині (нематоди травного каналу):		
<i>Ascaris suum</i>	1,5	2 доби
<i>Trichuris suis</i>	2	2 рази на добу
<i>Oesophagostomum dentatum</i> , <i>Strongyloides ransomi</i>	2	одноразово
Поросята віком 2-8 тижнів:		
<i>Ascaris suum</i> , <i>Trichuris suis</i>	0,2	1 раз на тиждень
Свині (маточне поголів'я):		
нематоди: <i>Ascaris suum</i> , <i>Trichuris suis</i> , <i>Oesophagostomum dentatum</i> , <i>Strongyloides ransomi</i>	1,5	2 рази на добу
Спортивні коні (нематоди травного тракту):		
<i>Parascaris equorum</i> , <i>Strongylus spp.</i> , <i>Cyathostomum spp.</i> , <i>Cylicocyclus spp.</i> , <i>Cylicodontophorus spp.</i> , <i>Cylicostephanus spp.</i> , <i>Oxyuris equi</i>	3	одноразово
Лошата віком 1-2 місяці:		
<i>Strongylus spp.</i>	1,6	2 доби
Хутрові звірі (лисиці, песці, нутрії, норки, фретки, декоративні кролики) (нематоди травного каналу):		
<i>Toxocara spp.</i> , <i>Trichuris spp.</i> , <i>Passalurus ambiguus</i>	0,5-0,75	3 доби
Кури (нематоди травного каналу):		

10.03.2025

<i>Ascaridia galli</i>	1 (на птицю)	2 доби
<i>Heterakis gallinarum</i>	2 (на птицю)	одноразово
Гуси (нематоди травного каналу та дихальних шляхів):		
<i>Ganguleterakis dispar</i> , <i>Tetrameres fissispina</i> , <i>Amidostomum anseris</i> , <i>Streptocara crassicauda</i> , <i>Syngamus trachea</i> , <i>Echinuria uncinata</i> , <i>Capillaria</i> <i>spp.</i> , <i>Syngamus trachea</i>	8 (на птицю)	одноразово

Протипоказання

Не застосовувати одночасно з протифасціольозними препаратами, а також впродовж 7 діб після лікування бромсаланами.

Застереження

Побічна дія

При дотриманні терапевтичних доз побічної дії не спостерігають.

Особливі застереження при використанні

Не застосовувати одночасно з протифасціольозними препаратами.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Препарат несумісний з протифасціольозними препаратами.

Період виведення (каренції)

Після останнього застосування препарату забій ВРХ, свиней на м'ясо дозволяється через 13 діб, овець, кіз – 12 діб, курей, гусей – 3 доби. Молоко корів дозволяється вживати в їжу людям через 3 доби, яйця курей – 0 діб. Отримане до зазначеного терміну м'ясо та молоко утилізують або згодовують непродуктивним тваринам залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Полімерні контейнери та полімерні пакети по 10, 100, 1000 г.

Зберігання

У сухому темному, недоступному для дітей місці за температури від 4 до 25 °С.

Термін придатності

3 роки.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна.

Виробник готового продукту

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна.