

МАСТИВЕТ плюс
(суспензія для інтрацистернального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Масляниста суспензія від білого до жовтуватого кольору із специфічним запахом складових компонентів

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини:

амоксациліну тригідрат - 50,0 мг;

преднізолон - 1,0 мг.

Допоміжні речовини: кальцію стеарат, парафін, вазелінове масло.

Фармакологічні властивості

АТС-vet класифікаційний код: QJ51R - антибактерійні ветеринарні препарати для інтрацистернального застосування.

Діючими речовинами препарату є антибіотик амоксацилін та преднізолон. Амоксацилін належить до β -лактамних антибіотиків групи амінопеніцилінів. Він блокує синтез клітинної стінки бактерій, гальмує активність ферментів транспептидази і карбоксипептидази, викликає порушення осмотичного балансу, що призводить до загибелі мікроорганізмів на стадії росту.

Препарат активний проти грампозитивних (*Actinomyces spp.*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Streptococcus spp.*, *Listeria monocytogenes*) та грамнегативних (*Actinobacillus spp.*, *Bordetella bronchiseptica*, *Fusobacterium spp.*, *Haemophilus spp.*, *Moraxella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella spp.*) мікроорганізмів. Нечутливими до препарату є мікроорганізми, такі як: *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia spp.*, індол-позитивний *Proteus* (крім *Proteus mirabilis*), *Enterobacter spp.*, *Citrobacter spp.* та *Acinetobacter spp.*

Преднізолон є дегідрованим аналогом гідрокортизону. Він володіє протизапальною; десенсибілізуючою та антиалергічною дією, а також протишоковими та антитоксичними властивостями. Стимулюючи стероїдні рецептори, він індукує утворення особливого класу білків: ліпокортинів, які володіють протинабряковою активністю, а також знижує активність гіалуронідази та сприяє зниженню проникності капілярів.

Максимальна концентрація амоксациліну спостерігається в сечі (нирках) та жовчі. Концентрація в тканинах стінки кишечника, печінки та нирок становить приблизно 10-30 % від концентрації в сироватці крові, і може бути вища, ніж у шкірі, жирі, селезінці та м'язах. Більша частина амоксациліну виділяється з сечею в незміненому вигляді.

Застосування

Лікування корів, овець та кіз, хворих на субклінічні та клінічні форми маститу бактеріальної етіології, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до амоксациліну.

Дозування

Інтрацистернально у дозі:

- велика рогата худоба - вміст половини чи однієї шприц-туби (5-10 мл препарату), у залежності від тяжкості захворювання, вводять 1 раз на добу в кожную уражену чверть молочної залози, яку попередньо видоюють і дезінфікують;

- вівці, кози - ¼ - ½ вмісту шприц-туби (або 2,5-5 мл препарату), у залежності від тяжкості захворювання, вводять 1-2 рази на добу в кожную уражену чверть молочної залози, яку попередньо видоюють і дезінфікують.

Після введення препарату тваринам: чверть молочної залози масажують для рівномірного розподілу його по всій цистерні.

Тривалість лікування 5-7 діб.

Протипоказання

Підвищена чутливість до пеніцилінів або до інших препаратів β -лактомної групи.

Не застосовувати одночасно з антибіотиками групи цефалоспоринові, тетрациклінів, макролідів.

Застереження

Забій тварин на м'ясо та застосування молока в їжу дозволяється відповідно через 14 та 4 днів після останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо та молоко утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Полімерні шприц-туби по 10 мл.

Вторинна упаковка - картонна коробка.

Зберігання

Сухе, темпе, недоступне для дітей місце окремо від харчових продуктів за температури від 10 °С до 25 °С.

Термін придатності

12 місяців від дати виготовлення, при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, застосування.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ветсинтез»,
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна

Виробник готового продукту:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ветсинтез»,
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна