

ТУРИЛ 2,5%
(розчин для перорального застосування)
листівка-вкладка

Опис

Рідина від безбарвного до коричнювато-жовтого кольору, допускається опалесценція.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

толтразурил - 25 мг.

Допоміжні речовини: триетаноламін, полістиленгліколь.

Фармакологічні властивості

АТСvet QP5I, антипротозойні ветеринарні препарати (QP51AJ01, толтразурил).

Діюча речовина препарату толтразурил (симетричний триазинтріон) — ефективний еймеріостатик.

Толтразурил порушує внутрішньоклітинні стадії розвитку еймерій, впливаючи на меронти, мікрогамети, макрогамети без пошкодження тканини клітин тварини-живителя. Препарат гальмує процес ділення ядер еймерій та блокує активність дихальних ферментів у мітохондрях, що відповідають за метаболізм, виявляє еймеріостатичну дію на слизовій і підслизовій оболонках кишечника.

Після перорального застосування препарату толтразурил повільно абсорбується у травному каналі птиці. В організмі тварин толтразурил частково метаболізується з утворенням сульфоксид-і сульфон-похідних. У подальшому - майже повністю виводиться з фекаліями у позміненному вигляді або у формі толтразурилсульфону або толтразурилсульфоксиду.

Застосування

Лікування курей (курчат-бройлерів, ремонтного молодняку курей), індиків при еймеріозі, спричинюваного еймеріями, чутливими до толтразурилу:

у курчат: *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. tenella*;

у індиків: *Eimeria adenoides*, *E. meleagridis*, *E. meleagrimilis*.

Дозування

Препарат перед застосуванням ретельно змішують з питною водою та випоюють птиці у дозі 1 мл препарату (25 мг толтразурилу) на 1 л питної води впродовж 48 год, або у дозі 3 мл препарату (75 мг толтразурилу) на 1 л питної води при випоюванні впродовж 8 годин на добу дві доби поспіль. Обидві схеми лікування відповідають дозі приблизно 7 мг толтразурилу/кг маси тіла/добу.

У разі появи осаду, розчин перед використанням слід ретельно струсити.

Для ефективного лікування препарат рекомендують застосовувати птиці до появи клінічних ознак захворювання - під час інкубаційного періоду.

Протипоказання

Підвищена чутливість до толтразурилу!

Не застосовують курям-несучкам, яйця яких призначені для використання в їжу людям!

Застереження

Забій птиці на м'ясо дозволяють через 11 діб після останнього застосування препарату. Отримане до зазначеного терміну м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки, прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами. При випадковому потраплянні

препарату на шкіру або в очі негайно промити водою. Під час роботи з препаратом забороняється курити, пити, приймати їжу.

Форма випуску

Флакони з нейтрального скла марки НС-1 НС-2, УСП-1 або полімерні по 100, 200 мл. Контейнери (флакони) полімерні згідно з ТУ У 23455985-001 по 1 л. Каністри полімерні по 5 л.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25 °С. Після першого відбору з флакону, препарат необхідно використати протягом 3 місяців, за умов зберігання в темному місці за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності

24 місяці від дати виготовлення.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Товариство з обмеженою відповідальністю «Встсинтез»
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна

Виробник готового продукту

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ветсиитез»
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна