

11.07.2025

**Бровалевамизол 8%**  
**(розчин для ін'єкцій)**  
листівка-вкладка

**Опис**

Безбарвний прозорий розчин, без механічних включень, зі слабким специфічним запахом.

**Склад**

1 мл препарату містить діючу речовину (мг):

левамізолу гідрохлорид – 80,0.

Допоміжні речовини: трилон Б, натрію метабісульфіт, кислота лимонна, натрію гідроксид, пропіленгліколь, метилпарабен, пропілпарабен, вода високоочищена.

**Фармакологічні властивості**

**АТСvet класифікаційний код: QP52 – Антигельмінтні ветеринарні препарати. QP52AE01 – Левамизол.**

Левамізолу гідрохлорид – синтетична сполука із групи імідазотіазолів. Гальмує фермент основного обміну фумаратредуктазу і утворення АТФ, паралізує нервові вузли, спричиняє параліч та загибель нематод у перші 12-24 години після введення. Діє проти *Ascaris*, *Enterobius*, *Trichocephalus trichiurus*, *Ancylostoma duodenale*, *Necator americanus*, *Strongyloides stercoralis*.

Левамізолу гідрохлорид впливає на імунну систему: підвищує вироблення антитіл до різних антигенів, посилює імунну відповідь, активує Т-лімфоцити й стимулює їхню проліферацію, підвищує здатність моноцитів, макрофагів та нейтрофілів до хемотаксису, адгезії та фагоцитозу.

Після парентерального введення левамизолу гідрохлорид швидко резорбується з місця ін'єкції та розподіляється в органах і тканинах. Максимальної концентрації у сироватці крові досягає через 30-50 хвилин, на терапевтичному рівні зберігається протягом 6-9 годин. Метаболізується у печінці з утворенням неактивних метаболітів (оксимеркаптоетилфеніл-імідазолідину, який має імуностимулюючу дію). З організму виводиться протягом 3-4 діб переважно нирками (95%), частково з фекаліями (у незміненому вигляді), у лактуючих тварин – з молоком. Період напіввиведення становить 3-4 години, за порушень функцій печінки цей час може збільшуватись.

За ступенем впливу на організм належить до помірно небезпечних речовин. У рекомендованих дозах добре переноситься тваринами, не чинить місцево-подразнювальної, ембріотоксичної, тератогенної, мутагенної і сенсibiliзуючої дії.

**Застосування**

Профілактика і лікування великої рогатої худоби, овець, свиней і птиці за захворювань спричинених:

**велика рогата худоба, вівці** – нематодами травного каналу та дихальних шляхів: *Trichostrongylus colubriformis*, *T. axei*, *Ostertagia circumcincta*, *Haemonchus contortus*, *Nematodirus spathiger*, *Oesophagostomum venulosum*, *O. columbianum*, *O. radiatum*, *Bunostomum trigonocephalus*, *Trichuris skrjabini*, *T. ovis*, *T. globulosa*, *Strongyloides papillosus*, *Dictyocaulus filaria*, *D. viviparus*, *Muellerius capillaris*, *Protostrongylus kochi*, *Neoascaris vitulorum* тощо;

**свині** – нематодами травного каналу та дихальних шляхів: *Ascaris suum*, *Trichuris suis*, *Oesophagostomum dentatum*, *Metastrongylus elongatus*, *M. pudendotectus*, *M. salmi*, *M. pulmonalis*, *M. tschiae*, *Ollulanus tricuspis*, *O. suis*, *Strongyloides ransomi*;

**птиця (кури, гуси, індики, голуби)** – нематодами видів: *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinarum*, *Capillaria spp.*, *Trichostrongylus spp.*

**Дозування**

- **велика рогата худоба** – 1 мл на 10 кг маси тіла, але не більше 30 мл одній тварині, підшкірно (нижня середина шиї) або внутрішньом'язово (ділянка ліктьового м'яза); дозу понад 15 мл ділять на дві частини і вводять у різні місця;

- **свині** – 1 мл на 10 кг маси тіла при масі тварини до 150 кг, на кожні наступні 50 кг додають 2,5 мл, підшкірно (ділянка колінної складки або за вухом) або внутрішньом'язово; дозу понад 10 мл ділять на дві частини і вводять з двох сторін;

11.07.2025

- *вівці* – 1 мл на 10 кг маси тіла, при масі тварини понад 50 кг – 6 мл, підшкірно, одноразово;
- *птиця* – 3-4 мл на 10 кг маси тіла, перорально з водою, одноразово або дозу ділять на 3-4 доби;
- *голуби* – 1 мл на 200 мл води, розчин дають замість води 3-5 діб.

#### **Протипоказання**

Не застосовувати тваринам і птиці, молоко або яйця яких призначені для споживання людьми!

Не використовувати хворим і виснаженим тваринам, самкам в останню третину вагітності, племінним плідникам у парувальний період і курям-несучкам.

Не застосовувати одночасно з пірантелом, морантелом, фосфорорганічними препаратами, неостигміном.

#### **Застереження**

##### *Побічна дія*

Побічні ефекти виникають при значному передозуванні препарату. У великої рогатої худоби з'являється піна навколо рота або гіперсалівація. Таке стається після введення препарату у великих дозах або за одночасного застосування з фосфорорганічними речовинами. Ці симптоми, як правило, зникають через 2 години, а незначна припухлість — через декілька діб.

У овець може спостерігатися тимчасове збудження, у свиней — салівація та піна навколо рота, а при ураженні легеневиими нематодами — кашель та блювання.

##### *Особливі застереження при використанні*

Не застосовувати одночасно з пірантелом, морантелом, фосфорорганічними препаратами, неостигміном!

##### *Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії*

За одночасного застосування з препаратами нікотиноподібної дії (пірантел, морантел, диетилкарбамазин) та інгібіторами холінестерази (фосфорорганічні препарати, неостигмін) токсичний ефект Бровалевамізолу 8% може посилюватися.

Препарат може посилювати імунну реакцію і ефективність вакцин проти бруцельозу.

Одночасне застосування препарату з хлорамфеніколом може призвести до загибелі тварин.

##### *Період виведення (каренції)*

Після останнього застосування препарату забій ВРХ, овець, свиней та птиці на м'ясо дозволяється через 8 діб.

М'ясо, отримане раніше вказаного терміну, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини використовують тільки для годування м'ясоїдних тварин або виготовлення м'ясо-кісткового борошна.

#### **Форма випуску**

Скляні флакони по 10, 20, 50 та 100 мл із гумовими пробками та алюмінієвою обкаткою.

#### **Зберігання**

У сухому темному, недоступному для дітей місці за температури від 1 до 25 °С.

#### **Термін придатності**

3 роки.

***Для застосування у ветеринарній медицині!***

**Власник реєстраційного посвідчення та виробник:**

ТОВ "БРОВАФАРМА"

б-р Незалежності, 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400, Україна