

АНТИ ЗУД спрей
(спрей для зовнішнього застосування, розчин)
листівка-вкладка

Опис

Розчин від безбарвного до жовтого кольору з легкою опалесценцією, зі специфічним запахом складників, допускається незначний осад.

Склад

1 мл препарату містить діючі речовини (мг):

тріамцінолон -0.5;

хлорамфенікол - 5,0;

метронідазол -Ю,0;

лідокану гідрохлорид- 50,0.

Допоміжні речовини: спирт ізопропіловий, диметилсульфоксид, екстракт календули водно- спиртовий 0.4%, ароматизатор м'яти, поліетиленгліколь.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код: QD07CB Глюкокортикостероїди помірноактивні у комбінації з антибіотиками (QD07CB01 Тріамцінолон та антибіотики), QD04AB Протисвербіжні місцевоанестезуючі ветеринарні препарати для локального застосування (QD04AB01 Лідокан).

Протизапальна, антиалергічна, знеболююча та бактерицидна дія препарату зумовлена властивостями компонентів, що входять до його складу.

Глюкокортикоїд *тріамцінолон* має виражену протизапальну, протиалергічну та десенсибілізуючу дію. Механізм його дії полягає в блокуванні вивільнення еозинофілами медіаторів запалення, у тому числі простагландинів, що потенціюють запальний процес, зменшенні кількості тучних клітин, що виробляють гіалуронову кислоту, зниженні проникності капілярів.

Лідокан чинить місцевоанестезуючу дію, сприяє швидшому зняттю запальної і алергічної реакції.

Хлорамфенікол і *метронідазол* мають бактерицидну дію та впливають на більшість грампозитивних і грамнегативних бактерій а також грибову інфекцію.

Екстракт календули має бактерицидні і протизапальні властивості, прискорює регенерацію тканин і загоєння ран.

Комплекс діючих речовин, що входять до складу спрею, сприяє ефективному лікуванню запальних та алергічних реакцій шкіри, а також отитів у собак і котів.

Препарат в рекомендованих дозах не чинить місцевоподразнюючої, алергізуючої і сенсibilізуючої дії.

Застосування

Препарат застосовують котам та собакам для лікування отитів, за гострого та хронічного перебігу, дерматитів алергічної або запальної етіології, які ускладнені первинною або вторинною бактеріальною інфекцією: кропив'янка, атопічний дерматит, екзема, дифузний нейродерміт, алопеція, розчухи, реакції на укуси комах або інших паразитів.

Дозування

Препарат застосовують зовнішньо.

За лікування дерматитів у котів та собак спрей наносять тонким шаром на уражені поверхні, після попередньої санітарної обробки, 2 рази на добу протягом 5-10 діб до клінічного одужання.

Перед застосуванням флакон із препаратом збовтують протягом 20-30 секунд і, тримаючи його вертикально, натискають на розпилювальну голівку, направляючи розпилювач на уражену поверхню тіла тварини з відстані 10-15 см.

За лікування отитів у котів та собак зовнішній слуховий прохід очищають від струпів і кірочок, ретельно втирають. Перед застосуванням флакон із препаратом ретельно збовтують протягом 20-30 секунд і, тримаючи його вертикально, натискають на розпилювальну голівку, направляючи розпилювач у вушну раковину, домагаючись рівномірного її зволоження. Потім

вушну раковину складають навпіл і масажують її основу. Обробку проводять 2-3 рази на добу протягом 5-7 діб. Курс лікування може бути подовжений за призначенням лікаря ветеринарної медицини.

Не рекомендується пропускати чергову обробку препаратом, що може призвести до зниження

ефективності лікування.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість тварини до будь-якого з компонентів препарату (у тому числі в анамнезі).

Не застосовувати препарат вагітним та лактуючим тваринам, цуценятам та кошенятам до 8- тижневого віку, тваринам за діабету, вірусних захворювань.

Не застосовувати одночасно з іншими препаратами для зовнішнього застосування, що містять кортикостероїдні гормони.

Застереження

Побічна дія

У окремих тварин, за підвищеної індивідуальної чутливості до компонентів препарату, можливе виникнення пригнічення, слинотечі, розладу функцій травного каналу.

За появи таких симптомів застосування препарату припиняють та призначають симптоматичну терапію, за необхідності.

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Препарат сумісний з іншими лікарськими препаратами і кормовими добавками.

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Уникати вдихання препарату та потрапляння на слизові оболонки.

Форма випуску

Флакони полімерні з механічними розпилювальними голівками по 30, 50 або 100 мл, вкладені у картонні коробки по 1 шт.

Зберігання

В тарі виробника, окремо від харчових продуктів і кормів, в сухому, захищеному від світла та вологи, недоступному для дітей місці за температури від 5 до 25 °С.

Термін придатності

2 роки.

Власник реєстраційного посвідчення

Товариство з обмеженою відповідальністю “Ветсинтез”
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна

Виробник готового продукту:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Ветсинтез”
61001, м. Харків, вул. Смольна, 30, Україна