

**ВЕТОФЛОК краплі очні та вушні
(краплі очні, вушні, розчин)**

листівка-вкладка

Опис

Прозорий розчин від безбарвного до світло-жовтого або світло жовто-зеленого кольору зі специфічним запахом складових

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

офлоксацин – 3,0 мг.

Допоміжні речовини: бензалконію хлорид, натрію тіосульфат, трилон Б, натрію хлорид, гідроксипропілметилцелюлоза, кислота хлористоводнева, натрію гідроксид, вода для ін'єкцій.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QS03- ветеринарні препарати, які застосовують в офтальмології та отології. QSO3AA – антибактеріальні препарати.

Офлоксацин – антибіотик групи фторхінолонів, що активний проти грамнегативних мікроорганізмів (*Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Proteus spp.*, *Shigella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Enterobacter spp.*, *Camphylobacter spp.*, *Yersinia spp.*, *Pseudomonas aeruginosa.*, *Vibrio spp.*, *Aeromonas spp.*, *Haemophilus spp.*, *Serratia spp.*, *Chlamydia spp.*) та грампозитивних мікроорганізмів (*Staphylococcus spp.* (включаючи пеніциліназо-продуктуючі та метицилін-стійкі штами), *Streptococcus spp.*). Помірно чутливі до офлоксацину *Enterococcus faecalis*, *Pseudomonas spp.*, *Streptococcus pneumoniae*. До препарату також чутливі: *Brucella spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Mycobacterium spp.*

Механізм дії офлоксацину полягає в інгібуванні бактеріальної ДНК-гірази (топоізомерази II), що зупиняє процес спіралізації та синтез ДНК.

Значною перевагою офлоксацину порівняно з іншими антибіотиками місцевої дії є його висока проникність до рогівки і передньої камери ока. З усіх фторхінолонів офлоксацин має найкращу здатність до проникнення у рогівку і передню камеру ока, його ефективна концентрація у сльозовій плівці зберігається навіть через 4 години (240 хвилин) після застосування та його МІС₉₀ становить вище 2 мкг/мл для загального спектра чутливих до офлоксацину збудників. Системна реабсорбція після місцевого введення у кон'юнктивальний мішок є незначною і не має клінічного значення.

Закапування офлоксацину у вухо в разі інтактної барабанної перетинки супроводжується мінімальним поглинанням в середньому вусі. Однак, поглинання офлоксацину збільшується при перфораціях барабанної перетинки. Після закапування офлоксацину дорослим тваринам при перфорації барабанної перетинки максимальна концентрація в сироватці крові становить 10 нг/мл.

При місцевому застосуванні офлоксацину терапевтична концентрація досягається в тканинах ока через 30-60 хвилин.

Після одноразового закапування в око препарату, концентрація офлоксацину у сироватці крові після 10 діб була у 1000 разів меншою за концентрацію після перорального застосування.

Застосування

Лікування собак та котів за гострих та хронічних інфекційних захворювань очей та вух, що спричинені мікроорганізмами, чутливими до офлоксацину.

Дозування

Зовнішньо.

За захворювань очей препарат кімнатної температури закапують у кон'юнктивальний мішок перші 2 дні по 1-2 краплі кожні 2–4 години, потім – 4 рази на добу.

За захворювань вух препарат кімнатної температури закапують у слуховий прохід по 1-4 краплі (залежно від маси тварини) 2-4 рази на добу.

Лікування повинне тривати до повного зникнення симптомів та додатково ще 2-3 доби.

Курс лікування до повного одужання становить 5-10 діб.

Не слід торкатися кінчиком наконечника крапельниці до будь-якої поверхні, щоб уникнути забруднення вмісту флакона.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату (у тому числі в анамнезі).

Не застосовувати одночасно з тетрациклінами, макролідами, лінкозамідами, циклоспорином, циклоспоринами, хлорамфеніколом.

Під час лікування препаратом слід уникати надмірної дії сонячних променів або ультрафіолетового випромінювання.

Не застосовувати при вірусних та мікозних ураженнях очей і вух.

Не застосовувати під час вакцинації.

Не застосовувати одночасно з теофіліном і нестероїдними протизапальними засобами, а також з препаратами, що містять катіони магнію, алюмінію і кальцію, які, зв'язуючись з офлоксацином, перешкоджають його абсорбції.

Не застосовувати при виявленні резистентних штамів збудників.

Застереження

Побічна дія

Після закапування очей можливі місцеві ознаки дискомфорту, подразнення, свербіння, слъзовиділення, які швидко проходять, зрідка - алергічні реакції.

Особливі застереження при використанні

Відповідно до клінічної практики застосування препарату має ґрунтуватись на визначенні чутливості виділеного мікроорганізму-збудника до офлоксацину. Тваринам віком до 7 днів та вагітним тваринам застосовують препарат тільки від контролем лікаря ветеринарної медицини.

Застосування під час вагітності, лактації

Використання препарату у період вагітності чи лактації повинно ґрунтуватись на оцінці користі/ризиків відповідальним лікарем ветеринарної медицини в кожному конкретному випадку.

Форма випуску

Флакони полімерні або скляні з кришкою крапельницею по 10 мл запаковані у картонні коробки.

Зберігання

Зберігають препарат у сухому темному, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 5 до 25 °С.

Після першого використання препарат зберігати з щільно закритою кришкою в холодильнику за температури 4-8 °С.

Термін придатності

3 роки від дати виготовлення.

Після першого відбору з флакону, препарат необхідно використати протягом 30 діб.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

Україна, 61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30

Виробник готового продукту

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"

Україна, 61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30