

12.07.2021

Бровамаст С
(суспензія інтрацистернальна)
листівка-вкладка

Опис

Суспензія білого або злегка жовтуватого кольору.

Склад

5 г препарату (1 доза) містять діючу речовину:

клоксациліну бензатину – 600 мг.

Допоміжні речовини: емульгатор Т-2, пропіленгліколь, арквад 50, пропілпарабен, метилпарабен, вода високоочищена.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код: QJ51 – антибактерійні ветеринарні препарати для інтрамамарного застосування. QJ51CF02 Клоксацилін.

Клоксациліну бензатин – це синтетична сполука, похідне з групи ізоксазолів пеніциліну. Препарат діє бактерицидно, перешкоджає синтезу зовнішньої оболонки клітинної мембрани мікроорганізму. Має широкий спектр антибактеріальної дії, активний відносно грампозитивних бактерій, які зазвичай виділяються з секрету вимені в сухостійних період. Спектр дії поширюється на грампозитивні (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Str. uberis*, *Str. dysgalactiae*, *Corinebacterium pyogenes*, *Clostridium perfringens*, *Cl. pseudotuberculosis*, *Bacillus anthracis*) і деякі грамнегативні бактерії (*Neisseria spp.*).

В організмі тварини клоксацилін швидко всмоктується і розподіляється по всьому організму. Він добре проникає в тканини і рідини організму (синовіальна, плевральна, перикардіальна, жовч), де швидко досягає терапевтичної концентрації. Клоксацилін швидко виводиться з організму, переважно нирками шляхом клубочкової фільтрації і канальцевої секреції. Період напіввиведення короткий (30-90 хв), концентрація в сечі – висока.

Бровамаст С створює високий рівень антибіотика в тканинах вимені і не чинить подразнюючої дії. Завдяки комбінованій дії малорозчинної бензатинової солі клоксациліну високого ступеня дисперсності та спеціальної основи пролонгованої дії, терапевтичний вплив лікарського засобу у сухостійних корів триває не менше 7 тижнів.

По ступеню дії на організм препарат відноситься до помірно небезпечних (3 клас токсичності згідно ГОСТ 12.1.007).

Застосування

Лікування корів в сухостійний період хворих на субклінічні та клінічні форми маститів та для профілактики можливих інфекцій в період сухостою.

Дозування

Бровамаст С застосовують одноразово після останнього видоювання перед переводом корів в сухостійний період, але не пізніше 42 діб до передбачуваного отелу.

З профілактичною метою в кожную долю вимені вводять по 5 г препарату. Перед введенням із кожної чверті вимені слід виділити залишки молока, вимити дійки та провести їх асептичну обробку. Вміст флакона (туби) підігрівають до температури тіла та збовтують до отримання однорідної суміші. Безпосередньо із шприц-туби (або за допомогою молочного катетера і шприца відповідного розміру) препарат повільно вводять інтрацистернально. Відразу ж після цього, проводять легкий масаж дійки знизу до верху, витискаючи препарат із цистерни дійки в молочну цистерну вимені.

Протипоказання

Не застосовувати лактуючим коровам. Не застосовувати коровам, яким до отелення залишилося менше 28 діб. Не застосовувати тваринам, у яких є гіперчутливість до діючої речовини.

Застереження

Споживання м'яса в їжу дозволяється через 28 діб після останнього введення препарату. До зазначеного терміну м'ясо згодовують непродуктивним тваринам або утилізують (залежно від висновку ветлікаря). Молоко для вживання в їжу людям придатне через 96 годин після отелу. Якщо отел відбувся раніше, ніж через 28 діб після введення препарату, то молоко потрібно вживати в їжу.

12.07.2021

у будь-якому випадку через 28 діб та 96 годин після лікування.

Форма випуску

Шприц-туби по 5, 10, 20 г, скляні флакони по 40, 50, 100 г.

Зберігання

Сухе, темне, недоступне для дітей місце за температури від 4 °С до 20 °С.

Термін придатності

18 місяців.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення та виробник готового продукту:

ТОВ «БРОВАФАРМА»

б-р Незалежності 18-а, м. Бровари, Київська обл., 07400

КОНТРОЛЬОВАНИЙ
ПРИМІРНИК № 1