

АМОКСИВЕТ 15% П.Д.
(суспензія для ін'єкцій)
листівка-вкладка

Опис

Масляниста суспензія білого кольору. Суспензія при зберіганні розшаровується.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

амоксацилін (у формі амоксациліну тригідрату) - 150,0 мг

Допоміжні речовини: бутилгідрокситолуол, натрію карбоксиметилцелюлоза, хлорбутанол гемігідрат, полісорбат 80, спирт бензиловий, тригліцериди середнього ланцюга (Мігліол 812 N), вода для ін'єкцій.

Фармакологічні властивості

АТС vet класифікаційний код QJ01 - антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01CA04 - Амоксацилін.

Амоксацилін належить до групи Р-лактамних антибіотиків. Він блокує синтез клітинних стінок бактерій, гальмує активність ферментів транспептидази і карбоксипептидази, викликає порушення осмотичного балансу, що призводить до загибелі мікроорганізмів на стадії розвитку.

Амоксацилін активний щодо грампозитивних (*Actinomyces spp.*, *Bacillus anthracis*, *Clostridium spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Streptococcus spp.*, *Listeria monocytogenes*) та грам негативних (*Actinobacillus spp.*, *Bordete lla bronchiseptica*, *Fusobacterium spp.*, *Haemophilus spp.*, *Moraxella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus mirabilis*, *Salmonella spp.*) мікроорганізмів. Нечутливими до амоксациліну є такі мікроорганізми як: *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia spp.*, індол-позитивний *Proteus* (крім *Proteus mirabilis*), *Enterobacter spp.*, *Citrobacter spp.* та *Acinetobacter spp.*

Амоксацилін, після внутрішньом'язового введення, швидко всмоктується у кров з місця ін'єкції та розподіляється в більшості тканин та рідин організму, підтримуючи терапевтичну концентрацію тривалий час (48-72 години), внаслідок чого концентрація амоксациліну в тканинах перевищує концентрацію інших антибіотиків його групи. Максимальна концентрація амоксациліну в плазмі крові досягається протягом 2-3 годин після введення та зберігається на терапевтичному рівні протягом 48 годин. Швидкому розподілу амоксациліну в тканинах сприяє його низький ступінь зв'язування з білками плазми крові. При запаленнях мозкових оболонок концентрація амоксациліну у цереброспинальній рідині може доходити до 30-60% від концентрації його у сироватці крові. Період напіввиведення амоксациліну у жуйних тварин становить 90 хвилин.

Виводиться амоксацилін переважно нирками у незміненому вигляді шляхом канальцевої секреції, але незначна частина метаболізується шляхом гідролізу до неактивної пеніцилінової кислоти та виводиться із сечею.

Застосування

Лікування великої рогатої худоби та свиней за захворювань травного каналу (гастрити, ентерити, перитоніти), органів дихання (тонзиліти, трахеїти, пневмонія, бронхіти, риніти, синусити, бронхопневмонія) та сечостатевої системи (цистити, метрити, мастити), шкіри (дерматити), що спричинені мікроорганізмами, чутливими до амоксациліну.

Дозування

Внутрішньом'язово у дозах:

велика рогата худоба - 1,0 мл препарату на 10 кг маси тіла тварини (15 мг амоксациліну на 1 кг маси тіла);

свині - 1,0 мл препарату на 10 кг маси тіла тварини (15 мг амоксациліну на 1 кг маси тіла).

з 1.10.2025

За необхідності ін'єкцію можна повторити з інтервалом 48 годин. Перед застосуванням препарат необхідно ретельно струсити. Якщо доза ін'єкції перевищує 20 мл, її розділяють і вводять у різні ділянки тіла.

Протипоказання

Підвищена чутливість до пеніцилінів або до інших препаратів р-лактамної групи.

Не застосовувати кролям, мурчакам, хом'якам та дрібним трав'яїдним тваринам.

Не застосовувати тваринам із порушеною функцією нирок.

Не застосовувати одночасно з антибіотиками групи цефалоспоринових, тетрациклінових, макролідів.

Не застосовувати внутрішньовенно!

Застереження

Побічна дія

У результаті застосування препарату можуть спостерігати місцеву реакцію у вигляді набряку, який зникає після припинення лікування.

В окремих випадках можливі алергічні явища (висипання на шкірі, свербіж та набряки, тромбоцитопенія, лейкопенія, анемія, анафілактичний шок).

Особливі застереження при використанні

Застосування препарату повинно базуватись на визначенні чутливості збудників до амоксициліну. За відсутності даних про чутливість збудника/збудників до амоксициліну, застосування препарату повинно ґрунтуватись на регіональній епізоотичній ситуації щодо антимікробної чутливості.

Тривале застосування препарату може привести до появи резистентних штамів мікроорганізмів до р-лактамних антибіотиків.

Перед використанням ретельно струшують флакон з препаратом. Застосовувати тільки сухі, стерильні шприци та голки..

Застосування під час вагітності, лактації

Під час дослідження на лабораторних тваринах не було виявлено тератогенного, ембріотоксичного чи матернотоксичного впливу амоксициліну на організм матері чи плода.

Однак нешкідливість застосування амоксициліну для цільових видів тварин під час вагітності не досліджували. Застосування препарату вагітним тваринам повинно залежати від оцінки співвідношення ризик/користь лікарем ветеринарної медицини.

Період виведення (каренції)

Забій тварин на м'ясо дозволяють через 28 діб (велика рогата худоба) та 20 діб (свині) після останнього застосування препарату. Споживання молока в їжу людям дозволяють через 3 доби після останнього введення препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо та молоко утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.

Форма випуску

Флакони з нейтрального скла марки НС-1, НС-2, УСП-1 закриті гумовими корками під алюмінієву обкатку по 10; 20; 50 та 100 мл. Вторинна упаковка - картонна коробка.

Зберігання

Сухе темне, недоступне для дітей місце за температури від 10 до 25 °С.

Термін придатності - 2 роки.

Після першого відбору з флакону, препарат необхідно використати протягом 28 діб, за умов зберігання в темному місці за температури від 0 до 5 °С.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення АВ-01011-01-10
31.10.2025

Власник реєстраційного посвідчення:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"
61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30, Україна

Виробник готового продукту:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ветсинтез"
61001, м. Харків, вул. Бобанича Тараса, 30, Україна