

ДОРАН																				
Розчин для ін'єкцій																				
ОПИС	Прозорий від світло-жовтого до жовтого кольору розчин для ін'єкцій.																			
СКЛАД	1 мл препарату містить діючу речовину: дорамектин - 10,0 мг. Допоміжні речовини: бензиловий спирт, етилолеат, бутилгідроксисанізол, бавовняна олія.																			
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	ATCvet QP54, ендектоциди (QP54AA03, дорамектин) ДОРАН – готовий до використання стерильний розчин, що містить діючу речовину дорамектин (10 мг/мл). Дорамектин – речовина групи авермектинів, має широкий спектр системної нематоцидної, інсектицидної та акарицидної дії, володіє ларвоцидними та овоцидними властивостями. Модулює активність іонів хлору нервовій системі та м'язах нематод і членистоногих. Зв'язуючись зі специфічними рецепторами, збільшує проникність синаптичних мембран для іонів хлору, що призводить до блокади активності нервових та м'язових клітин нематод і членистоногих, що спричиняє параліч і загибель паразитів. У ссавців ці рецептори локалізовані лише у центральній нервовій системі, а дорамектин не проникає через гематоенцефалічний бар'єр, і тому у рекомендованих дозах є безпечним для ссавців. Препарат у рекомендованих дозах немає мутагенної, тератогенної та ембріотоксичної дії. ДОРАН легко резорбується з місця введення, має високу ефективність і не виявляє негативного впливу на організм тварин. Фармакокінетичні властивості дорамектину забезпечують тривале збереження терапевтичних концентрацій препарату у крові тварин і захист їх від паразитарних захворювань та реінвазії протягом тривалого часу.																			
ЗАСТОСУВАННЯ	Лікування та профілактика захворювань великої рогатої худоби, овець, свиней, що спричинені нематодами та ектопаразитами: Велика рогата худоба: нематодами травного каналу (статевозрілі та личинки 4-ї стадії): <i>Ostertagia ostertagi</i>, <i>O. lyrata</i>*, <i>Haemonchus placei</i>, <i>Nematodirus helvanticus</i> <i>Trichostrongylus axei</i>, <i>T.colubriformis</i>, <i>Cooperia oncophora</i>, <i>C.pectinata</i>, <i>C.punctata</i>, <i>C.surnabada</i> (syn. <i>mcmasteri</i>), <i>Nematodirus spathiger</i>*, <i>Bunostomum phlebotomum</i>, <i>Strongyloides papillosus</i>, <i>Oesophagostomum radiatum</i>, <i>Trichuris spp</i>* * <i>cmateвозрілі</i> легеневими гельмінтами (статевозрілі): <i>Dictyocaulus viviparus</i>; очиними гельмінтами (статевозрілі): <i>Thelazia spp.</i>; личинками підшкірного овода (паразитичні стадії): <i>Hypoderma bovis</i>, <i>H.lineatum</i>; вошами: <i>Haematopinus eurysternus</i>, <i>Linognathus vituli</i>, <i>Solenopotes capillatus</i>, <i>Damalinia bovis</i>; коростяними кліщами: <i>Psoroptes bovis</i>, <i>Sarcoptes bovis</i> (<i>scabiei</i>). <i>Chorioptes bovis</i>. Також застосовується для лікування та профілактики захворювань, спричинених гельмінтами шлунково-кишкового тракту <i>Nematodirus helvetianus</i>, вошами <i>Damalinia bovis</i> та коростяними кліщами <i>Chorioptes bovis</i>. Препарат запобігає реінвазії великої рогатої худоби від: <table><tr><td><i>Ostertagia ostertagi</i></td><td>35 діб</td></tr><tr><td><i>Cooperia oncophora</i></td><td>21 добу</td></tr><tr><td><i>Dictyocaulus viviparus</i></td><td>35 діб</td></tr><tr><td><i>Bunostomum phlebotomum</i></td><td>22 доби</td></tr><tr><td><i>Oesophagostomum radiatum</i></td><td>21 добу</td></tr><tr><td><i>Trichostrongylus axei</i></td><td>28 діб</td></tr><tr><td><i>Linognathus vituli</i></td><td>28 діб</td></tr><tr><td><i>Psoroptes bovis</i></td><td>42 доби</td></tr><tr><td><i>Haemonchus placei</i></td><td>28 діб</td></tr></table>		<i>Ostertagia ostertagi</i>	35 діб	<i>Cooperia oncophora</i>	21 добу	<i>Dictyocaulus viviparus</i>	35 діб	<i>Bunostomum phlebotomum</i>	22 доби	<i>Oesophagostomum radiatum</i>	21 добу	<i>Trichostrongylus axei</i>	28 діб	<i>Linognathus vituli</i>	28 діб	<i>Psoroptes bovis</i>	42 доби	<i>Haemonchus placei</i>	28 діб
<i>Ostertagia ostertagi</i>	35 діб																			
<i>Cooperia oncophora</i>	21 добу																			
<i>Dictyocaulus viviparus</i>	35 діб																			
<i>Bunostomum phlebotomum</i>	22 доби																			
<i>Oesophagostomum radiatum</i>	21 добу																			
<i>Trichostrongylus axei</i>	28 діб																			
<i>Linognathus vituli</i>	28 діб																			
<i>Psoroptes bovis</i>	42 доби																			
<i>Haemonchus placei</i>	28 діб																			
Для профілактики паразитозів рекомендується обробляти поголів'я тварин препаратом ДОРАН при переводі на пасовища і вдруге через 8 тижнів.																				
Вівці: нематоди травного каналу (статевозрілі і личинки 4-ї стадії): <i>Chabertia ovina</i> (статевозріла стадія), <i>Cooperia curticei</i> (стадія L4), <i>C. oncophora</i>, <i>Gaigeria pachyscelis</i>, <i>Haemonchus contortus</i>, <i>Nematodirus battus</i> (стадія L4)¹, <i>Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta</i>*, <i>Oesophagostomum columbianum</i>, <i>Strongyloides papillosus</i>, <i>Trichostrongylus axei</i>, <i>Trichostrongylus colubriformis</i>, <i>Trichostrongylus vitrinus</i>, <i>Trichuris spp.</i> (статевозріла стадія)																				

ЗАСТОСУВАННЯ	*ефективно діє на личинкові стадії L₄, навіть на ті, що природно нечутливі до препаратів похідних бензimidазолу. ¹для ефективного лікування та профілактики тварин проти дорослих та личинкових стадій L₄ <i>Nematodirus battus</i> рекомендовано застосовувати дозу 300 мкг/кг маси тіла; коростяними кліщами: <i>Psoroptes ovis</i>; легеневими гельмінтами: <i>Dictyocaulus filaria (статевозрілі)</i>; личинки овода носової порожнини (паразитичні стадії): <i>Oestrus ovis</i>. Свині: Нематодами травного каналу (статевозрілі та личинки 4-ї стадії): <i>Hyostrongylus rubidus</i>, <i>Ascaris suum</i>, <i>Strongyloides ransomi</i>, <i>Oesophagostomum dentatum</i>, <i>Oesophagostomum quadrispinulatum</i>, легеневими гельмінтами: <i>Metastrongylus spp.</i> (тільки статевозріла стадія); нирковими гельмінтами: <i>Stephanurus dentatus</i> (тільки статевозріла стадія); вошами: <i>Haematopinus suis</i>, коростяними кліщами: <i>Sarcoptes suis</i>. ДОРАН 1% захищає свиней від інвазії або реінвазії кліщами <i>Sarcoptes scabiei</i> протягом 18діб.												
ДОЗУВАННЯ	Рекомендовані дози препарату ДОРАН: Велика рогата худоба: 1 мл/50 кг маси тіла (еквівалентно 200 мкг /кг), одноразово підшкірно в ділянку шиї. Вівці: 1 мл/на 50 кг маси тіла (еквівалентно 200 мкг/кг), одноразово внутрішньом'язово; при захворюваннях, викликаних <i>Psoroptes ovis</i> (овеча короста) та <i>Nematodirus battus</i> (статевозріла стадія) – 1 мл/33 кг маси тіла (еквівалентно 300 мкг/кг), одноразово внутрішньом'язово. Свині: 1 мл/33 кг маси тіла або 0,3 мл/10 кг маси тіла (еквівалентно 300 мкг/кг), одноразово внутрішньом'язово. Поросята масою тіла до 16 кг і менше (таблиця) : <table border="1" data-bbox="293 710 979 888"> <thead> <tr> <th>Маса тіла поросят, кг</th><th>Доза, мл</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><4</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>5-7</td><td>0,2</td></tr> <tr> <td>8-10</td><td>0,3</td></tr> <tr> <td>11-13</td><td>0,4</td></tr> <tr> <td>14-16</td><td>0,5</td></tr> </tbody> </table> Максимальний об'єм ін'єкції для кожного виду: Велика рогата худоба: 5 мл в одне місце ін'єкції; Вівці: 1,5 мл в одне місце ін'єкції; Свині: 2,5 мл в одне місце ін'єкції.	Маса тіла поросят, кг	Доза, мл	<4	0,1	5-7	0,2	8-10	0,3	11-13	0,4	14-16	0,5
Маса тіла поросят, кг	Доза, мл												
<4	0,1												
5-7	0,2												
8-10	0,3												
11-13	0,4												
14-16	0,5												
ПРОТИПОКАЗАННЯ	Підвищена чутливість до складових препарату. Не можна застосовувати препарат самкам під час лактації, якщо молоко застосовується в їжу людям! Не можна застосовувати препарат тільким коровам і телицям за 60 днів до отелення!												
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	Побічна дія Побічні явища не були встановлені, якщо ветеринарний препарат застосовувався в рекомендованих дозах і згідно з інструкцією. Використання під час вагітності, лактації Не можна застосовувати препарат самкам під час лактації, якщо молоко застосовується в їжу людям! Не можна застосовувати препарат тільким коровам і телицям за 60 днів до отелення! Особливі застереження при використанні Максимальний об'єм ін'єкції для кожного виду: Велика рогата худоба: 5 мл в одне місце ін'єкції; Вівці: 1,5 мл в одне місце ін'єкції; Свині: 2,5 мл в одне місце ін'єкції. Період виведення (каренції) Забій тварин на м'ясо дозволяється після останнього введення препарату: великої рогатої худоби та овець – через 70 днів, свиней – через 77 днів. Отримане до зазначеного терміну м'ясо утилізується або згодовується непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини. Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання в їжу людям. При вимушеному забої тварин м'ясо використовують для годівлі м'ясоїдних тварин.												
ФОРМА ВИПУСКУ	Флакони зі скла брунатного кольору закриті гумовими пробками під алюмінієву обкатку по 10, 50, 100 мл.												
ЗБЕРІГАННЯ	Темне, сухе, недоступне для дітей місце за температури від 15 до 30°C. Не охолоджувати! Термін придатності – 2 роки. Після першого відбору з флакону – 28 днів за умови зберігання його у темному, сухому місці за температури від 15 до 30°C.												
для ЗАСТОСУВАННЯ у ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ!													
ВЛАСНИК РЕЕСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 57-А, Україна												
ВИРОБНИК ГОТОВОГО ПРОДУКТУ	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» Адреса виробництва: Україна, 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Лістового Олександра, буд. 1/3. www.biotechlab.ua												