

ФЛОКСИ-СПРЕЙ МАКС	
спрей для зовнішнього застосування, розчин	
ОПИС	Прозора рідина безбарвна або світло-жовтого кольору.
СКЛАД	100 мл препарату містять діючі речовини: флуорфенікол - 2,5 г; преднізолону ацетат - 0,1 г. Допоміжні речовини: метилпіролідон, полівінілпіролідон, спирт етиловий, спирт ізопропіловий, пропіленгліколь, гліцерин, диметилсульфоксид.
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	АТС vet класифікаційний код QD07 – кортикостероїди для дерматологічного застосування. QD07CA03 – преднізолон у комбінації з антибіотиками. Флуорфенікол є похідним тіамфеніколу, в якому гідроксильна група заміщена атомом флуору, що зумовлює його антибактеріальну активність проти ацетилтрансферазо-синтезуючих бактерій. Флуорфенікол діє бактеріостатично на грампозитивні (<i>Streptococcus spp.</i>, <i>Staphylococcus spp.</i>) і грамнегативні (<i>Fusobacterium necrophorum</i>, <i>Bacteroides melaninogenicus</i>, <i>Pasteurella spp.</i>, <i>Salmonella spp.</i>, <i>Proteus spp.</i>, <i>Pseudomonas spp.</i>, <i>Haemophilus spp.</i>) бактерії, а також на <i>Mycoplasma spp.</i>, <i>Rickettsia spp.</i>, <i>Chlamydia spp.</i> Флуорфенікол пригнічує синтез білків у клітинах бактерій. У протоплазмі він зв'язується з 70S-рибосомними субодинами, пригнічує ферментну активність пептидилтрансферази, гальмуючи, таким чином, синтез білків в рибосомах відповідних бактерій. Флуорфенікол за зовнішнього застосування діє місцево і у незначній мірі проникає в систему кровообігу. В організмі тварин метаболізується з утворенням метаболіту флуорфенікол-аміну. Флуорфенікол та його метаболіти виводяться переважно з сечею, меншою мірою з фекаліями. Преднізолон – синтетичний глюкокортикостероїд. Він володіє протизапальною, протиалергічною та антиексудативною діями. Протизапальна дія обумовлена пригніченням метаболізму арахідонової кислоти та вивільненням медіаторів запалення. При місцевому застосуванні відбувається абсорбція преднізолону і він потрапляє в кров'яне русло. У плазмі 90% преднізолону знаходиться у зв'язаному вигляді (з транскортином і альбуміном). Біотрансформується шляхом окиснення переважно у печінці; окислені форми глюкоронізуються або сульфатизуються. Виводиться з сечею та фекаліями у вигляді метаболітів, частково – у незміненому вигляді.
ЗАСТОСУВАННЯ	Лікування собак, котів та кролів декоративних порід, хворих на дерматити, панарицій, піодермію, екзему, а також при ранах (у тому числі після кастрації), розчісуваннях, укусах, виразках, що спричинені мікроорганізмами, чутливими по флуорфеніколу.

ДОЗУВАННЯ	Зовнішньо. Перед нанесенням препарату уражену ділянку ретельно очищують від ексудату, некротизованих тканин. Тримавши попередньо струшений флакон на відстані 5-10 см від поверхні пошкодженої ділянки шкіри, натискають на розпилювач 1-2 рази і обробляють поверхню площею 5 x 5 см. Застосовувати препарат необхідно через кожні 12 годин до цілковитого загоєння. Тривалість лікування залежить від ступеня ураження і швидкості загоєння. У випадку, якщо протягом 10 днів не досягнуто терапевтичного ефекту – застосування препарату слід припинити, а схему лікування – переглянути.
ПРОТИПОКА- ЗАННЯ	Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до компонентів препарату. Не застосовувати одночасно з тіамфеніколом або хлорамфеніколом. Не застосовувати вагітним, лактуючим або племінним тваринам.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	<i>Побічна дія</i> Можливі алергічні реакції при підвищеній індивідуальній чутливості до компонентів препарату. <i>Особливі застереження при використанні</i> Застосування препарату повинно базуватись на визначенні чутливості мікроорганізмів-збудників до флорфеніколу, а також із врахуванням загальноприйнятих та локальних правил застосування антимікробних препаратів. Не допускати попадання препарату в очі тварин та людини. Не дозволяти тварині протягом 5 хвилин злизувати препарат. Перед застосуванням флакон з препаратом необхідно струсити. <i>Спеціальні застереження</i> Обробку тварин препаратом слід проводити далеко від відкритого вогню та нагрівальних приладів.
ФОРМА ВИПУСКУ	Флакони з полімерних матеріалів з пульверизатором по 9, 30, 50, 100, 200, 250 та 500 мл.
ЗБЕРІГАННЯ	Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25 °С. Термін придатності - 2 роки. Термін придатності після першого застосування: до закінчення терміну придатності.

ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ!

ВЛАСНИК РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ:	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» Україна, 08601, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 57А.
ВИРОБНИК ГОТО- ВОГО ПРОДУКТУ	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» Україна, 08601, Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Лістового Олександра, 1/3 www.biotestlab.ua.